



Digitized by the Internet Archive
in 2018 with funding from
Wellcome Library



LAURENTIUS HEISTERUS
Moenio-Francofurtensis
MED. DOCT. ANAT. CHIRURG.
ac THEOR. PROF. PUBL. in ACAD.
HELMSTAD. Natus An. 1683

D. LAVRENTII HEISTERI

PROFESS. PVBL. HELMSTADIENSIS

ACADEM. CAESAR. REGIAE LODIN. AC BEROLIN.

COLLEGAE

COMPENDIVM ANATOMICVM

TOTAM REM ANATOMICAM

BREVISSIME COMPLECTENS

EDITIO QVARTA PRIORIBVS LONGE AVCTOR
ATQVE EMENDATIO.



TOMVS I.

CVM FIGVRIS AENEIS

NORIMBERGAE ET ALTORFI

SVMTIBVS GEORG. CHRISTOPH. WEBERI BIBLIOP.
ET IOD. GVIL. KOHLESII ACAD. TYPOGR.

A. R. S. CIO MDCCXXXII.



VIRO AMPLISSIMO ATQVE DOCTISSIMO
D. IOHANNI BAPTISTAE
MORGAGNIO

IN CELEBERRIMA ACADEMIA PATA-
VINA ANATOMES PROFESSORI
PRIMARIO

ANATOMICORVM HVIVS SECVLI
FACILE PRINCIPI

FAVTORI ATQVE AMICO SVO
AESTIMATISSMO

COMPENDII HVIVS ANATOMICI EDITIONEM
QVARTAM

IN AMICITIAE PERPETVAM TESSERAM
CONSECRAT
AUCTOR.



Quod novam hanc, amicissime
Morgagni, eamque quartam
compendii mei in Germania e-
ditionem, nomini Tuo splendidissimo in-
scripserim, cum diuturna, suavissima at-
que constantissima, quæ a multis annis jam
inter nos intercedit necessitudo, tum quod
omnes



omnes eruditi ex doctissimis Tuis scriptis
Te hodie Principem Anatomicorum maxi-
meque idoneum rerum anatomicarum iu-
dicem, atque æquissimum earum arbitrum
agnoscant, effecerunt. Postquam enim Tu
de hisce meis laboribus, quos hucusque
in compendio meo anatomico concinnan-
do, emendando atque augendo impendi,
semper & publice & in privatis litteris ami-
cum tulisti iudicium, atque ad illud ma-
gis perficiendum mihi calcar atque auxi-
lium dedisti, omni studio ac labore, quan-
tum alia mea negotia permiserunt, etiam
in hac editione id præstare annisus sum: in
qua rursus multa addita et in disciplina
anatomica emendata invenies. Quæ si Ti-
bi non displicebunt, gaudebo atque cavil-
latores iniquos, qualem nuper in Gallia
chirurgum quendam expertus sum, haud
curabo: inprimis cum alii eruditi omnes
hucusque labores hos meos laudarunt; vel
si quid monendum iudicarunt, ut ho-
nestos decet, monuerunt.

Vale.

Dab. Helmstadii x. Kalend.

Mart. A. MDCCXXXII.

PRAE

PRAEFATIO AD LECTOREM.

QUamvis ante compendii huius editionem primam libri anatomici non defecerint, neque compendiorum anatomicorum fuerit penuria: tamen me auctum egisse non existimo, cum *hocce Compendium anatomicum* primum, & deinde aliquoties auctius atque emendatius, in manus hominum edere susceperim.

Etenim, quoniam *scientia anatomica* ita est comparata, ut, more omnium aliarum scientiarum, industria atque improbo præstantium virorum labore, *indies emendationes & incrementa admittat*, atque etiam nostris temporibus largissima sumserit: hinc harum rerum gnaris facile erit manifestum, *in antea usitatis compendiis & syntagmatibus anatomicis quam plurima deficere*, quæ ab aliquo tempore a variis vel recens detecta atque inventa, vel emendata atque correctæ sunt, quæque studiosæ iuventuti, & inprimis tyronibus Medicinæ, scitu sunt & utilia, & necessaria.

Cum vero his valde molestum ac difficile sit, fundamenta Anatomies, & res iam cognitæ, ex tam multis, eheu! libris, & quidem sæpe ingentibus ac valde prolixis, colligere aut conquirere: atque hic labor haud levem in progressu studiorum eorum ponere possit remoram, magnamque tyronibus nauseam creare: *hoc compendio eos sublevare*, artemque effato HIPPOCRATIS, iam satis longam ac difficilem, breviorē, facilioremque reddere studui.

Recte enim suadet illustris BOYLEVS *a)*, ut in scientiis subinde, quando largi progressus, sive magna incrementa facta sunt, novum systema in lucem emit-

a) Tentam. physiolog. commentatione procemiali.

emittatur, ad optimorum scriptorum sententias & observationes adornatum: *Istiusmodi enim opus, ait, tunc summæ utilitatis esse posse: partim ad initiandam in scholis & Academiis iuventutem; partim, ut habeant homines præ manibus eorum indicem, quæ iam inventa sunt; ut de cognitis non amplius laboretur, & humani in scientia progressus evidentius appareant.* Insimul tamen monet, *ne istiusmodi opus in publicum detur, donec scientiæ cumulo aliqua notabilis accessio habeatur.*

Plures vero quam viginti nunc præterierunt anni, cum Clar. Schelhammerus a), postquam Verheyenum acri censura, castigaverat, iam fuerit conquestus, nos commodo, quo partium historia tradatur, destitui compendio: atque optavit, ut vir aliquis doctus, qui in veterum recentiorumque scriptis æque sit versatus, id qui præstet, publico bono excitetur, qualis olim Veslingius fuerit: atque propterea exclamavit: *Utinam novum aliquem Veslingium concederet nobis cœlestis favor, qui pari cum verborum nitore, brevitate ac pondere, nova veteribus addita exponeret.* Verum prorsus fere desperavit, idque hoc sæculo fortassis optare licere: sperare vero non licere, iudicavit. Nam pergit: *Artis sane est non vulgaris, maiorisque, quam facile creditur, concinnare eiusmodi compendium, succincte, nervose, cum iudicio, methodoque vera ac facili, denique eleganter, & a media ætate petitis verbis.* Quod quam difficile sit, ex prædictis nemo non cognoscit: in primis quando simul animo perpendit, quanta nunc linguarum notitia ei sit necessaria, qui hodie bonum compendium conficere, omnesque res novas, quarum sane quam plurimæ sunt, quæ

a) in præfatione Analector. Anatomico - physiologicorum: qui liber prodiit Kilix An. 1704. 4.

quæ hoc tempore non sola latina lingua, ut *Veslingii* patrumque nostrorum ævo, sed gallica, italica, anglica, belgica, atque germanica etiam scribuntur, prævio præsertim accurato illarum examine, in compendium apte transferre studet. Quantum præterea commercium litterarum in hoc studii genere, quantumque laboris & sumtum, ut libros, eosque sæpe pretiosissimos, exteris præsertim in regionibus impressos, acquirat, requirantur, dici sane vix potest. Et quamvis *Veslingius* non sim, multo minus me talem esse credam, qualem *Schelhammerus* hic desiderat; summa tamen ope nixus sum, ut ea, quæ hic in compendio iure desiderat, quantum tenues meæ vires, aliaque mea negotia admittunt, præstem: atque dum *Veslingium* æquare non potui, eum tamen imitari, & quousque mihi licuit, assequi studui. Operam minimum haud levem impendi, ut saltem longe perfectius ac melius compendium exhiberem, quam ante meum habebamus.

Quodsi enim examinamus recentissima illorum, quibus meum prima vice edere coëpi, temporum syntagmata & compendia anatomica: profecto ingens recens inventorum cumulus, & accessio quam maxima novarum observationum occurret, quæ in illis deficiebant.

Consideremus enim vulgatissimum librum anatomicum, & in Academiis illo tempore usitatissimum, nimirum *Anatomiam corporis humani* clarissimi VERHEYENI, (de imperfectioribus enim iam nihil dicam atque perspiciemus, non solum multos adhuc errores in eo contineri, quos recentiores correxerunt & emendarunt; sed etiam nova inventa quamplurima in eo deficere: & quidem non modo eorum auctorum observationes, qui post eum scripserunt; verum etiam mul-

multæ illorum, qui ante editionem ultimam libri eius (quæ An. 1710. Bruxellis prodiit) iam prostabant.

Liceat ad sententiam hanc nostram probandam ex multis tantum nonnulla commemorare, quæ in hoc scriptore & plerisque aliis, qui ante ipsum scripserunt, deficiunt; vel male descripta sunt; non quidem eo animo, ac si honori atque existimationi eius aliquid detractum esse velim, ut nonnulli sinistre interpretari voluerunt: a) quod absit a me *nam multa bona præstitit, & egregie de re anatomica meritus est*; sed ut demonstrem, multa ab ipso fuisse neglecta, atque novum quoddam compendium, sive novum rerum in anatome cognitarum indicem, fuisse necessarium: (ne iure mihi exprobrari queat, me actum egisse, aut nihil præ VERHEYENO præstitisse) tam pro studiosa iuventute, quam etiam pro aliis eruditis, qui, quæ in Anatome iam nota sunt, cognoscere desiderant: *ut in cognitis non diutius, quam par est, se detineant, sed, ut in incognitis tanto melius progrediantur, atque uberiora incrementa facere annitantur.*

Primo autem loco generatim hic notamus, VERHEYENVM scriptores Anglos, forte ob linguæ Anglicanæ imperitiam, *non legisse*; quos tamen, quia ab ipso non adeo remoti fuerunt, habere facile potuisset. Nominatim vero celeberrimi anatomici, GVILIELMI COWPERI scripta ipsi prorsus fuisse incognita, inde patere existimo: quia nusquam eorum ullam fecit mentionem. Deinde, cum in tract. II. cap. XXIV, (ubi de pene agit, in edit. Bruxellensi p. 117.) ex Clar. ORGAGNIO aliquid referat de usu foraminulorum in ure-

a) præsertim auctor Versionis gallicæ huius libri, ut relatum legi in Diario Gallico (*Journal des Scavans*) An. 1725 mense Iulio: ubi tamen Auctores huius Diarii me optime defendunt.

urethra virili, & MORGAGNIUS *de glandulis* COWPERI iuxta urethram loquatur, addit VERHEYENUS in parenthesi: *quales illa glandulae sint, ignoro*; cum tamen non solum in peculiari scripto, & quidem non anglicano, sed latino, An. 1702. Londini impresso, verum etiam postea in *Actis Lipsiensibus, Ephemeridibus Gallorum, Historia Academiae Regiae Scientiarum*, KEILII Anatomie DRAKII Anthropologia, & HORNII Microcosmo, cum notis clarissimi D. PAVLI Anno 1707. Lipsiae edito, descriptae fuerint: quos igitur libros omnes non evoluisse videtur.

Præter has glandulas *omisit quoque varios novos mucus*: quos COWPERUS in Myotomia sua reformata, quæ tamen iam An. 1694. prodiit, descripsit: ut *flexorem capitis, rectum* scil. *minorem anticum, & rectum lateralem, inter spinales colli, musculorum oculi & lingue pulcherrimam delineationem*, cum multis aliis egregiis inventis, quæ tam in magno suo opere, *The Anatomy of the human Body*, quam in *Actis Lipsiensibus*, item in citato modo KEILIO, DRAKIO, PAVLI, & alibi, repetita sunt. Imo *nihil quicquam habet VERHEYENUS ex Actis*, ut vocant *philosophicis Anglicanis*, aut ex *Historia Academiae Regiae Scientiarum*; neque ex *Ephemeridibus Naturæ curiosorum*; neque e *Diario Parisensi*, aut *Actis Eruditorum Lipsiensibus*, ullove alio libro simili periodico, qui nova litteraria recensere solent. Vnde patet, VERHEYENVM in multorum librorum, etiam vulgatissimorum, lectione sæpe non verutum fuisse. Hoc vero adhuc magis manifestum erit, si consideramus eum observationum GAGLIARDI, Itali, & HAVERI, Angli, circa *ossa & glandulas mucilaginosas*, tam diu cum publico iam communicatarum, se quidem meminisse; itemque observationes BON-

CLARI & LEALIS LEALIS circa *testes ac Vesiculas seminales* omisisse, atque *musculos urethræ, transversales* dictos, a BIDLOO, COWPERO, LITTRIO & aliis descriptos, aliaque similia, non commemorasse. Sic nec Celeb. DUVERNEI librum *de organo auditus*, adeo tritum & notum, ipsum vidisse, aut legisse inde patet: quia eius non solum non meminit; sed & figuras illius, quas BLANCARDVS, sine auctoris mentione, in Anatomen suam transtulerat, pro figuris BLANCARDI venditat: Tab. XXIX, fig. 2; quæ vero DUVERNEO adscribendæ erant. Silentio quoque præterit BRUNNERVUM de *Pancreate, glandulis duodeni*, atque *glandula pituitaria*: quæ tamen scripta, a triginta quasi annis iam prostabant: itemque ANTONII MARIAE VALSALVAE tractatum *de Aure humana*: cum tamen is multa notatu digna scripserit, eiusque liber in Belgio non solum recusatus; verum etiam in Actis Lipsiensibus, aliisque Diariis, iam dudum recensitus sit.

Miror quoque, eum *corpus reticulare* MALPIGHII in lingua, ceteraque eius tegumenta omisisse: cum tamen hæc iam tam diu a MALPIGHIO, BELLINO, BURDONO, MANGETO, aliisque quamplurimis scriptoribus, ab eo tempore, descripta sint. Ita nec TERRANEI observationum *de glandulis urethræ* neque *Nabothi* de Ovario suo novo mulierum, ullam facit mentionem. SWAMMERDAMIVM quoque silentio præterit, qui tamen nitidas *de utero* exhibuit figuras & observationes: itemque DEVENTERVUM, qui *pregnantium uterum* bene delineavit.

COWPERVS & DRAKIVS *penis virilis anatomen*, vere elegantibus figuris illustratam dederunt: in qua præter glandulas & musculos supra memoratos, vasa penis mercurio præparata, inprimis etiam vasa eius lymphatica, grato spectaculo exhibuerunt: de

de quibus tamen omnibus altum apud VERHEYENVM est silentium. Speciatim vero etiam DRAKIVS optimam, quæ hætenus nota fuit *arteria aortæ* evulgavit *delineationem*, ac præterea alias elegantes figuras, nimirum *ductus thoracici* ex homine, atque *arteriæ & venæ pulmonalis* dedit. Pulchre quoque per figuras expressit *musculos & cartilagine nasæ*, distributionem *membranae narium pituitariæ*, *ossa turbinata nasæ*, *sinus ossium maxillarium*, cum eorum aperturis in cavo narium; *septi narium constitutionem* eiusque membranam, *pulcherrimam omnium organi auditus*, in *unica figura*, *representationem*. Denique idem DRAKIVS, decem in Tabulis, nitidissimas exhibuit *musculorum delineationes*, eorum brevesque & bonas descriptiones addidit: unde factum esse opinor, ut a LISTERO, in præfatione libri sui de humoribus, hocce tulerit elogium: *Nihil, ut arbitror, inquit, aliquod annis generis eiusdem absolutius scriptum.*

RIDLEVS quoque vere elegantem *de cerebro tractatum* iam A. 1695. edidit, pulcherrimis observationibus, experimentis & figuris illustratum; qui tamen etiam VERHEYENO ignotus fuisse videtur. Tacet præterea, quæ GLISSONIVS, *Tract. de Hepate, & Cereb.* BOHNIVS, iam tam diu in *Actis Lipsiensibus*, Anno scilicet 1682. & 1683, ut & in *Circul. suo Anatomico-physiologico*, Cap. de hepatis officio, de *ductibus hepatico-cysticis*, cum publico communicarunt: quæ VERHEYENVVS, dum, in descriptione horum illos flet, pro suis inventis venditare videtur. Nec minus *vasa nova palpebrarum Meibomii nostri*, in peculiari epistola olim evulgata, atque a BARTHOLINO, BLASIO, Io. Maur. HOFFMANNO, aliisque repetita prætermittit.

Siluit etiam inventores *ductus salivalis glandulae*.

la sublingualis in bestiis, RIVINVM & BARTHOLINVM: unde & hos ipsi incognitos fuisse, haud obscure divinare licet. Siluit quoque *Mauricium* HOFFMAN-
NVM, primum *ductus pancreatici inventorem fuisse*. Sic forte nec legit, quæ LITTRIVS dedit de *glandula nova urethrae*, in Hist. Acad. Reg. Scientiar. A. 1700. Nihil loquitur de *hiatu*, sive foraminulo, quod primum *Rivinus*, (docente VVELSCHIO in tabulis suis Anatomicis) & deinde etiam MVNINCKS, VALSALVA, & DRAKIVS, in *membrana tympani* statuerunt, per quod nonnulli fumum nicotianæ, ore attractum, per aures emittunt. PACCHIONI observationes de *dura matre*, in tract. de fabrica & usu duræ matris, nec non de *glandulis conglobatis duræ matris*, per figuras designatas, pariter omittit; sicut & sinus inferiores duræ matris, quos partim VIEVSSENIVS & ORTLOBIVS, partim RIDLEYVS delinearunt ac descripserunt. Nihil refert de eis vasis, quæ THEBESIVS in *interiori cordis superficie detexit*, & peculiari dissertatione, Lugduni Batavorum A. 1708. edita, descripsit: de quibus tamen & acta Lipsiensia loquuntur, & figuras exhibent.

Silentio premit BRIGGIVM de *oculo*, & quæ HOVIVS de *motu humorum oculariorum* publicavit; quorum tamen modo laudata Acta Lipsiensia & mentionem fecerunt, & delineationem quoque dederunt. Similiter, quæ RVYSCHIVS nova dedit, tam de *arteriarum pulcherrima per choroideam, Ruyschianam, & uveam distributione*, quam, quæ alias mirabilia in suis epistolis, & thesauris, descripsit quamplurima, vel prorsus omittit, vel per transennam tantum indicat. Pulcherrima quoque multa, quæ hic stupendis suis *injectionibus in cerebro auribus, naso, lingua, corde, ventriculo, intestinis, omento, hepate, liene,*

liene, renibus, aliisque partibus detexit, sicco sæpe pede transit: quorum tamen in systemate anatomico non solum mentionem, sed etiam sufficientem descriptionem, facere debuisset.

Sic &, ubi de glandulis intestinorum agit, PEYERVM filet, inventorem eorum: id quod vel ex eius scriptis, vel ex *Mangeti Bibliotheca anatomica*, cognoscere potuisset. Neque quæ NOVESIVS de *vesiculis seminalibus mulierum*, *nervo auditorio*, aliisque rebus anatomicis, nova tradidit, perspecta habuisse VERHEYENVM inde coniicio, quia de eis nihil scribit. *Neurographia* & *novum vasorum systema* VIEUSS-SENII quoque meruissent, ut plura ex eis retulisset, quam retulit; sed haud memini, eum horum librorum vel mentionem usquam iniicere.

Nihil iam dicam de eis inventis & observationibus, quæ post editionem ultimam *Anatomiae* VERHEY-ENI prodierunt, quippe, quæ tunc scire nondum poterat; ex quibus vero auctoribus brevitatis causa nonnulli tantum hic nominabuntur: ut *Fantoni* anatomia corporis humani, *Vercellonius*, de glandulis oesophagi; *Nigrisoli*, *Vidussius*, *Voglius*, *Hilscherus*, *Vallisnerius*, & *Paitonus*, de generatione; *Anellus* de ductibus lacrymalibus: ubi quidem *Morgagni* descriptionem tradit; attamen ex huius fabricæ cognitione fistulæ lacrymalis curationem emendat. Porro *Cheseldeni* Anatomia & lithotomia *Eustachii* tabulæ anatomicae, *Vieussenius* de aure, corde, et liquoribus corporis humani; *Morgagni* quinque ultima Adversaria anatomica; *Salzmannus*, *Henningerus* & *Wium* de ductu thoracico; *Henrici* vesiculæ seminales mulierum; *Palfini*, Anatomia Chirurgica; *Cantii* impetus anatomici: *Michelottus* de Separatione fluidorum, & sanguinis in pulmonibus

bus mutatione : *Bœrhavius* & *Ruyschius* de glandularum fabrica, huiusque Adversaria, epistolæ & thesauri varii; *Vaterus*, *Coschovitzius* & *Waltherus* de novis ductibus salivæ *Teichmeieri* Antropologia, *Covvperi* Myotomia reformata nova & splendidissima; *Santorini* observationes anatomicæ, itemque *Winsloi*, *Rauholti* & *Helvetii* in *Historia Academiæ Parisinæ*; *Albinus* de intestinis tenuibus; *Burggravius*, de spirituum animalium existentia contra *Gælickium*, aliique scriptores, qui in opusculo nostro de *incrementis Anatomies* nominantur, quorum res gestas præcipuas in compendio hoc indicavi.

Præter auctores vero enarratos, & forte plures alios, quorum inventa & observationes, imo integros libros ignorasse videtur VERHEYENVS, multos adhuc alios defectus & errores annotabo, quos facile evitare potuisset; ut exemplis quamplurimis oppido demonstrarem, anatomicam disciplinam libro perfectiore, quam VERHEYENI est, indiguisse.

Et primo quidem in trunci corporis humani divisione, eum tantum in tres partes, caput, thoracem, & abdomen, dividit; ad collum omittit. Quia vero collum neque at caput, neque ad thoracem, sine confusione referri potest; merito in quatuor partes dividendus est truncus, & collum, tanquam pars diversa a reliquis, considerandum. Nam dici recte nequit, laryngem aut asperam arteriam in capite aut thorace esse situm, sed in collo. Sic etiam vulnus colli in chirurgia, neque ad thoracis, neque ad capitis vulnera referri potest: quapropter colli a reliquis trunci partibus distinctio, non est entium præter necessitatem multiplicatio; sed, quia ad confusionem evitandam facit, perquam utilis divisio, multorumque clariss. virorum autoritate nititur, vid. pag. 128.

Deinde

Deinde *dextrum ventriculi orificium sinistro altitudine esse æquale*, & scribit & delineat : cum tamen RVYSCHIVS a) & plures alii, ipsaque experientia doceant, *dextrum sinistro esse inferius*. *Valvulam pylori* in figuris suis omit- tit, & hunc tantum circulum fibrosum esse statuit; cum tamen satis insignem plerumque valvulam exhibeat; imo, *nec situm obtinet pylorus horizontalem*, ut a VERHEY- ENO delineatur; sed obliquum, prout figura VI. Tab. 1. utrumque hoc demonstravimus.

Valvulam coli, (quam *Bianchus* prorsus negat) ad in- gressum ilei in intestina crassa, *rotundam delineat*, & cir- culi in modum huic orificio esse circumductam, ait *Verbeyenus* p. 64; cum tamen in inflato & exsiccato in- testino *non rotunda, sed longitudinalis* & admodum singu- laris appareat, *ex duabus membranis*, quasi semilunaribus, e regione positis, composita: sicuti prolixiori descri- ptione in dissertatione peculiari de hac valvula, An. 1718 edita, ac nova figura illustravimus. *Valvulas KERKRINGII conniventes* intestinorum ex BARTHOLINO recenset; unde apparet, eum etiam vulgatum librum KERKRINGII non habuisse. *Musculos œsophagi* male de- lineat & describit; quorum longe melior delineatio ex COWPERO peti potuisset. *Lieni tunicam duplicem*, p. 86. & *cellulas* adscribit; quæ quidem in bobus ac vitulis reperiuntur; sed non in homine: *ubi unica tantum*, & quidem naturaliter satis tenui *membrana* cingitur: si- cut id etiam in canibus & porcis ita reperitur. *Cellu- losa vero substantia* in homine a RVYSCHIO b) quoque iam refutata est. Plerique autem Autores, quod obiter hic notamus, in eo errarunt, quod *descriptionem lienis vitulini pro humano dederint*; nam experientia & RVYSCHII scripta aliud docent.

Impossibile præterea esse putat, *per unum eundem-*
)()(*que*

a) Thes. Anat. II. Tab. V.

b,) Epist. IV.

que ductum cysticum bilem in cystidem felleam influere, & rursus inde effluere posse: cum tamen nullum adsit obstaculum; nec repugnet analogia in vesiculis seminalibus, ubi per unum eundemque ductum semen in has vesiculas influit, (quod ipse concedit) & excretionis tempore rursus effluit. Ductus cysticus in homine serpentino ut plurimum ductu inflectitur, ut dudum RVYSCHIVS a) & nos Tab. III. fig. 9. hic demonstravimus: hinc male a VERHEYENO Tab. XI. fig. 4. rectus delineatur. Non notat, sphincterem adesse in vesicula fellis: cum tamen flatus immissus ab ea ita coerceatur, sicut in vesica urinæ, ut non sponte erumpat. Vreterum structura, ex triplici membrana composita, a VERHEYENO omissa est. Capsulas atrabilarias sitas esse delineat inter renes, venam cavam & aortam; cum tamen, uti EVSTACHIVS b) iam olim recte observavit & delineavit, ipsi renum superiori & interiori parti incumbant: in canibus vero sitæ sunt, uti a VERHEYENO delineantur. Vñsus, quem his capsulis adscribit, (quod scilicet liquorem in eis secretum ad arterias emulgentes transmittant, quo urina in renibus præcipitatio melius succedat) nullo experimento, neque ratione, neque analogia, nititur.

Prostatas, duo corpora globosa esse perhibet, p. 114. quæ vero non nisi unicum sunt. Vrethræ substantiam cavernosam circa glandem quasi obliterari asseverat, p. 115. cum contra ibi magis expandatur, & totam fere glandem constituat, sicut RVYSCHIVS dudum demonstravit: c) & hinc male describit glandem penis, p. 118. quasi ex duobus corporibus spongiosis componeretur; nam modo laudatus RVYSCHIVS & dein LITTRIVS d) dudum accuratiores dederunt descriptiones. Duo tantum musculorum penis & urethræ paria numerat VERHEYENVS; cum

a) In Epist. V. Tab. 5. fig. 6.

b.) Tract. de Renibus.

c.) Observat. Anatomico-Chirurg. centesima.

d.) Histoire de l'Acad. des sciences An. 1700.

cum tamen tria, ut supra iam dictum, a longo tempore nota atque descripta sint: quibus LITTRIUS quartum addidit, *rectum* appellatum, quod ab ano oritur, & bulbi urethræ parti posteriori inseritur: sicut in Myologia, §. 345. ea descripsimus. *Vrethra pulchra descriptio*, quam LITTRIVS a) dedit, eum prorsus fugisse videtur: alias sine dubio hac de re locutus fuisset. *Glandulas in vesiculis seminalibus* se manifeste observasse in adolescentulo, Harderus asseverat, b) cum ductibus excretoriis setam admittentibus: quorum vero ab illo nulla fit mentio.

Tubulos lactiferos mammarum ex glandulis rotundis provenire, fide NVCKII quidem affirmat VERHEYENVS, sed non sua observatione: prout ex verbis eius colligere licet; quemadmodum etiam de illis *glandulis mammarum*, tam breviter & frigide loquitur, ac si nunquam eas certe, saltem ita, sicut eas delineat, vidisset. *In flore ætatis*, ait tantum, *eas candore nitere*, *in senectute vero flavescere obfuscare*: ceterum vero de eorum situ, figura, magnitudine &c. nihil proponit. Delineat quidem eas rotundas, & copiosissimas, ubique mox sub cute per mammas dispersas, Tab. XVIII. fig. 2. & 4. secundum NVCKIVM; sed nunquam eas ita reperire potui, quamvis lactantium, puerperarum, virginum & aliarum mulierum, mammas solícite sæpius examinaverim. E contrario observavi, illos globulos, qui cute separata apparent, meram pinguedinem esse. Verum in medio mammæ, sub pinguedine, alia quædam, parva quasi mamma, ex continua glandulosa substantia composita, (*non globosa*) latet, quæ uberibus brutorum haud absimilis est. Per hanc substantiam tubuli lactiferi,

a) loco modo citato.

b) Prodrómo physiologico.

ri, instar ramusculorum, distribuuntur; atque sic vera mammarum fabrica se habet. a)

Quare vasa diaphragmatis *phrenica* dicantur, falsam profert rationem: nam docet, *ea ita vocari, quasi pertineant ad mentem; phren enim mentem significare, quacum putentur habere specialem communicationem.* Sed planior longe est ratio: nam phrenes (φρένες) HIPPOCRATI & aliis antiquis Medicis, teste EROTIANO, etiam diaphragma vocabatur: unde vasa ad illud excurrentia, *phrenica* dicta sunt. b)

Arterias cordis coronarias, sub valvulis *semilunaribus aorte* oriri, tradit p. 176; cum tamen *supra eas* oriantur, & hæc notitia magni sit momenti, ad motum cordis rite explicandum. Præterea VERHEYENVS cum VIEVSSENIO affirmat, per oscula vasorum, in ventriculos cordis hiantia, *fermentum cordis* deponi, p. 172: Verum hic sanguis venosus est, a nutritione cordis & aliis functionibus e substantia cordis refluus, qui nulla ratione fermenti nomen meretur, quia eum fermenti officio fungi, rationibus idoneis nunquam probatum est, nec probari posse puto; cum nullum fermentationis in corde adsit vel minimum indicium. c)

Glandulam thyroideam ab utraque asperæ arteriæ parte *dependere*, & haud inepte *duas* dici, ait VERHEYENVS, & sic etiam eam depingit, Tab. XXII. fig. I. Verum recte scripsit MORGAGNIUS, d) eam male pro duabus a multis haberi: cum unica sit, & crescentis lunæ figuram obtineat, cuius cornua sursum spectent, sicut in Ephemerid. cent. VII. & VIII. a nobis exhibita est, non deorsum, uti a VERHEYENO delineatur. Numerum *annulorum asperæ arteriæ*, a larynge ad divisionem in bronchia,

a) consentit mecum Morgagnius Advers. IV. fig. III. b) vid. Lexic. Med. Brunonis, sub voce *phrenes*. c) Conf. Bærbav. Instit. Medic. d) Adversar. Anat. prim. §. 26.

chia, frequentiore esse, 20, 22, aut paullo plures, asseverat, p. 191. Ego in hominibus tantum 16 ad 18, vix unquam plures numerare potui; in bestiis vero longe plures adsunt. *Arteria bronchialis, ejusque distributionis inventorem*, RVYSCHIVM, filet VERHEYENVS, attamen eiusdem verbis eam describit, p. 195: & quamvis quidem aliqui, ante RVYSCHIVM, eam aliquo modo indicaverint; a) hic tamen ortus & distributionis perspicuam descriptionem & delineationem primus dedit. b)

Sanguinem non sufficere, perhibet VERHEYENVS, ad nutritionem, nisi in pulmonibus materia aerea impraegnetur, atque in sinistro cordis ventriculo rite fermentatus fuerit, p. 196. Receptissima vero hæc olim sententia nervose refutatur a PITCARNIO c) & BOERHAVIO d) aliisque. *Glandularum bronchialium* nullum ante se mentionem fecisse, existimat VERHEYENVS pag. 197; cum tamen BARTHOLINVS e) eas descripserit, & primam inventionem BORRICHIO tribuat: imo ab HORNIO quoque eas iam esse demonstratas, Iustus SCHRADERVS affirmat. f) *Glandulas epiglottidis*, quas RVYSCHIVS iam Thesaur. Anatom. I. Tab. IV. fig. 6. lit. D. delineavit: enarrationemque *Vasorum œsophagi* VERHEYENVS quoque omisit.

Pilos post mortem in cadaveribus crescere; perhibet p. 210: hoc vero cum veritate ut plurimum non convenire, certissimis observationibus expertus sum: idemque RVYSCHIVM, experientia victum, mecum sentire, novi. *Pilos cutis esse sobolem*, plerique Auctores existimant; in barba vero, pudendis, aliisque quibusdam locis manifeste demonstrare possum, eos bulbis suis infra cutem ex pinguedine prodire.

) () (3

Sinus

- a) ibid. §. 24. & Act. Erudit. suppl. Tom. VI. p. 128.
 b) Dilucid. Valvularum lymphat. obs. XV. p. 61. c) Dissert. Med. d) Instit. Med. e) Anatom. p. 437. Lib. 2. cap. 10.
 f) in Observat. p. 195.

Sinus dura matris variis in locis cum *venis externis capitis per varia cranii foramina communicare*, eum haud cognovisse puto; quia nihil de hac re apud ipsum invenio: & hoc tamen satis manifestum sit, usumque in Medicina habeat. Locum in cranio, quem *torcular Herophili* vocant, non indicat. Cerebri inferioris delineationem meliorem, quam exhibuit, ex RVYSCHII epistola XII. sumere potuisset. *Par quintum* nervorum in duos tantum ramos in cranio dividi ait, p. 220. quod tamen in *tres* magnos dividitur. a) *A pari sexto* nervos ad linguam abire, ibidem scribit: quod vero experientiæ non respondet; nam præter fibrillam, quam hoc par glandulæ pituitariæ dat, omne, quod a constitutione nervi intercostalis reliquum est, ad musculum oculi abducentem abit: (id quod etiam non indicat). *De pari decimo* satis perspicue haud loquitur: recte tamen eadem pagina, dicit, *illud infra primam vertebra colligredi*; sed idcirco, quia non per cranii foramina egreditur, & ab ipsa spinali medulla oritur, me iudice, rectius colli, quam cerebri nervis annumeratur; & sic, ut Nota 71. docui, melius novem tantum cerebri, quam decem, statuuntur paria. Foramen illud in cerebro, *anus dictum*, in anteriori natum parte ponit, p. 224; cum tamen anus sit in harum parte posteriori. *Eminentiarum pyramidalium & olivarium*, in principio spinalis medullæ conspicuarum, ut & *valvula magna cerebri Vieussenii*, prorsus non meminit.

In Tab. XXIV. fig. 6. explicatione VERHEYENVS, ubi *glandulas corticalis substantiæ cerebri*, sive corpuscula globosa in ea exhibere vult, ait, substantiam cerebri corticalem hic repræsentari, prout NB. quibusdam ope microscopii apparet; unde colligendum, ipsum suis oculis nunquam talia globosa vel ovata corpuscula glandulosa vidisse; sicuti

a) conf. Ridley of the Brain fig. III. aliique.

sicuti etiam LEEUWENHOECKIUS, RVYSCHIVS, ego, alique, optimis microscopiis ea videre non potuimus: ideoque earum existentia si non falsa, tamen merito valde est suspecta. *Glandula pituitaria descriptio* prorsus deest in Autore nostro. De usu vero, p. 232. differens, putat eam liquorem aliquem demandare ad os vel nares; sed nullas indicat vias, per quas hoc fiat. Quamdiu vero viæ hæ non demonstrantur, dum nemo adhuc eas invenire potuit, frustra hoc asseveratur. Idem sentiendum de multis aliis usibus specialibus, quos sine rationibus cerebri partibus variis tribuit.

Medulla spinalis varia tegumenta exteriora omittit, quæ §. 274. p. 140. descripsimus, & mox a dura matre incipit. *Musculum subcutaneum* (quem Galenus *platysma myoides* appellat, §. 321. a nobis descriptum) difficulter a panniculo carnosio avelli ait, p. 238; cum tamen nullus detur panniculus carnosus in homine. Ibidem *buccinatorum, aliosque labrorum musculos*, male describit: quod factum quoque habet *digastricus* p. 240. In *labris, papillarum nervearum* RVYSCHII nullam facit mentionem.

Pag. 242. nescio, quo iure rursus asseveret VERHEYENVS, *palpebrarum structuram* ingredi panniculum carnosum; cum is a recentioribus omnibus in homine negetur. *Musculus orbicularis palpebrarum* pro duobus describitur p. 242; cum tamen revera non nisi unicus sit. *Motus oculorum*, præcipue obliquos, Auctor hic non recte explicat; COWPERIque elegantem figuram musculorum oculi ignoravit: quæ tamen, ut obiter hoc moneamus, paulo longior repræsentatur, quam par est. De *fibris muscularibus uvæ*, quæ pupillam dilatant & constringunt, nihil, aut male loquitur. Quod *tunica cornea* supra reliquum oculi globum emineat, haud commemorat: quod tamen ad visum aliasque res rite intelligendas scitu est necessarium. *Tunica humoris crystallini ipsi du-*

bia

bia videtur p. 248, quæ tamen non modo facile demonstratur : sed eius quoque vasa iam dudum a RVYSCHIO Thef. Anat. II. Tab. I. f. 8. delineata sunt. *Humoris vitrei fabricam*, probabiliter *vesiculosam*, omittit. *Nervos oculi* pessime describit, pag. 251 : nam *ad sensum*, ait, *habent oculi opticos*, qui tertium par nervorum capitis constituunt : *ad motum* duo paria integra, scil. secundum & tertium ; quorum illud conficitur ex nervis insignis magnitudinis, qui proprie oculorum motorii dicuntur. Posterius vero ex nervis exiguis, a WILLISIO *patheticorum* nomine descriptis : qui errores revera adeo insignes sunt, ut illos satis mirari non possim : sufficiatque, me eos tantum hic indicasse. Conf. cui lubet, nostra nervorum oculi descriptio, pag. 144. & §. 299. pag. 162.

Ductum, cum *Stenone* & multis aliis p. 260, & 261. statuit *e naribus per palatum ad os*, mox post *dentes incisores superioris maxilla*, qui ordinarie satis esset manifestus. Sed hic ductus in sceleto quidem, ad cuius figuram provocat *Verheyenus*, satis manifestus est ; verum in vivis & cadaveribus tam accurate clausus est, ut, ipso *Stenone* teste, ne setam transmittat. Conf. Nota (59*). *Vsum sinuum in ossibus cranii* incertum esse, ait VERHEYENVS p. 261 : cum tamen ad maiorem tunicæ pituitariæ narium expansionem, adeoque ad meliorem odorum facere, mihi aliisque recentioribus nullum sit dubium. *Membrana narium*, SCHNEIDERI nomen non addit : quæ tamen ab aliis, & quidem recte ita appellatur, quia ab hoc primum accurate pervestigata & descripta est.

VERHEYENVS recentiores, qui de aure scripserunt, ut DUVERNEVM, SCHELHAMMERVM & VALSALVAM, prorsus non consuluisse videtur. Nam *Anthelicem auris*, etiam *scapham* appellat p. 265 ; cum tamen omnibus accuratioribus *anthelix* eminentiam, *scapha* vero cavitatem inter *helicem* & *anthelicem*, denotet. Deinde *concham* vocat,

procat, quod ceteri omnes *scapham* nuncupant. *Glandulas sebaceas* VALSALVAE fileat; & p. 266, ubi *glandulas ceruinosas* describit, colorem earum omittit, inventoris DUVERNEI haud meminit, atque figuram DUVERNEI, ut iam diximus, BLANCARDO adscribit; unde adhuc manifestius est, eum DUVERNEI tractatum adeo celebrem non novisse, alias verum autorem citasset. Nec *reticulum*, cui inhærent hæ glandulæ, a VALSALVA descriptum, commemorat. *Membrana tympani* convexitatem & duplicaturam non indicat. Neque *membrana in textu tympanum tegentis*, neque *chordæ tympani*, mentionem facit. *Musculos mallei & stapedis* nusquam delineat. Ductum, sive *Tubam EVSTACHII*, *Aquæductum* appellat; tum tamen *Aquæductus FALLOPII* longe alius sit ductus: uti SCHELHAMMERVS iam dudum, & postea etiam VALSALVA aliique demonstrarunt: cuius vero descriptionem prorsus omittit. *Cochleam & labyrinthum* pessime describit, & de *canalibus semicircularibus*, de *vestibulo*, *lamina spirali*, *scalis cochleæ*, *zonis sonoris*, *portionis ductus nervi auditorii distributione*, & *nervis vertebralibus*, qui ad *aurem* abeunt, nihil quicquam loquitur: aitque, se ex *arum rerum descriptione confusionem potius, quam scientiam petuere*, p. 268. Ex quibus evictum esse puto, eum internam auris structuram non intellexisse; nec recentiores, antea citatos auctores, nec veteres, qui de aure scripserunt: ut EVSTACHIVM, COITERVM, CASSERIVM, OLIVM, unquam legisse; nam alias accuratiores delineationes & descriptiones, quam exhibuit, ex eis exhibere potuisset, aut saltem horum mentionem fecisset: verbo, auris interna pessime ab auctore nostro descripta est.

Linguae sex paria musculorum tribuit p. 271: meliorem vero ex COWPERO petere potuisset descriptionem. Nec *capillas linguae* accurate describit; *Tegumentorum* vero,

Vasorum sanguiferorum, nervorumque lingua hoc in capite ne quidem mentionem fecit: id quod tamen hic fieri merito debuisset. Neque de *frenulo*, neque de *usu linguae*, neque de *gingivis*, aut *unguibus*, vel *verbulum* profert.

Ductum salivalem Warthoni auctor desinere scribit p. 274. in oris interiora, NB. *prope dentes posteriores*; cum tamen prope dentes *anteriores incisores*, iuxta frenulum linguae, in os hiet: unde suspicari licet, eum hunc etiam non cognovisse. *Musculorum uvula* duo tantum paria, eaque male & sine nominibus describit. *Ossis hyoidis musculorum* confusionem facit: par *mylo-hyoideum*, a plerisque descriptum, omittit, & duo paria *genio-hyoideorum*, refragantibus optimis Myotomis, tradit. Omittit quoque *musculos occipitales*, ut & *lividum* sive *pectinaum*, femoris elevatorem, aliosque.

Prætermisimus hic, ne præfatio nostra nimis fiat prolixa, adhuc multas hallucinationes Auctoris nostri, quas in *ossibus*, *musculis*, *arteriis*, *venis* & *nervis*, commisit, ex quibus demonstrari posset, eum non satis accurate anatomen tractasse; nec in Auctorum Anatomicorum cognitione bene versatum fuisse. Nihilominus tamen non possumus non adhuc paucissima ex his notare: & quidem Tab. XXX. fig. 3. *capiti infantis recens nati magnum*, ut in adulto, *processum mastoideum*, appingit, qui tamen in infantibus adhuc deest. Deinde pag. 341. ait, *nullum musculum reperiri, per cuius solius actionem caput recta dextrorsum aut sinistrorsum inclinaretur*: cum tamen hoc fiat per *musculos rectos laterales*, a FALLOPIO, COWPERO, KEILIO, PAVLI, & DRAKIO iam dudum descriptos. Pag. 356. scribit, *se musculum anconæum* (cubiti extensorem) *reperire nunquam potuisse, sed se eum ex aliis delineasse*; cum tamen in omnibus cadaveribus, si modo rite attendatur, facile reperiri queat: nullumque novi probatum scriptorem, qui hunc musculum unquam defecisse notave-

averit. *Venam azygos* nusquam delineat ; & pag. 376. it, *an venæ cervicales sive vertebrales in cerebrum* (intelligit sine dubio cranium) *ascendant*, *mibi nondum constat*. Ex quo apparet, ipsum earum ingressum, per foramina peculiaria occipitis, post processus eius condyloides, & fines nescivisse, ubi se in sinus laterales duræ matris intrerunt. (Conf. Nota 68*) Hæc tamen foramina, quod notandum, in omnibus non sunt aperta : hinc in his sanguis sinuum cerebri per solas iugulares ad cor redit, & venæ vertebrales clausæ sunt. Quandoque etiam tantum unum horum foraminum in alterutro latere patet. *Vena umbilicalis* a VERHEYENO Tab. XXXIX. fig. 2. delineatur, ac si duplici ramo finiatur; uno, qui in venam cavam; altero, qui in venam portæ, desineret; quod vero falsum : nam unico canali sive trunco in solum sinum venæ portæ desinit, & ex hoc demum sinu in fœtu canalis peculiaris ad venam cavam transit : quem VERHEYENVS pro altero venæ umbilicalis ramo forte habuit. Conferatur id, quod in Ephem. Cent. V. & VI. pag. 236. de hac vena & ductu scripsimus, ut & fig. 12. Tab. nostra III. exhibita.

In priori editione, cap. de Cerebello, VERHEYENVS scripserat, *arterias vertebrales ad medullam oblongatam appellari, non per magnum occipitis foramen, sed per foramen aliud minus, anterius a latere istius magni foraminis*; hunc vero errorem, cum An. 1707. apud ipsum Lovanii essem, in familiari colloquio, cum sermo his de partibus fieret, ei amice indicavi, easque arterias omnino per ipsum magnum occipitis foramen cerebrum adire asseveravi; atque inveni postea, eum hunc lapsum in posteriori editione emendasse. *Singulares vero flexus arteriarum carotidum & vertebralium*, antequam cranium intrant, qui in DRAKH Tab. XX. egregie repræsentantur, & arteriis, cera repletis, facile observari possunt, noster

noſter quoque VERHEYENVS, ut & MANGETVS, prorsus omiſerunt.

Cum igitur tot tantique defectus & errores in VERHEYENI Anatome adſint, nullum fore hominem æquum exiſtimo, qui hunc noſtrum laborem, utilitatis publicæ cauſa ſuſceptum, damnaturus ſit, quo defectus illos ex recentiſſimis Auctoriſus, propriæque mea experientia ſupplere, & errores emendare ſtudi. Atque hoc ipſo me ſtudioſæ iuventuti non inutile officium præſtitiffe confido: dum in hoc compendio ſcientiam anatomicam, alias valde prolixam in idoneam epitomen ita redigere allaboravi, ut commodiſſime in Academiis pro uſu ſtudioſæ iuventutis adhiberi queat. Etenim præmiſſa generaliſori anatomes notitia, ac ſubiuncta brevi Oſſium doctrina, quæ fundamentum & ſuſtentaculum ſunt reliquarum corporis humani partium, ad partes molles progreſſum feci: ubi prius tegumenta corporis communia, brevibus in *tabellis*, (ut vocant,) explicavi. Deinde eadem methodo partes abdominis, thoracis & capitis, ac tandem arterias, venas, nervos, & muſculos expoſui: in quarum omnium deſcriptione rem ita dirigere ſtudi, ut plerumque ſingulam partem organicam una in pagina, vel in duabus, e regione ſibi poſitis, explicaverim: quo iuvenes, ſub uno quaſi aſpectu, intueri queant, quid in qualibet parte notandum occurrat: quod ad attentionem excitandam, memoriamque tyronum adiuvandam quamplurimum confert. Aliquoties tamen etiam plures paginas, ob rerum circa partes nonnullas dicendarum copiam, adhibere coactus ſum; quas tamen ita diſtribui, ut non facile confuſionem pariant: formamque hanc libri præ majoribus elegi, ut ſit geſtabilis, atque uſus commodioris.

Quam-

Quamvis vero paucis sæpe verbis me expediv-
im, tamen ea pro indice & norma, dicendorum &
discendorum commodissima, sufficere observavi. Nam
um pro collegiis, ut vocant, & demonstrationibus
anatomicis hic libellus potissimum sit compositus, ubi
reviora non solum oratione, sed & demonstratione
illustrantur, & prolixiores libri juvenibus haud adeo
commodi, ac sæpe nauseam creant, satis inde pate-
bit brevitas ratio: quam tamen tantam non esse pu-
o, ut auditor & spectator attentus rem indicatam, aut
reviter descriptam, inde intelligere non possit.

Conscribere vero iam coepi hocce compendium,
annis mei tyrocinii anatomici; sed verbis brevissimis,
& solum pro meo usu, ex ipsa VERHEYENI anatomia,
inquam tunc temporis usitatissima: ut in sectionibus
& inquisitionibus cadaverum breviter atque in epito-
me mox perspicere possem, quænam quavis in parte,
quam pervestigaturus eram, inquirenda essent: & si
deinde in Auctorum lectione, aut cadaverum sectione,
aliquid offenderam, quod in VERHEYENO & tabulis
meis non aderat; vel aliter, quam ab ipso descriptum
erat, observaveram, illud notavi, tabulisque meis ad-
di; atque sic sensim, ob rerum additarum copiam, in
maiores molem, quam ab initio erat, accrevit, aliam-
que tandem prorsus faciem assumsit.

Hoc deinde, cum anatomen alios docere incipe-
im, adhuc maiori mihi fuit usui: nam, toties, quo-
ies sectionem & demonstrationem aggressurus eram,
tabulam partis demonstrandæ cogitate percurrerebam:
sic deinde investiganda & demonstranda facilius in
memoria habebam, eaque leviori opera exhibere po-
teram.

Tandem, quia hæc methodus mihi in accurata anatomæ cognitione comparanda multum profuerat, nolui eam invidere auditoribus meis, eamque per aliquot annos describendam ipsis concessi: ne tam multa ad VERHEYENVM, vel alium Autorem, annotare necesse haberent: iisque tabulis, tam pro commoda repetitione, quam pro norma, si quando ipsi in sectionibus sese exercerent, felicius uti possent.

Denique vero, ut ipsos a describendi tædio liberarem, præsertim cum sæpe in describendo multos committerent errores, ipsorum desiderio, decrevi, totum hocce compendium typis mandandum; id quod etiam An. 1715. incepti, atque An. 1717. primum absolui. Cum vero hic labor ab eruditis non male fuerit susceptus, atque exemplaria primæ editionis brevi distracta fuerint, Bibliopolæ rogatu, alteram editionem, & post aliquot annos tertiam, prioribus longe auctiorem & nitidiorum edidi, eique figuras aliquot novas mearum potissimum observationum adieci. Hanc vero quartam editionem, maxima sane industria adhuc longe auctiorem atque emendatiorem reddere studui: quemadmodum eruditi facile agnoscent.

Quapropter non dubito, hocce iam compendium adhuc maioris utilitatis esse posse, quam antea: dum non solum maiori perspicuitate illud digessi; sed etiam omnes rursus novos Auctores, quos obtinere potui pervolvi: omniaque, quæ in eis scitu digna esse invenerim, in illud transtuli; quod profecto in tanta scriptorum rerumque investigandarum copia sine magno labore fieri non potuisse, quivis facile cognoscet: præsertim cum pauca pro veris descriperim, quæ non ipse in cadaveribus humanis prius exploraverim, & vera esse invenierim. Eo autem ipso non solum artium Studiosiorum & tyronibus Medicinæ, sed etiam forte doctioribus & in princip

primis etiam anatomes Professoribus, usui esse possunt, qui vel in compendio res, in anatome hucusque cognitæ, nosse, vel eas ipsi docere desiderant. Quam ob causam Auctores recentiores, qui anatomen suis observationibus locupletarunt, & VERHEYENO ignoti, vel item citati non erant, in recensione observationum ovarum, tanquam, plerumque citavi, ut sic ii, qui profundiorum earum rerum notitiam expetunt, eos ipsos solvere queant.

Denique etiam huic editioni iterum *Adenologiam*, ac inde *notas indicemque rerum* locupletissimum addidi; sic totius anatomes compendium sit perfectius, & tanto maiori utilitati esse queat. In *Adenologia* haud peremptorie *materiam de glandulis*, hodie adeo controversam, pertractavi: & quæ partes pro glandulis habentur, & quæ e glandularum censu proscribendæ, idoneis, ut spero, rationibus indicavi. In *notis*, ad calcem iunctis, loca varia obscuriora, dubia, vel nova, præsertim, ubi ob tabularum rationem brevior esse coactus fui, illustravi & prolixius descripsi, controversias modestè excussi; res, quæ mihi incertæ aut falsæ visæ sunt, emendare studi, & quid circa eas observaverim, candidè aperui. Quæ vero quia debita modestia ubique a me peracta sunt, spero neminem se a me inique sensum esse, iure conqueri posse: nam utilitatis publicæ causâ res dubias & errores tetigi: ut vel auctores, vel alii, res, quæ mihi dubiæ, aut falsæ visæ sunt, melius demonstrare, vel, si erratum fuerit, errores emendare velint.

Postremo, quæ de MANGETI Theatro anatomico præcedenti editione monui, hic repetere nolo. Hoc tamen, opere illo penitus perspecto, asseverare possum, me plus laboris in hoc parvo conficiendo impendisse, quam *Mangetus* in vastis suis volumini-


minibus adhibuisse videtur : quippe in quibus sacra
disciplinam anatomicam, prout fere res in mentem &
manus inciderunt, (si nihil dissimulare volumus) sin
iusto eorum examine, sine prudenti selectu, &, quo
præcipuum, sine manuum ad cadavera applicatione
ex aliis, & quidem non semper optimis, cum gravissimis
sæpe illorum erroribus, exscripsit, ut Cel. MORGAGNI
in doctissimis suis Adversariis, quamplurimis docu
exemplis, & adhuc pluribus, si opus esset, ostendi po
set : imo ne unicam figuram aut inventum novum, su
marte in toto amplissimo opere protulit. Vnde ap
paret, illud *Verheyeno*, quia pluribus scatet erroribus
haud præferendum, parvumque propterea hocce com
pendium, in quo innumeri horum errores correcti
defectusque suppleti, maiori usui esse posse. Vale, Le
ctor benevole, meisque laboribus fave, iisque cura
fructu utere : donec forte aliquando maior nostra
Anatome, vel alia perfectior
prodeat.



LAVRENTII HEISTERI COMPENDIVM ANATOMICVM.

DE ANATOME IN VNIVERSVM.

I.

 NATOME, sive ANATOMIA, est *anatome* *quid?*
ars, quæ docet situm, figuram,
nexum, fabricam, actionem, &
usum partium corporis humani.

2. OBIECTVM eius *primarium*, est corpus hu- *obiectum.*
manum; *secundarium* vero, quævis *alia anima-*
lia: ut per hæc illud accuratius cognoscatur, &
ut quandoque defectum cadaverum humano-
rum suppleant. Vocatur hæc bestiarum anato-
me, *zootomia*, sive *Anatome comparativa.* a)

3. SVBIECTVM anatomes est Vir, cadavera hu- *subiectum.*
mana & bruta recte dissecandi, perspicueque
demonstrandi peritus: ut spectatores inde par-
tium posituram, communicationem, structu-
ram, actionem & usum rite addiscere queant;
vocaturque talis, *Anatomicus*, aut *Prosector*.

4. MEDIA, quibus Anatomicus hæc perficit, *media.*
sunt præcipue *sectio, sive cadaverum incisio, mi-*
croscopia, iniectiones, aliaque instrumenta, de qui-
bus mox seorsim dicemus. Media vero, quibus
discipuli habitum in hac sibi comparare possunt est

A

1. dili-

De hac videri merentur M. A. Severini *Zootomia Democri-*
tea; Blasii *Anatome Animalium*; Collins *Anatome*; *Dissectio-*
nes anatomicae variorum animalium Parisiis olim institutæ;
Valentini Amphitheatrum Zootomicum.

1. diligens observatio, quando anatomici exercitati cadavera incidunt ; 2. imitatio , tam in bestiis, quam in hominibus ; 3. *bonorum scriptorum* lectio.

5. Horum primarii & quasi principes sunt, *ex antiquioribus*, Galenus, Vesalius, Carol. Stephanus, Eustachius, Ingrassias, (nimirum respectu scriptorum anatomicorum) Columbus, Fallopius, Coiterus, Vidius, Varolius, Valverda, Fabricius ab Aquapendente, Bauhinus, Spigelius, Casserius, Laurentius, Afellius, Laurembergius, Pavius, Casp. Bartholinus Pater, M. A. Severinus, Casp. Hoffmannus.

6. *Ex recentioribus*, Harveus, Veslingius, Riolanus filius, Warthonus, Glissonius, Pecquetus, Willisus, Lowerus, Highmorus, Needham, Marchetti, Molinettus, Diemerbrœck, Kerkringius, Blasius, Steno, Malpighius, Bellinus, Rolfincius, Schneiderus, Hornius, Graafius, Swammerdam, Thom. Bartholinus, Rudbeckius, Lyferus, Gagliardus, Peyerus, Bourdonus, Drelincurt, Nuckius, Haverus.

7. *Ex recentissimis*, Ruyschius, Bidloo, du Verneus, Bohnius, Brunnerus, Vieussenius, Ortlobius, Verheyenus, Schelhamerus, Io. Mauric. Hoffmannus, Dionis, Cowperus, Riddleus, Casp. Bartholinus nepos, Keilius, Hovius, Morgagnus, Valsalva, Palfinus, Douglassius, Drakius, Fantonus, Pacchionus, Bianchus, Vercellonius, Cheseldenius, Arent Cant, Noguez, Santorinus, Winslous, Albinus, Garengéot. Quibus adhuc iungi possunt Anatomici, brevitatis causa hic non nominati, quorum scripta in *Mange-*

ti Bibliotheca & Theatro anatomico continentur; itemque observationes novæ anatomicæ, quæ in Ephemeridibus Gallorum, Anglorum, Italicorum, atque Germanorum, subinde prodeunt. Plures qui nosse desiderat scriptores anatomicos, evolvat *Gælickii* Historiam Anatomix, *Jacobi Douglas* specimen Bibliographiæ anatomicæ, & Orationem nostram de *Incrementis anatomies* in hoc seculo XVIII, anno 1720. Helmstadii evulgatam.

8. FINIS anatomes multiplex est : *primarius* finis *primarius* tamen est operum mirabilium Supremi Numinis in corpore humano cognitio & admiratio : cum artificiosissimæ fabricæ contemplatio, partium admiranda figura, connexio, communicatio, actio & usus, Creatoris non solum existentiam, sed & immensam & stupendam sapientiam manifestissime, contra Atheos, demonstrent, & ad cultum ac venerationem eius invitent ; ideoque *finis primarius Anatomie gloria Dei esto*. Atque hoc sensu *Anatomia Philosophica*, aut *physica*, imo *Theologica* vocari potest, omnibus veræ sapientiæ ac Theologiæ cultoribus utilissima.

9. *Fines secundarii* plures sunt : inter quos *secundarius* primum ponimus *sanitatem*, (quem alii *primarius* primum constituunt) thesaurum in hac vita maximum, ut, cognita rite fabrica corporis humani, sanitatis tanto melior cura haberi queat, & morbi facilius præveniantur, citiusque & melius curentur : a quo fine *Anatomia medica* audit.

10. Deinde, si iussu Magistratus cadavera, ad *alteras* causas mortis violentæ vel suspectæ inquirendas,

das, aperienda, ut inspectionis vera relatio, atque aptum iudicium dari possit: utrum scilicet mortuus ex plaga inflictâ, veneno, aliave causâ violenta interierit; an ob causâ aliam, sive externam, sive internam, mortuus sit: quod profecto sine accurata Anatomies cognitione fieri non potest. Atque hanc *Anatomiam*, *forensam* & *juridicam* appellare possumus, & propterea non solum Medicis & chirurgis, sed etiam Iureconsultis sane perquam utilem: qui ea ipsa quoque sagacius de impotentia, de arcta & sterili, causis divortii, iusto partus tempore, abortu, partu dissimulato, vitalitate foetus, infanticidio, vulneribus lethalibus, aliisque casibus medico-legalibus dictis, iudicare & pronunciare poterunt. a)

tertius.

11. Tertio: quando *cadavera morbis defuncta dissectamus*, ob causas morborum & mortis investigandas: quam *Anatomiam*, *practicam* vocant; quia in praxi medica magnam habet utilitatem: dum multæ abditæ morborum causæ ea detectæ sunt, & adhuc subinde deteguntur, quæ alias latuissent; quo ipso dein facilius agnoscuntur & felicius curantur: exemplo *calculi vesicæ*, *empyematis*, *ascitis*, *herniarum*, *suffusionis* sive *cataractæ*, *glaucomatis*, *trepanationis*, *colicæ*, & multorum aliorum. b)

Anatome
quotuplex?

12. Hinc ob varios fines Anatomia alia *philosophica*, *physica*, aut *theologica*; alia *forensis*, *medico-*

a) Haud pridem Dissertationem habui de *Medicina* & cum primis *Anatomies utilitate in Iurisprudencia*: ubi longe plures adhuc utilitates demonstravi.

b) vid. Boneti Sepulchretum anatomicum.

dico legalis aut iuridica; alia medica, dici potest. Præterea alia Anatomia, speculativa sive theoretica audit: quando quidam ex inspectione cadaverum, dum alii profecant, aut ex libris, fabricam corporis humani addiscunt, quantum pro scopo suo unicuique sufficit; & tales *Anatomici theoretici* vocari possunt: quo sensu multi anatomen scire dicuntur, qui tamen sectione cadaverum nunquam occupati fuerunt; neque sectionem, ut ars culta requirit, vel ob nauseam aut horrorem, aliamve ob causam, instituere recte valent. Quando vero cadavera incidendo, partes artificiose resolvendo, præparando, atque pervestigando nos exercemus, *Anatomia practica* aut *exercitata* vocatur; talesque, qui hanc artem callent, *Anatomici practici* appellantur.

13. Vnde pater, *utilitatem Anatomies* esse in-^{utilitas eius.} gentem, neque solis Medicinæ cancellis inclusam; verum eius scientiam Theologis, Iureconsultis & Philosophis valde esse utilem. Medicos vero & Chirurgos salva conscientia ea carere non posse, certum est, si artem, quam profitentur, non in detrimentum generis humani; sed rite exercere cupiunt: nam, quod navis gubernatori pyxis nautica sive acus magnetica, id his est notitia anatomica: quicquid etiam ignari & malevoli quidam obganniant, atque in utilissimæ ac divinæ huius artis opprobrium caluminari annitantur.

DE INSTRUMENTIS ANATOMICIS.

14. Quia vero in arte anatomica INSTRV-^{instrumens-}ta.
A 3 MENTIS,

MENTIS, ut supra dictum est (§. 4), carere non possumus, dum sine his sectio, resolutio, perscrutatio ac demonstratio partium fieri nequit; idcirco *idoneis Anatomicis instrumentis debet esse instructus*: quorum quidem Anatomici quam plurima excogitarunt; ex quibus tamen sequentia nobis sufficere videntur.

15. Primo *tabula vel mensa anatomica*, pro cadavere imponendo. Dein *asser vel tabula sectionibus vivorum animalium* accommodatus, & *funes*, pro his ligandis. Postea *cultri* five *scalpelli* aliquot recti, uno tantum latere secantes, (nam ancipites, curvos, aliosque in anatome vel superfluos; vel saltem minus reliquis idoneos existimo) minores & maiores, subtiliores & robustiores. Porro *forfex*, *volsella*, *forceps*, *hamuli*, *styli* diversæ crassitiei, & *setæ* requiruntur, pro ductibus partium quarundam explorandis: Item *acus* rectæ & curvæ, cum filo fortiore, pro usu vario; ut & *acicula capitata* maiores & robustiores. Præterea *serra*, *scalpra*, vel *cunei* cum *clava* aut *malleo*, atque *elevatorium* pro cranio aperiendo. *Tubuli* quoque diversæ magnitudinis, pro vasis, ductibus, vesica, ventriculo, intestinis & pulmonibus inflandis: quæ ultima tamen *folle* idoneo commodius distenduntur.

16. Tandem & *microscopia*, pro partibus minoribus accuratius pervestigandis, utiliter adhibentur; itemque *magni siphones*, ex ære vel stanno confecti, quorum minimum duo requiruntur, cum tubulis diversæ magnitudinis & diametri: quorum alter pro ceracea materia, alter pro ali-

is liquoribus iniiciendis inserviat. *Tubulus* vero singularis ferreus, pro argento vivo in vasa immittendo, quoque necessarius est. Denique *spongia* pro effusis humoribus absorbendis, sordibusque detergendis; *cos olearis* & singulare *corium* pro cultris acuendis; *terebræ*, variæ magnitudinis, aliave instrumenta, ad ossa perforanda; *fila aenea*, *tenaculeque* pro scelecto conficiendo sive exstruendo, requiruntur. Ultimo *antlia pneumatica*, in replendis vasis, aliisque usibus, pulchre inservire potest. Imo in ipsa sectione Anatomicus *præcinctorio* & *manicis*, ad sordes a vestibus avertendas, carere nequit: sic & *olla*, *patina*, aliaque utensilia, pro Anatomici genio, commoditate & curiositate, varia sæpe necessaria sunt.

DE EXTERNIS CORPORIS HUMANI APPELLATIONIBVS AC DIVISIONE.

17. His descriptis, antequam ad ipsas corporis humani partes examinandas pergamus, ^{externæ corporis appellationes.} utile esse duximus, primum *de externis corporis humani appellationibus agere*: ubi autem non communissimas & omnibus e vulgo notas; nec eas, quæ in speciali partium peruestigatione, ut in oculo, naso, aure &c. indicandæ atque explicandæ occurrunt; sed tantum difficiliore, & non omnibus cognitæ, hic enarrabimus; de reliquis suo loco.

18. *Dividitur* vulgo ab anatomicis *corpus hu.* ^{divisio.} *manum* in truncum & artus, sive extremitates. *Truncus* constat *ex capite, collo, thorace & abdomine*; artus vero sunt vel superiores vel inferiores;

res : illi, *brachia* five *manus* ; hi *pedes* vocantur.

19. In *Capite* notanda primo, pars capillata, & non capillata, *facies*, dicta : deinde *sinciput*, *occiput*, *tempora*, *vertex*, *bucca*, *mala*, *philtrum* seu *lacuna* ; reliquæ omnibus notæ. In *collo* iugulum, pomum Adami, cervix. In *thorace* præcordia, a) dorsum. In *abdomine*, scrobiculus cordis, regio epigastrica, hypogastrica et umbilicalis, hypochondria, regio iliaca, lumbi, inguina, pubes, perinæum, regio ischiatica.

20. In *artibus superioribus* ; humerus, axilla five ala, brachium, cubitus, carpus, metacarpus, vola & dorsum manus, digiti. In *inferioribus* ; femur, genu, crus five tibia, malleoli, tarsus, metatarsus, planta, & digiti.

DE PARTIBVS SIMPLICIORIBVS.

21. Possemus quidem iam ordine ad *tegumenta corporis communia*, & inde ad interiores partes, progredi ; verum quia tyrones partes compositas melius intelligent, si prius *simpliorum* ideam habent : hinc hoc loco de his primum acturi sumus.

22. Omnes

a) quid per *præcordia* recte intelligatur, inter auctores non convenit. vid. *Fabri Lexicon*. Mihi denotat anteriorem Thoracis regionem : partim vi vocis, quasi diceret, partes præ corde five ante cor : partim ex *Celsi* præfat. pag. 11, ubi ait, crudele, vivorum hominum alvum atque *præcordia* incidi, aliisque eius locis plurimis ; itemque ex *Virgil.* 2 *Aeneid.* - - *redit in præcordia virtus* : ubi ab utroque pro thorace sumitur.

22. Omnes partes nostri corporis vel *solidae* ^{partes soli-}
 nt, five *continentes*, vel *fluidae* five *contentae*. ^{de simpli-}
 OLIDAE rursus in SIMILARES five simpliciore, ^{ciores.}
 DISSIMILARES five compositas, aut organicas
 vidi solent. Ad *similares* five *simplices*, si re-
 loqui velimus, non nisi *fibræ* pertinerent, ex
 quibus omnes reliquæ partes mirabili artificio
 nt compositæ; attamen latiori sensu Ana-
 mici etiam huc referunt omnes partes se-
 ntes, ad sensum quasi *simplices* five *simila-*
 s, id est reliquis organicis, ut digito, manu,
 orde, pulmone &c. simpliciore : dum illæ,
 cet non ubique omnes, ad harum compo-
 ionem concurrunt. Tales sunt: arteriæ, ve-
 e, nervi, membranæ, ligamenta, muscoli,
 ndines; pinguedo, vasa lymphatica, vasa la-
 ea, ductus excretorii, ossa, cartilago, ungues,
 li, glandulæ; reliquas partes solidas ad *dissi-*
 ilares seu *organicas* referunt: easque rursus
nobiliores & *ignobiliores* dividunt, prout ma-
 rem aut minorem usum five necessitatem ad
 tam obtinent.

23. *Fibra* est pars simplicissima, tenuis, in-^{*fibra.*}
 ar fili subtilis, ad omnium reliquarum partium
 onstructionem destinata. Hinc quædam
 oræ sunt duræ, ut osseæ; reliquæ in ceteris
 artibus molliore. *Ratione situs* sunt vel rectæ,
 el obliquæ vel transversæ, annulares, spirales:
 prout partium conformatio & usus hoc requi-
 unt.

24. *Arteriæ* sunt canales five vasa elastica, ^{*arteria.*}
 ulfantia, conica, sensim angustiora, tandem
 minutissima, sanguinem ex corde ad omnes

vena.

reliquas partes deferentia. *Vena* vero vasa instar coni inversi, non pulsantia, sanguinem aliosque humores, a partibus ad cor reducentia.

nervus.

25. *Nervi* sunt partes albicantes, terete specie filorum absque manifesto cavo, a cerebro & medulla spinali ad omnes corporis partes extensæ, sensui, motui, & nutritioni inservientes.

membrana.

26. *Membranae* sunt partes ad similitudinem lintei vel chartæ expansæ, ex variis filamentis & vasculis compositæ, & variis usibus destinatæ. *Tunica* a membranis haud differunt.

tunica, ligamentum.

Ligamenta quoque pleraque vix nisi usu ab eis distincta sunt, & præsertim ubi partes, præcipue ossa, firmiter coniungenda, hoc nomen accipiunt. Dantur tamen etiam ligamenta quædam nervis vel tendinibus fere similia quasi teretia, & a membranis diversa, ut in femoris, tibiæ & patellæ iuncturis.

musculus.

27. *Musculi* sunt partes illæ corporis rubicundæ, quas *carnes* vocamus, ex fibris contractilibus & vasis constantes, instrumenta motus constituentes. *Tendines* vero sunt horum partes albicantes continuæ, firmiores & tenaciores, extrema illorum maxime constituentes: quæ si membranæ aut lintei in modum sunt expansæ, *aponeuroses* appellari solent.

tendo & aponeurosis.

pinguedo.

28. *Pinguedo* est substantia crassa, oleosa, in cellulis membranaceis ubique fere in corpore a sanguine secreta & collecta, usibus variis

dicata : a qua *medulla ossium* vix nisi loco *medulla*
subtilitate differt. a)

29. *Vasa lymphatica* sunt canaliculi subtiles, *vasa lym-*
lucidi, liquidum tenue, fere aquosum, a *phatica &*
am plurimis partibus more venarum versus *lactea.*
r revehentes. *Vasa lactea* vero sunt fimi-
canaliculi, in intestinis & mesenterio tan-
m existentes, chylum, id est, liquidum
teii coloris, ab alimentis digestis oriundum,
intestinis fuscipientes, & per mesenterium
peculiarem ductum deducentes : hinc spe-
es sunt venarum.

30. *Ductus excretorii* dicuntur canales, li- *ductus ex-*
uidum, in certis glandulis aliisque visceri- *cretorius.*
is secretum, fuscipientes, & in destinata lo-
excernentes.

31. *Ossa* sunt partes corporis durissimæ, al- *ossa.*
e, sensus expertes, fulciendis, defendentisque *cartilagi-*
ollibus destinata. *Cartilagines* vero voca- *nes.*
us partes ossibus analogas, flexiles, lubri-
s, & elasticas, nihil plerumque, vel parum,
medullosi continentes, varios usus præstan-
s.

32. *Ungues* ad cartilagines aliquo modo *ungues*
cedunt, suntque laminæ, quasi corneæ, ex-
temis digitorum manuum & pedum impo-
næ. *Pili* sunt filamenta variis in partibus *et pili.*
cor-

Possset quoque pinguedo ad partes fluidas referri, si in
vivis oleosum sine cellulis in abstracto consideraretur : quia
vero in anatome solida reperitur, & una cum cellulis
consideranda, eam solidis annumerare malui : & a variis
etiam ad eas refertur,

corporis, præsertim vero in capite, longè extra cutim propullulantia.

33. *Glandulae* sunt partes peculiaris habitus *a)*, (sive, ut veteres dixerunt, *peculiaris carac-*
glandula. ex congerie minutissimarum arteriarum, venarum, nervorum, & plerumque etiam ductuum excretorio, conflatae, propria membra cinctae, variae figurae, coloris, & consistentiae; usibus diversis, ut plurimum tamen secretioni alicuius liquidi, destinatae. De omnibus vero his partibus similaribus suo loco plura.

34. FLUIDAE sive contentae, sunt *chylus, lactus, sanguis, serum, lympa, spiritus, saliva, mucus oris, bilis, liquor pancreatis, ventriculi, intestinorum, oesophagi, cerebri, oculorum, thoracis, pericardii, abdominis, tunica vaginalis testium, genitura sive semen cum liquido prostaticum; mucus narium, tonsillarum, articularum, urethrae, uteri, vaginae et tubarum uteri; humor ovulorum & cui fetus innascitur; cerumen aurium, urina, sudor.*
partes fluidae.

35. Dividi solet doctrina anatomica in *Osteologiam*, quæ duriorum; & *Sarcologiam*, quæ mollium partium naturam explicat. De prioribus primo agere consultum ducimus, qui fundamentum & quasi basin præbent posterioribus, utpote quæ melius post eorum cognitionem intelligi possunt.
divisio anatomes.

DE

a) vid. hac de re Dissert. sub præsidio nostro Altorfii habita, de vera *Glandulae* appellatione; vel infra *Adenologiam* nostram.

DE OSTEOLOGIA,

& quidem primo

DE OSSIBVS IN VNIVERSVM.

Qui corporis humani perfectam cognitionem desiderat, ante omnia exactam eius ossium sibi comparet notitiam.

37. *Obiectum osteologiae* sunt ossa (§ 31) exacta & recentia, adultorum & infantum: quo etiam *periostrum, medulla, ligamenta & cartilines* pertinent. *obiectum.*

38. *Compages* aut coniunctio artificialis ossium, naturali similis, vel etiam connexio eorum: ligamenta naturalia, ablati carnibus & membranis sine coctione, *sceletus* vel *skeleton* appellatur: atque hoc quidem naturale; illud, artificiale. *skeleton.*

39. Considerantur ossa *ve theoretice* vel *prae-* *consideratio duplex.*
te; priori modo: si tantum conformationem eternam & usum eorum perpendimus; posteriori vero, si 1. ad interiora lustranda, distinguuntur; 2. si, ad articulorum structuram notandam, ligamenta circa iuncturas in cadaveribus dissecantur; & 3. si ad conservationem, *skeleton* extruendum, praeparantur.

40. *Substantia* ossium considerari potest vel *substantia.*
chemice, vel *anatomice;* hoc, in embryonum infantum; illud, in adultorum ossibus, mens peragitur.

41. Si examini *ehemico* in retorta subiiciuntur, observatis ignis gradibus, producantur, *consideratio chimica.*
ua, sal, spiritus, oleum; remanente substantia terrea in retorta, figuram ossium adhuc retinente, sed

sed fragili : spiritus vero rursus in aquam, & oleum, resolvi potest; hinc ossa ex quatuor constant principiis, sive elementis, arctissimè in duram talem substantiam compactis.

considera-
tio anato-
mica.

42. Si anatomico cultro examinantur, primum in generationis principio *membranas* molles æmulantur *a)*, quæ ex variis fibris & valvulis subtilissimis sunt compositæ, a quibus suum incrementum & nutrimentum capiunt. Hæ fibræ & membranæ, lymphæ in eis inspissata, sensim fiunt duriores & quasi cartilagineæ, atque lamellas componunt: primis vero lamellis variis deinde nova fibrarum & lamellarum sensim inducuntur strata sive plana *b)*, quæ tandem firmiora reddita, & ope fibrillarum obliquarum transversarum, claviculis quasi similium *c)*, arctius compacta, os tandem constituunt quod, quo crassius, eo plures fibræ & lamellæ sibi invicem incumbunt, foraminula & interstitia relinquentes, recta, obliqua, longitudinalia, transversa, succo pingui medullosa repleta. *d)*

differentia.

43. Differunt ossa quantitate, cavitatibus, figura & usu, ut ex specialiori consideratione manifestum erit: sed antequam ad hanc accedamus, *generalia* adhuc *quædam* de ossibus præmittamus, necesse est.

generalia
de ossibus.

44. In quovis osse *consideranda* occurrunt, 1. os ipsum, 2. *cavitates* in eo occurrentes, 3. ossium coniunctiones, & 4. usus.

45. In

a) vid. Harveus de Gener. animal. Exercit. LVI. Kerkring Osteogenia fœtus. Ruyschius Thesaur. Anat. VI. Tab. I. II & III. *b)* Malpighius Anatome plantarum. *c)* Gagliard Anat. ossium part. I, cap. obs. II. *d)* Flavers Osteologia

45. In osse ipso consideramus tria, 1. corpus ossis, quod *diaphysis* audit *Galeno e*); 2. apophyses; 3. epiphyses.

46. *Diaphysis*, sive *corpus ossis*, dicitur pars ossis principalis & maxima, quæ in pueris primum indurescit, & reliquarum quasi fundamentum est. Adeoque eius substantia tam externe, tam interne probe consideranda est, ut de figura eius tanto melius iudicare valeamus.

47. *Apophysis* est ossis protuberantia sive ex-*apophysis*. crescentia ex corpore (46) enata, cuius veritas est continua, uti ramus pars continua arboris, interea tamen eius substantia semper magis spongiosa est, quam reliqui ossis.

48. Varia hæc habet synonyma: nam protuberantia, prominentia, protuberantia, eminentia, tuberculum, tuberositas &c. idem (47) fere significant Anatomicis.

49. Ob varium situm, usum, & figuram, tria recepit cognomina: alia enim coracoides, scapularis vel mastoides, glenoides, coracoides, styloides, condyloides, pterygoides, molaroides, sive dentiformis, anchoroides, spinosa, recta, obliqua, transversa, superficialis &c. dicitur; quædam caput, collum sive cervix, condylus, corone, spina, supercilium vel trochanter &c. appellatur: ut in speculi ossium demonstratione indicabuntur singulæ.

50. Vfus apophysium generalis est 1. ad membrum articulationem facere, sive ea sit cum alio sine motu, 2. musculis originem & insertionem

tionem præbere commodiorem, eorumque sæpe vim augere 3. defendere alias partes. Specialis vero usus in privato ossium examine indagabitur.

epiphysis.

§ 1. *Epiphysis* (45.) est ossiculum ossi maiori vel principali (46) interventu cartilaginis ac natum: cui in iunioribus non est continua, sed mediante cartilagine tantum contigua; hinc etiam ossis *appendix* dicitur.

§ 2. Præcipua circa epiphyses notanda sunt 1. In infantibus eas omnes esse cartilagineas, quæ quidem sensim indurescunt, attamen semper spongiosæ manent. 2. Plerasque in adultis degenerare in apophyses. 3. Non concre-scere per planam superficiem, sed per inæqualem, sive mutuum ingressum cum corpore ossis. 4. Earum coniunctionem & naturam melius patere in iuniorum ossibus, quam adultorum: 5. Circa hunc coalitum corpus ossis quoque esse spongiosum & tenerrimum.

§ 3. *Usus epiphysium* (51) in adultis & infantibus varius est.

§ 4. *In adultis* 1. ossibus medullosis pro operculo esse videntur, ne medulla effluat, aut nimis facile transfudet. 2. Fabricæ articulorum cum motu amplitudine sua famulantur, ut motus certior esse possit. 3. Cellulis suis conferunt ad levitatem ossium. 4. Prominentiis suis circa tendines vim musculorum augent. 5. Musculorum extremitatibus locum insertionis ampliorem præbent. 6. Ligamentis, quæ articulationibus inserviunt, firmiorem cohesionem largiuntur, & introitum concedunt vas-sis sanguiferis.

§ 5. *Usus*

55. *Vsus in infantibus* sunt: 1. ut hi ob molliem epiphysium in utero melius complicari, & in angustiori spatio contineri queant. 2. Ut ossa, quamdiu homo crescit, commodius elongari & ad debitam magnitudinem extendi possint. 3. Ut in pueris impediunt frequentiores fracturas, quæ alias sæpius & facilius acciderent frequenti ipsorum lapsu.

56. *Cavitates* (44) aliæ articulationum gratia *cavitates* actæ sunt, aliæ vero ob alias causas. Priores vel *capule*, sive *acetabulum*, vel *glene* vocantur, in ossibus recentibus profundiores existentes, quam in exsiccatis: ob eminentias cartilagineas in eis ablatas, quibus firmior fit articulatio. Humorem continent oleosum, mucosum, ex peculiaribus glandulis, *mucosis* sive *mucilaginosi* actis *a*), & ligamentis *b*) articulorum (forte etiam ex ipsa medulla) secretum: qui ossa, pro motu faciliori, lubricat.

57. *Cavitates articulationibus non inservientes* sunt vel internæ, vel externæ. Illæ, si maiores, *medullam*; si minores, *succum rubrum medullosum* sive oleosum continent, & cellulae seu *vernula ossium* vocantur.

58. *Externæ*, pro diversitate figuræ, fovea, foveola, foramen, canalis sive ductus, sinus, sulcus, incisura &c. audiunt.

59. *Ossium coniunctiones sive articuli* (44), de
B qui

Havers loc. cit. *b*) Ex ligamentis etiam hunc humorem ex parte secerni iudico, (licet *Haverus* hac de re sileat) quia glandulae illæ non in omnibus articulis demonstrari possunt, & membranaceæ partes, quales etiam ligamenta sunt, aliis in locis certos humores secernunt.

quibus plerique Autores ante sceleti sive ossium specialem explicationem agunt, a tyronibus meo quidem iudicio, recte percipi vix possunt: nisi prius speciali ossium notitia instructi sint: idcirco de illis in fine huius osteologiæ dictur sumus, & iam ad *sceleti* (38) *explicationem* progredimur.

DE SCELETO.

divisio.

60. *Dividitur* sceleton in truncum & extremitates seu artus. Truncus constat ex capite spina dorfi, ossibus pectoris atque innominatis.

61. *Caput* est, quod supremæ colli vertebra insistit; ac dividitur vulgo in *cranium*, & faciem sive *maxillas*: quibus vero etiam os hyoides addi potest.

de cranio.

62. *Cranium*, quod & *calvaria* dicitur, est pars capitis, magnam illam osseam cavitatem efficiens, quæ cerebrum alias includit: adeoque omnia ossa, quæ ad hanc cavitatem conficiendam conspirant, *ossa cranii* nobis vocantur.

63. In eo generatim consideramus figuram ovalem, superficiem anteriorem convexam & posteriorem concavam; magnitudinem, crassitatem inæqualem; substantiam, ex duplici tabula sive lamella, interiori & exteriori, cum interiecta *diploë*, sive *medulla*, constantem compositionem ex diversis ossibus; connexionem per futuras; usus.

64. *Ossa* huius (62) *octo sunt*: nimirum os frontis, duo parietalia, duo temporum, occipitale, sphenoides, & ethmoides. a)

65. O.

a) Ossibus cranii nonnulli Autores varia adhuc alia adscribunt.

65. *Os frontis*, quod & *coronale* dictum, est *os frontis*.
 primum cranii os : duplex in infantibus, sed
 plurimum simplex in adultis; quandoque
 in medio & in his ad nasum usque bifidum. In
 hoc notamus situm, figuram irregularem, con-
 nexionem, crassitiem, superficiem internam; in
 qua fovea & eminentia annotanda, quibus ad-
 hæret sinus longitudinalis duræ matris; super-
 ficiem externam, in qua locus, ubi siti sunt mu-
 sculi frontales, temporales, atque annulus car-
 tilagineus musculi trochlearis oculi; apophy-
 ses septem: quarum sex ad orbitas conficien-
 das concurrunt; septima vero ossa nasi susten-
 tet: denique sinus frontales, eorum usum &
 variam magnitudinem ac constitutionem in
 adultis; a) ut & mirabilem illorum ortum at-
 que genesin in pueris. b)

66. *Ossa parietalia, ossa bregmatis, verticis, si-* *ossa parie-*
ncipitis quoque dicta, secundum & tertium *talia.*
 cranii os constituunt: in quibus notamus si-
 tum, figuram fere quadratam, magnitudinem,
 connexionem, crassitiem; superficiem exter-
 nam, in qua situs partis musculi temporalis seu
 otaphitis; superficiem internam, in qua sul-

B 2

ci

nomina, quam quæ nos adduximus: quia vero reliquæ
 apud scriptores præcticos vix occurrunt, & tyroni-
 bus nominum copia confusionem creat, hic ea omittere
 consultum duximus, retinendo solum usitatiora. Miror
 vero recentem de ossibus scriptorem nonnulla horum os-
 sium nomina omittere, & nova, eaque inusitata substituere.
 vid. *Schneider*. de Catarrh. fig. 1. p. 484. *Palsin*. Osteolog.
 Tab. I. & II. & dissert. de cavitatibus ossium capitis, Altor-
 fii 1722. edita.

De foraminibus eorumque usu, tam huius quam reliquorum
 cranii ossium, infra coniunctim dicemus.

ci, arbusculas repræsentantes, ab arteriis duræ matris impressi, & foveæ, tam pro sinu longitudinali & laterali, quam pro glandulis duræ matris; tandem locum, *bregma*, in infantibus *Fontanella* sive *fons pulsabilis*, dictum, & quo modo in his generetur.

temporum.

67. *Ossa temporum*, *squamosa* & *petrosa* quorūque dicta, quartum & quintum os efficiuntur atque in his consideramus situm, figuram valde irregularem, connexionem, *substantiam* squamosam & petrosam; *apophyses* quatuor, iugalem seu zygomatīcam, mammillarem seu mastoideam, styloideam, a) & petrosam; locum ubi articulatur maxilla inferior; *meatum auditorium*; locum, ubi ligamentum auris inferitur iuxta processum mastoideum; *fossas sigmoidæas*, ubi sinus laterales duræ matris siti; *incisuram* sub processu mastoideo, ubi musculus biventer oritur; *foveam*, in qua sinus venæ iugularis latet; sinus in apophysi mastoidea in cavitatem tympani sæpe hiantes. Statum denique in foetu, ex parte petrosa, squamosa, & circulo osseo sive annulo, cuius rimæ membrana tympani innascitur, qui tandem successu temporis in meatum auditorium osseum mirabiliter expanditur.

ossa auditus.

68. In osse temporum, & præsertim in parte petrosa, notanda adhuc sunt CAVI-

TAS

a) Hanc in iunioribus per articulationem (quæ interventu cartilaginis fit) cum motu iungi ossibus temporum, notavit *Ruyfchius*: Advers. Anat. Decad. III. pag. 30: hinc in plerisque craniis eam deficere. Hæc vero cartilago in senibus sæpe fit ossea, & sic cum osse principali fit pars continua.

OS TYMPANI, & in ea OSSICVLA AUDITVS, vulgo quatuor, & totidem notabilia *foramina*. Ossiculorum primum *malleus* dicitur; in quo consideranda caput, cervix, manubrium, cum membrana tympani iunctum; duæ apophyses, quarum altera longissima, *Raviana* male dicitur, a) quia a *Folio* iam descripta b) pro insertionem musculi mallei externi. Alterum *Incus*: in qua coram, fovea pro articulatione cum malleo, & duo crura: quorum longiori iungitur ossiculum tertium, *Stapes* dictum. In hoc notanda sunt, incudis cruri longiori iunctum; *basis*, festinæ ovali labyrinthi insistentis & duæ partes generales, internam superficiem sulcatam habentem. Quod vero multi pro quarto ossiculo ausus numerant, inter incudem & stapedem collocatum, atque *os orbiculare* appellant, mea eadem sententia, non est peculiare ossiculum; sed tantum epiphysis cruris longioris incudis. FORAMINVM vero primum, cui stapedis basis insistit, *fenestra ovalis*, alterumque, vicinum, *fenestra rotunda* appellatur. Hoc cochleam; illud, ad vestibulum ducit. Tertium foramen per canalem ad os definit, qui *tus* sive *tuba Eustachii* audit: per quem nonnulli fumum tabaci, ore attractum, per auresmittere, & surdi, ore aperto, melius audire possunt; quartum vero in cellulas processus mastoidei hiat. Omnia hæc auditui inserviunt.

B 3

69. In-

Bærhaave Instit. Med. cap. de Auditu.

Ed. Folii nova auris internæ descriptio, & Bartholin. Anat. reformat. pag. m. 715. qui ultimus vero eam non satis bene delineavit.

69. Intima pars auris, ob varios mirabile meatus, LABYRINTHVS dicitur: in qua notanda cavitas, medium labyrinthi constituens, *vestibulum* nominata: a cuius altera parte occurrunt *tres canales, semicirculares* dicti, maximus, medium & minimus, quinque orificiis in vestibulum hiantes; ac altera parte *cochlea*, spiras duas cum dimidia perficiens: in qua *nucleus*, & canalis a *lamina spirali* in duos divisus: quorum superior in vestibulum hians, *scala vestibuli*; inferior, per fenestram rotundam cavum tympani respiciens, *scala tympani* nuncupatur a *Valsalva*. ^{a)} Denique *canalis* nervi auditorii, i. communis amplior, in quo foraminula ad labyrinthum. 2. Proprius, angustior, & longior: desinens partim exiguo foramine in cranii cavum, partim in *aqueductum Fallopii*. ^{b)}

occipitis,]

70. Os Occipitis, sextum cranii os est: in quo consideramus situm, figuram irregularem; statum in infante recens nato, ubi ex quatuor plerumque frustis constat; connexionem, crassitiem insignem; apophyses tres duas condyloides, pro articulatione cum superiora vertebra, totoque capite sustentando & tertiam ad sellam equinam, cui iungitur extensam. In superficie interna apud adultos, crucis figuram; cui sinus longitudinalis & laterales, itemque processus duræ matris adhærent: & intra hanc, quatuor excavationes, in quibus cerebri lobi posteriores & cerebellum recubant. In superficie externa eminentia

a) Tract. de Aure humana.

b) ibid. Tab. VII, fig. 4.

ninentias & foveas varias superficiales post
ramen magnum, quibus varii capitis mus-
culi inferuntur.

71. *Os septimum cranii, sphenoides, cuneiforme & basilare* dicitur : quia instar cunei reli-
quis calvariae ossibus est infixum, & tanquam
basis pleraque, ut & quaedam maxillae superio-
ris ossa, quasi sustinet. Figura eius valde
regularis est, unde nonnullis etiam *multiforme*
audit. Dividi potest in basin & latera sive
as, ad tempora expansas, ac deinde in par-
tem superiorem & inferiorem. In parte su-
periori basis ostendit sellam equinam sive tur-
cam, sub qua *sinus* latet, *sphenoides* dictus,
qui quandoque duplex, & in nares hiat,
quandoque nulla in nares apertura adest. a)
terdum etiam totus hic sinus deficit. Apo-
phyfes habet tredecim, sex internas sive supe-
iores, iuxta sellam equinam : & septem ex-
ternas sive inferiores; quatuor scilicet *pterygoi-
as*, musculis originem praebentes, duas sty-
loides exiguas, musculis certis uvulae trochleae
officium praestantes; & septimam, quae vo-
cerem subit; fossas tres, unam in sella equi-
na, duas inter apophyses pterygoideas.

72. *Os ethmoides, seu cribriforme*, octavum *cribrosum*
cranii os constituit. In hoc considerata situs,
extensio per nares & orbitas, figura, connexio,
status in infante; apophyses quatuor, ut *crista
nulli*, septi narium pars superior, & *duo ossa spon-
giosa*

B 4

quod etiam in diff. de cavitatibus ossium capitis notatur.
pag. 15.

gioſa (quæ & *turbinata* vocantur) *ſuperiora a*), quibus *Morgagnius* duo minora addit, *b*); pars cribroſa, cavernoſa, & papyracea ſive plana; ſub qua varii *ſinuli* diverſæ figuræ, magnitudinis & numeri *c*); & denique *uſus* diverſus diverſarum eius partium.

73. Omnia hæc oſſa in infantibus recens natis nondum ſatis perfectæ ſunt, ſinus & meditullium fere deficiunt, fibræ oſſeæ in generatione plerorumque a centro in ambitum, radiorum inſtar, feruntur, & pleraque eorum ex diverſis adhuc conſtant fruſtis : neque futuræ adhuc adſunt ; varia tamen ſæpe interiecta oſſicula triquetra.

ſuturae.

74. Verum in adultis cranii oſſa iunguntur ut plurimum per *SVTVRAS* ; quæ vel *communes* ſunt vel *proprie*. Hæ vel *veræ* dicuntur; quando oſſa denticulatis quaſi eminentiis inæqualibus, extus fere tantum conſpiciendis, mirabili artificio ſibi invicem iunguntur : *d*) ut coronalis, ſagittalis, lambdoidea ; vel falſæ ſeu ſpurie : ut ſquamofæ oſſium temporum & parietalium, imo etiam oſſis frontis & ſphenoidis eo in angulo, ubi cum parietalibus coeunt.

a) Multi has partes ſpongioſas pro peculiaribus oſſibus habent : verum quia in annioſioribus continuæ ſunt cum parte reliqua, rectius pro partibus oſſis ethmoidis haberi poſſunt.

b) *Adverſ. anat. VI. Tab. II. fig. 3. qq*, ubi & maiora delineantur.

c) conf. *Morg. Adv. l. p. 38*. Sed ſinum in hoc oſſe a nemo indicatum & a ſe primum detectum eſſe ſcribit *Santorinus obſ. anat. p. 89* : an vero a me hic non ſit indicatus, aliis diiudicandum relinquo.

d) *Winſlow Hiſt. Acad. Reg. Scient. An. 1720*.

eunt. *a*) *Communes* vulgo *transversalis*, (os frontis in facie cum subiectis ossibus iungens) sphenoidalis, ethmoidalis, zygomatica *b*) &c. appellantur; quæ vero exiguæ sunt considerationis. Nonnulli calvarias futuras prorsus destitutas viderunt. *c*)

75. Inter futuras præsertim lamdoideam & gittalem, hinc inde in craniis variis distincta quædam parva officula quandoque reperiuntur, a nonnullis ob figuram qualemcunque *quætra*, ab aliis *Wormiana* dicta, (quamvis *Wormiano* iam nota fuerint) incerti situs & figure, per futuras reliquis iuncta: quæ a quibusdam speciatim contra epilepsiam prædicantur. *d*)

76. *Vsus suturarum* est 1. ut dura mater firmissime ibi cranio iungatur & pericranio; 2. ut ob ossa cranii, in infantibus ibi disiuncta, caput facilius extendi & crescere queat; 3. ut cerebri transpiratio, imprimis in iunioribus, utpote humidioribus, fortior ibi possit fieri; 4. ut præcaveantur aliquo modo magnæ cranii fracturæ; 5. forte etiam, ut medicamentum ibi applicata, præsertim in iunioribus, melius penetrare queant.

B 5

77. A

Idem, ibidem cum Vesalio, qui & graves fabricæ rationes reddunt.

Nonnulli adhuc varias futuras communes recensent: ut nasales, palatinas, lacrymales &c. quæ vero rectius ad harmoniam referuntur.

Fallopianus de Ossibus. conf. Dissert. *Meibomii* de Sutura cranii, *Altorfii* sub præsidio I. M. *Hoffmanni* defensa & *Connors* Dissert. de stupendo ossium coalitu.

Cranium asservo, ubi sutura lamdoidea duos digitos transversos lata est, & plus quam viginti talia officula distincta continet.

maxilla.

77. A cranio pergimus ad MAXILLAS : fulcris quibus intelligimus reliqua capitis ossa, fulcris anteriori parte cranii sita, sed ad cavitatem eius nihil facientia : quarum altera superior dicitur, & immobilis cranii ossibus adhæret, altera inferior, quæ mobilis est, pro usu multiplici.

78. Longitudo earum minor est, quam in omnibus aliis animalibus, si respectum habemus ad corporis magnitudinem : procul dubio ad pulchritudinem maiorem homini conciliandam.

superioris
ossa.

79. Superior componitur ex 13. ossibus, & 16. dentibus, si numerus eorum completus est.

80. Inter 13. illa ossa sex sunt paria : quorum 1. lacrymale. 2. nasale. 3. iugale. 4. maxillare. 5. spongiosum inferius. 6. palatinum, & ultimum impar, *Vomer* vocatur. a)

81. Coniunguntur inter se per iuncturam ad sensum æqualem, quæ *harmonia* dici solet.

82. Primum par, *ossa lacrymalia* seu *ossa unguis*, vocatur : in quibus consideramus originem nominis, situm, magnitudinem & circumferentiam, connexionem, substantiam tenerrimam.

a) Multi hæc ossa maxillaria non nominibus, sed solum numero, distinguunt : ut par primum, secundum, tertium &c. quod vero, quia tyronibus facile erroris & confusionis ansam suppeditat, & leviori negotio nomina hæc, quam numeri, retinentur ; dum numerus nullam ideam de osse exhibet, atque eodem iure lacrymale, nasale, iugale, palatinum &c. primum vel secundum dici potest, & auctores etiam in modo numerandi non conveniunt, nominibus potius indicatis utendum esse censeo, quam numeris.

rimam ; fulcum , pro conformatione cal-
lis nasalis ; usum ; operationem chirurgi-
m, quæ in fistula lacrymali ibi fieri solet.

83. Secundum par sunt *ossa nasi* : in quibus
um, circumferentiam, figuram, substanti-
n, superficiem utramque, connexionem, lo-
um, ubi cartilagines narium adhærent, &
um notamus.

84. Tertium, *ossa iugalia sive zygomatica*,
æ & ossa malæ vocantur, constituunt : in
uibus etymologiam, situm, circumferenti-
m, substantiam duram, connexionem, apo-
nyfes quatuor, loca ubi muscoli masseter &
ygomaticus originem habent, foramina cum
orum usu.

85. Quartum par, *ossa maxillaria* efficiunt:
a quibus consideramus circumferentiam,
magnitudinem, situm, nexum, apophyses qua-
tor : 1. iugalem, 2. nasalem superiorem, 2.
nasalem inferiorem, cui septum nasi iungitur,
4. palatinam a) ; excavationes palatinas &
asales ; dentium alveolos ; *sinum*, vulgo *an-*
trum Highmori dictum b), quamvis *Vesalio* c)
olumbo, *Bauhino*, aliisque iam cognitum, huius-
que magnitudinem, & orificii sive aperturæ
nus constitutionem in viventibus ; usum
dupli-

Hæ apophyses palatinæ a quibusdam male pro peculia-
ribus ossibus, sub *offum palatinorum anticorum* nomine,
describuntur : quia nunquam sunt a reliqua huius ossis
parte distincta.

Delineatio eius vid. in *Palsini* Osteolog. Tab. II. fig. 2.
& *Drakii* Anatom. Tab. XVIII. fig. I. & II. Verum
hos sinus quandoque deesse, notavit *Moragnius* Ad-
vers. anat. VI. pag. 116. sed rarissime.

de fabric. Hum. corp. pag. 49.

duplicem ; 1. pro voce, 2. pro muci secretionem ; canalem nasalem ; operationem chirurgicam in certa ozænæ specie.

86. Quintum par *ossa spongiosa* sive *turbinata inferiora* vocatur. Hæc parva sunt, oblonga & friabilia, atque adhærent interiori parti ossis maxillarium (85) & ossibus palatinis in cavo narium. Aeris ad pulmones irruentis frigus temperant, illapsum muscarum aliorumque animalium in fauces impediunt, & membranæ pituitariæ expansionem pro variis usibus augment. *a)*

87. Sextum par, *Ossa palati* constituunt : in quibus notamus valde irregularem figuram & extensionem per nares usque ad orbitam ; corpus & apophyses varias, pterygoideam, nasalem & orbitalem : *b)* fulcum in superiori superficie, cui vomer iungitur ; usum, 1. ad formandum palatum, orbitam & sinum maxillarem ; 2. ad sustentationem membranæ palatinæ & uvulæ ; 3. ad vocem.

88. Vltimum sive decimum tertium maxillæ huius os, quod impar est, ob qualemcunque figuram *Vomer* appellatur : in quo situm ; substantiam, superius crassam, inferius tenuem ; circumferentiam, lamellam duplicem cum interiecto spatio, connexionem, septi narium compositionem, quod anterius, cartilagineum ; posterius, osseum, ex vomere

a) *Santorinus* Obs. anat. p. 88. hæc ossa non pro distinctis ossibus, sed pro apophysibus ossis palati tantum haberi vult. Verum ego ea sæpe distinctissima vidi.

b) vid. de hoc osse *Winslow* in *Histor. Acad. Reg. Scient.* An. 1720. & *Cant.* pag. 20. Tab. 5. fig. 9. & 10.

& processu medio ossis ethmoidis con-
sistens, & usum examinamus. a)


89. Restant hic considerandæ magnæ illæ *orbitæ*,
ossæ, in quibus oculi locantur, *orbitæ* dictæ;
quæ componuntur ex concursu septem os-
sum, nimirum 1. coronalis, 2. sphenoidei,
3. plani, partis ethmoidei; 4. iugalis, 5.
maxillaris, 6. lacrymalis, 7. palatini.

90. In his notamus figuram, principium
superius & fundum angustiores; loca, ubi
musculi oculorum & palpebarum ortum ha-
bent, & ubi *glandula*, *caruncula* atque *saccus*
lacrymalis locantur.

91. MAXILLA INFERIOR est magnum il-*maxilla in-*
lud os mobile capitis, inferiorem dentium *ferior.*
arriem continens; a cuius mobilitate præci-
piuum manducationis negotium dependet.

92. In hac consideramus, 1. os ipsum, 2.
processus.

93. In osse ipso notamus numerum, sta-
tum in infante, (ubi ex duobus constat ossibus)
magnitudinem, figuram, substantiam; ex-
ternam firmam, internam spongiosam; fa-
ciem externam & internam, huiusque mar-
ginem externum & internum; connexionem,
scilicet cum ubi in pueris ex duobus ossibus in
unum coalescit; & eminentiam posteriorem
radicem incisorum, pro variorum mu-
sculorum insertione; mentum sive genium;
apophyses condyloides, cartilagine mobili te-
ctas



hoc, os partem ossis ethmoidei esse vult Santorinus p. 87;
verum & hoc, licet in adultis cum ethmoideo concre-
verit, in iunioribus distinctissimum demonstrari potest.

tectas *a)*, harumque cum ossibus temporum articulatione; & coronoides, earumque usum duos angulos, alveolos dentium; foramina quatuor, duos canales efformantia, & transitum vasis & nervis præbentia. *Vsus* utriusque maxillæ præcipui, sunt manducatio & loquela.

Dentes.

94. Superfunt considerandi DENTES utriusque maxillæ: qui sunt ossa durissima alveolorum maxillarum, instar clavorum, infixa: quorum iunctura *gomphosis* dici solet.

95. In his consideramus situm, in alveolis profundis; connexionem, ope perioestii & gingivarum; colorem naturalem candidum numerum, viginti octo ad triginta duo, in quavis maxilla XIII, XV vel XVI, si numerus est perfectus; divisionem, in *incisores* quatuor, *caninos* duos, qui in maxilla superiori *oculares* vocantur, & *molares* octo, in quavis maxilla, & *dentes sapientie* duos. Porro examinamus eorum basin, eiusque substantiam peculiarem duplicem, lapideam sive vitream & medullarem; radices, modo simplices, ut in incisoriis, caninis & prioribus molaribus; modo duplices, triplices aut quadruplices, ut in molaribus posterioribus. Præterea cavitate illorum, membrana vasculoso nervea investita *b)*, & forminula in singulis radicibus, pro ingressu vasorum, nutritioni & sensui inservientium. Tandem dentium in infantibus ortum

a) quæ accurate delineata vid. in *Morgagn. Adversar.* l. 1. fig. 1. 2. 3.

b) quæ a *Ruysebio* descripta *Thes. Anat.* l. 1. p. 48.

accretionem; mutationem quoque & regenerationem post annum septimum, & quaque in ipsis senibus; coalitum ac collapsum alveorum in senibus mirabilem, post eandem dentium. *a)*

96. Circa dentes præterea etiam adhuc singularia ipsis contingentia hic considerata: ut, quando vel nimis distant, vel inter se *b)*, aut in alveolis plane concresecunt; quando in palato proveniunt, aut saltem extra seriem vel situram naturalem.

97. Vfus dentium, 1. cibos comminuere, loquelæ inservire 3. ad pulchritudinem conservere.

98. *Foramina capitis* eorumque usus, ut membra retineantur, coniunctim hic tractabimus, quæ dividemus in interna & externa: interna vocamus, quæ intra cranii cavitatem bene inspectum veniunt; externa, quæ foris melius patent.

99. *Interna* maiora numeramus undecimaria, nervis, arteriis & venis cerebri transitum habentia; & unum impar, scilicet foramen magnum ossis occipitis, medullæ spinali potissimum, nervis spinalibus accessoriis, & arteriis vertebralibus patens.

100. Speciatim vero *primum par* illorum foraminum, (quod rectius est congeries foraminum

vid. *Ruysschii* Observat. pag. 107. Simile prorsus caput senile ossium ipse asservo: in cuius utraque maxilla omnes dentes deficiunt, & alveoli toti, quousque alias radices dentium pertingebant, omnino consumti & funditus quasi deleti sunt.

Columbus de re anatomica.

num ossis cribrosi) filamentis nervorum primi paris, *olfactorii* dicti, transitum concedit. *Secundum* in osse sphenoides, nervis opticis & vasis sanguiferis; *tertium, inaequale & lacerum* dictum, per tertio & quarto nervorum, ramo primo quinti paris, & pari sexto itemque vasis sanguiferis emissario receptaculorum duræ matris. a) *Quartum*, in osse sphenoides, ramum secundum quinti paris, qui per canalem ossis maxillaris mox infra orbitam pergit, & deinde per maxillam superiorem distribuitur, transmittit; *quintum* vero, sive *ovale*, ramum tertium quinti paris & emissarium duræ matris. b) *Sextum*, exiguum, admittit *arteriam per duram matrem* distributam, quæ ramusculos illos ossibus parietalibus inprimit. *Septimum*, inter sellam equinam & apophysin petrosam, nihil transmittit sed dura matre clausum est, eique arteria carotis incumbit. Per *octavum* foraminum par intrant *arterie carotides internæ*, hinc *foramen caroticum* dici potest, & simul nervus intercostalis egreditur. Hoc foramen canalis est varie inflexus; quo fit, ut in vivis nimius sanguinis impetus in cerebrum multum infringatur. Per *nonum*, in osse petroso, *nervus auditorius*; per *decimum*, inter os petrosum & occipitale, quandoque in duo divisum, *par vagum & sinus laterales duræ matris*, una cum *nervo spinali* egrediuntur. Per *undecimum*, (quod nonnunquam quoque duplex) in osse occipitis, iuxta oram foraminis magni, par nervorum nonum *linquale* dictum, exit.

101. Ir

a) Santorinus Obs, anat. p. 75.

b) ibid.

101. In osse petroso intus adhuc *exigua quædam foraminula* sæpe occurrunt: quorum unum flectit ramulum nervi auditorii ad duram matrem; reliqua, vasa sanguifera ad labyrinthum & organum auditus internum transmittunt. Denique *singularis excavatio ossium cranii ob sinus duræ matris est observanda*; quæ incipit a foramine cæco ante cristam galli, per medium os frontis, infra futuram sagittalem ossium bregmatis, ad medium ossis occipitis excurrent, dividit in duas, quæ horizontaliter utrinque osse occipitis & parte bregmatis antrorsum it, postea singulari flexione descendit ad foramen decimum, ubi sinus laterales in venam gularem se exonerant.

102. *Externa*, in osse frontis, duo sunt *propria*, mox supra orbitam, *supraorbitalia* dicta, maximam partem *nervi ophthalmici Willisii* transmittentia: quorum loco sæpe tantum infura quædam superficialis adest; & *quatuor, communia* cum ossibus planis sive papyraceis in orbita, duo in quovis latere, quæ nervulos & vasa ad sinus ossis ethmodis transmittunt. In *parietali* unum pro transitu venæ e cute cranii sinum sagittalem duræ matris, vel e sinu sagittali ad venas capitis externas: quod vero, quia sæpe deest, a multis prorsus omittitur. In quovis *osse temporum* communia tria: quorum primum est foramen iugale, pro transitu musculi crotaphitis; alterum ampla fovea, pro transitu venæ iugularis; & tertium *ductus Eustachii*, inter os petrosum & sphenoides, ab ore ad aurem internam ducens (§. 68). *Propria*, e-

tiam tria: 1. meatus auditorius; 2. *Aqueductus Fallopii*, inter processum mastoideum & styloideum, portionem duram nervi auditorii transmittens; 3. post apophysin mastoideam, pro ingressu venæ in sinum lateralem; vel e sinu laterali in venas occipitis. a) In *occipitali* duo, quæ canales formant, post apophyses condyloideas, pro transitu venarum vertebraliū in sinus laterales duræ matris: quæ vero foramina modo alterum, modo ambo in multis craniis deficiunt. In *sphenoidæo*, præter internam descripta, & aperturas sinuum in nares, communia cum ossibus palati, quæ sunt aperturæ narium ad fauces: itemque canalem novum in parte suprema processuum pterygoideorum, pro novi emissarii transitu. b) In *ethmoidæo* 1. communia cum osse frontis in interiori latere orbitarum, modo iam indicata; & 2. aperturæ sinuum ethmoidalium in nares. Quibus 3. addi potest *foraminulum cæcum ante cristam galli*, cum osse frontis commune; quod pro firmiori nexu duræ matris, & speciatim sinus longitudinalis infervit; Imo secundum nonnullos ductum transmittit, cum venis nasi communicantem.

maxilla-
rum.

103. Foramina in *maxilla superioris osse maxillari*, 1. post priores dentes incisores, *palatinum anticum* dictum, in nares hians; in viventibus vero & cadaveribus membrana palati ita clau-

a) Hanc sinuum cum venis externis communicationem primum notasse *Lyserum*, affirmat *Bartholinus Anat. Reform.* p. 463.

b) *Santorin, Obs. anat.* p. 75.

ausum, ut nulla in ore apertura conspici, & nihil, quantum hactenus observare potui, transmittere queat *a*), atque, dum per hunc canalem membrana oris iungitur membranæ ararium, pro firmiori illius nexu cum palato servire videtur. 2. *infraorbitale*, nervis quinque paris patens; 3. post dentes molares posteriores: per quæ vasa & nervi ad sinus maxillares ingrediuntur; 4. incisura in latere exteriori fundi orbitæ communis cum osse sphenoidico, pro transitu vasorum ad nares & oculos; 5. *canalis nasalis*, communis cum osse unguis; 6. aperturæ sinuum in nares; & 7. *palatinum posticum*, commune cum ossibus palati, nervos ad palatum transmittit. In *osse iugali*, 1. commune sive iugale; 2. proprium, modo simplex, modo duplex, pro transitu nervi. In *osse palati*, præter commune modo descriptum, adhuc proprium ubi iungitur cum processibus pterygoideis, pro nervorum transitu ad palatum.

104. In *maxilla inferiori* duo in *facie interna*, pro arteriæ, venæ & nervi ingressu in substantiam maxillæ, pro ipsius & dentium nutritioni; & duo in *facie externa*, pro exitu eorum vasorum in gingivas & mentum.

105. Si forte hinc inde in capitis ossibus ad-

C 2

huc

Plerique anatomici recentiores liquidum per hunc canalem ex naso in os influere sustinent, atque hanc ob causam eum *Stenonis transitum a naribus ad palatum* vocant, qui etiam in capite osseo satis apertus & amplus apparet. Verum alias tam angustus, ut neque in vivo, neque in cadavere eum in os hiare, aut setam transmittere, unquam deprehendere potuerim,

huc alia foraminula reperiuntur, vel extraordinaria sunt, (ut quandoque contingit) vel vasculis pro nutritione ossium ingressum concedunt.

os hyoides.

106. Ad capitis ossa adhuc referri solet os, basi linguæ inhærens, & propterea *linguale*, vel ob figuram literæ græcæ υ, *ypsiloïdes* sive *HYOIDES*, item *bicorne* dictum. Nullum aliud os tangit, & in iunioribus ex tribus constat frustis mobilibus, *basi* scilicet, mediam partem occupante; & duobus lateralibus, *cornubus* dictis, quibus lingua connascitur. In adultis vero ad iuncturam eorum cum basi sæpe duo adhuc alia, valde exigua, a multis neglecta, seminis tritici fere figura, reperi, (quæ *triticea* inde dici possunt) quibus ligamenta iunguntur, quorum ope adhærent processibus styloideis. In his ligamentis quandoque, sed rarissime, adhuc alia ossicula reperiuntur; hinc factum est, ut *Vesalius*, qui sex in eis vidit, aliique, undecim frusta ossis hyoidis numerent; sed immerito. Inservit hoc os linguæ pro firma basi, musculique varii, qui tam ad linguam quam laryngem movendam faciunt, ei inserviuntur.

laryngis ossa.

107. Quia *cartilagines laryngis* quatuor quandoque in senibus ex parte osseæ fiunt, nimirum *thyroides*, *cricoides*, & duæ *arytænoides*: hinc aliquo modo ad ossa referri possunt. Quoniam vero eorum natura & usus melius intelliguntur, quando recentes, quam quando exsiccata: plura de iis hic non dicemus, sed ubi de pulmone agemus, & nunc ad ossa trunci examinanda progredimur.

DE

DE OSSIBVS TRVNCI.

108. TRVN CVS, tanquam secunda pars scē-
eti, constat ex *spina dorsi*, ossibus pectoris,
ossibusque innominatis.

109. SPINA DORSI, Græcis *rhachis* dicta, *spina dorsi*.
vocatur columna illa ossea, flexilis, a capite
ad anum usque extensa, ex vertebra potissi-
mum et osse sacro constans, ac spinalem me-
dullam continens.

110. Hanc consideramus primo generatim,
deinde speciatim.

111. Generatim notanda occurrunt, no-
men, figura quasi pyramidalis *a*), & fere ut
latera *f* inflexa; huius figuræ ratio, connexio,
& usus.

112. Speciatim vero perpendenda *divisio spi-*
ne in collum, dorsum, lumbos, os sacrum &
occygis.

113. Collum, dorsum & lumbi constant *vertebrae*.
ex *vertebris* sive *spondylis*: in quibus nunc rur-
us quædam in universum, quædam sigillatim
notanda.

114. In vertebra in universum consideran-
da sunt numerus, viginti quatuor; & in qua-
bet basis sive corpus, (quod anterius & ad
latera convexum est, posterius sinuatum, pro
spinæ medulla recipienda, substantiamque ha-
bet spongiosam, tenui lamella ossea cinctam)
epophyses primo duæ, e parte posteriori cor-
poris provenientes, ex quibus mox aliæ sep-
tem, nimirum una spinosa, duæ transversæ, duæ

C 3

supe-

1) vid. de hac *Winslow* in Hist. Acad. Reg. Scient. A, 1720.
in Memor. pag. 456. edit. Amstel,

superiores, duæ inferiores; epiphysesque cartilagineæ; articulatio, qua quælibet recipit alteram, & vicissim ab altera, mediante cartilagine recipitur; foramen unum proprium magnum, pro transitu *spinalis medulla*; & quatuor communia, sive dimidia, duo in quovis latere, quæ coniunctim viginti quatuor foramina in quovis latere columnæ huius conficiunt; per quæ medullæ nervi e medulla in spinam transeunt. Foraminula minora, in corpore vertebrarum potissimum conspicua, vasibus sanguiferis pro nutritione ingressum concedentia.

115. In *adultis* ex uno vertebræ constans frusto; in *infantibus* vero & pueris ex tribus corpus enim & duo latera distincta sunt ossa & adhuc defunt apophyses spinosæ.

colli.

116. COLLUM septem constat vertebris in quibus rursus quædam generatim, quædam speciatim considerata se offerunt.

117. Generatim colli vertebræ reliquis sunt minores, substantiam tamen habent cæteris solidiorem. Corpus minus rotundum & anterius quasi compressum est: superius, sinuatum; inferius, convexum. Pleræque hæ vertebræ *apophyses* habent novem; nam superius e corpore utrinque adhuc una elevatur, pro firmiori articulo. Præterea transversæ & posteriores, spinosæ dictæ, pleræque bifurcæ sunt; & transversæ etiam sunt perforatæ, pro transitu vasorum vertebralium ad caput. *Foramina communia* sex efficiunt paria, pro nervorum colli transitu e medulla.

118. Spe-

118. Speciatim prima vertebra peculiare habet nomen, & *Atlas* dicitur; caret corpore & apophysi spinosa, atque ad figuram anuli accedit. Loco corporis adest arcus osseus, & loco processus spinosi, tuberculum inaequale. Eius substantia reliquis solidior; supra & infra recipit, sed non recipitur. Caput in eius anteriori parte articulatur, quo in articulo caput flectitur & extenditur: foramen proprium, ob corpus deficiens, est omnium maximum; processus transversi reliquis longiores; peculiare quoddam *ligamentum* habet semicirculare, quod processum dentiformem sequentis vertebrae amplectitur. a)

119. In altera vertebra, *Epistrophæus* sive *Axis* dicta, consideramus nomen, in suprema corporis parte apophysin odontoidem sive dentiformem, quæ in apice inæqualis, ubi ligamenta, quibus occipiti necitur, fortiter inseruntur; articulationem instar cardinis cum prima vertebra b), & motum capitis super hac rotatorium.

120. Tertiæ vertebrae quidam nomen *axis* tribuunt; quæ vero nihil habet, quod *axi* simile est; sed in hac & in reliquis colli nihil peculiare occurrit; quod non iam generatim de his fuerit dictum.

121. *Dorsum* sive *thorax* duodecim habet vertebrae: in quibus in universum notamus magnitudinem mediam inter colli & lumborum vertebrae; apophyses spinosas longissimas, dors.

C 4

&

a) vid. *Vesalius* Hum. Corp. fabrica, lib. I, cap. XV. b) ibid.

& (exceptis duabus ultimis) valde inclinatas cartilagines inter corpora minores, quam in collo, ut motum laxum, pectori non convenientem, impedian; apophyses transversas crassiores & fovea cartilagine obducta donatas, ob articulationem cum costis: quem in finem etiam in lateribus duorum corporum iunctorum, si primam & ultimas excipias, una communis eminentia parva excavata conspicitur: foramina duodecim communia in quovis latere, pro exitu duodecim parium nervorum dorsi.

122. Speciatim primam dorsi vertebra quidam *axillarem sive eminentem* vocant, eique suprema costa annectitur. Reliquis nonnulli quoque nomina imposuerunt; sed præter necessitatem: quia rectius numero distinguuntur.

lumborum.

123. *Lumbi* quinque habent vertebra: in quibus generaliter notamus corpora & cartilagines interiectas, crassissima; apophyses transversas longissimas, tenuiores tamen dorsi; spinosas crassissimas, rectas, & reliquis magis diffitas, ob motum hic laxiorem; foramina pro nervis lumbaribus quinque communia in quovis latere. Quidam etiam his peculiaria nomina dant; sed sufficit eas numero distinguere.

os sacrum.

124. In *Osse sacro* notamus nomen, situm, connexionem; figuram triangularem; superficiem externam asperam, & internam lævem, concavam; substantiam spongiosam; basin, apicem; apophyses duas laterales amplas, pro

o articulatione cum ossibus innominatis *a*);
 ophyfes duas superiores parvas, cum cavi-
 bus glenoideis, pro articulo cum vertebra
 inferiori; apophysin inferiorem, pro articulo
 m osse coccygis; *canalem*, pro fine spinalis
 medullæ; *foramina* anteriora & posteriora,
 andoque quatuor, quandoque quinque pa-
 ; diversitatem huius ossis in viro & femina.

25. *Vsus*: 1. spinæ pro basi inservire; 2. pel-
 n cum innominatis efformare & partes in
 contentas defendere; 3. partem inferiorem
 nalis medullæ, seu potius ita dictæ caudæ
 uinæ, in canali suo continere; 4. nervis in-
 tini recti, vesicæ, partium genitalium, mag-
 que cruralibus, & ischiadicis per foramina
 teriora transitum præbere; posteriora vero
 nihil, vel solum nervulos haud percipien-
 s, emittunt; 5. musculis variis originem
 ebere.

26. In adultis unicum os est; quatuor ta-
 en vel quinque frustorum divisiones semper
 endens. In infantibus recens natis, maxi-
 m partem adhuc cartilagineum est, atque
 pueris adhuc ex multis constat frustis.

27. *Os coccygis* etiam in senioribus plerum- *os coccygis.*
 e unicum est; in iunioribus vero ex tribus
 quatuor constat, cartilaginibus ut plurimum
 tinctis, atque in infantibus mere cartilagi-
 um est. In hoc notamus, nomen, situm

C 5

con-

Quod connexus ossis sacri cum innominatis mobilis sit,
 nemine ante se observatum esse vult *Sebelhammer*. Ana-
 lect. diff. VI. § 57. De hoc articulo & ligamentis, qui-
 bus hæc ossa iunguntur, vid. ossa innominata.

connexionem, figuram, substantiam, basim, apicem, apophyses transversas exiles, cavitatem glenoideam, ubi sacro iungitur; motum in alvi difficili excretionem et partu; statum feminis; usum, pro sustentando intestino recto variisque musculis inferendis.

128. In *quadrupedibus* multis hoc os longum est, & ex quamplurimis constat frustis extrorsum reflectitur, & caudam constituit unde etiam *os caudæ* appellatur; in homine vero breve est, & varias ob causas introrsum flexum.

DE THORACE.

thorax.

129. Secunda pars trunci in scheleto *PECTUS* sive *THORAX* vocatur: suntque illa ossa quæ cavitatem efformant, in qua cor & pulmones continentur.

130. In hoc consideramus structuram e parte osseam & ex parte cartilagineam, huiusque compositionis rationem; figuram eius circumscriptionem; magnitudinem, partes tres; *vertebras* scilicet, *costas* & *sternum*. De vertebrais vero iam dictum est: ergo hic tantum de costis & sterno adhuc dicendum restat.

costæ.

131. In *COSTIS*, Græcis *pleura* dictis, consideramus situm, magnitudinem valde diversam; mediæ quippe sunt maximæ, superiores & inferiores minores; proclinationem singularem versus inferiora; connexionem, motum, ligamenta, numerum, duodecim in quovis latere, divisionem in veras & spurias, & usum.

132. *Substantia costarum* partim ossea est partim

rtim cartilaginea: hæc, in parte anteriori;
a, in posteriori. *Figura*, est incurvata; in-
6, concava; extus, convexa, pro cavitatis pe-
oris meliori conformatione.

133. *Partes* costæ sunt corpus & extremi-
es. In *corpore* notamus superficiem inter-
m & externam, labrum interius & exteri-
, superius & inferius, ac sulcum in labro
teriori, superioribus novem vel decem
culptum, vasa costarum condentem. A
ibusdam *propriis nominibus* insigniuntur; re-
us vero numero distinguuntur.

134. In *extremitatibus* anterioribus cartila-
es septem costarum verarum cum sterno
guntur; octava, nona, & quandoque eti-
a decima, cum septima ac simul inter se,
c cartilagines transversas cohærent; reliqua-
n extremitates anteriores liberæ inter mus-
los abdominis & diaphragma hærent. In
remitatibus posterioribus in plerisque duo
servantur capitula, quæ cum vertebrae dorsi
articulos mobiles constituunt a), firmiter
guntur; et tuberculum asperum iuxta ca-
ulum antè, cui ligamentum inferitur,
pitulum vero antè deficit in duabus vel
ous inferioribus. b)

135. In STERNO attendendum ad situm, *sternum*.
uram pugionis, statum in infante, ubi ex pluri-
mis

De mirabili effectu harum articulationum in respiratione,
vid. *Winslow* in *Histor. Acad. Reg. An. 1720*.

De costarum et vertebrarum mirabili coalitu vid. *Connors*
assertat. *Medico physica*.

mis frustis constat *a*); numerum frustorum in adultis, ubi modo unum, modo duo, modo tria; substantiam fungosam; partem eius superiorem, *manubrium* dictam, in qua utrinque cavitas pro clavicularum articulo, cartilagine mobili instructa; partem mediam, quæ angustissima; & inferiorem, quæ latior: cui adhæret cartilago, ob figuram, *ensiformis* sive *Xiphoides* dicta, sæpe bifurcata, non raro tota ossis cavitates laterales utrinque septem, pro articulo cum costis veris. Usus sterni est, 1. partem anteriorem pectoris formare; 2. costas & claviculas sustentare; 3. defendere partes pectori inclusas; 4. inservire insertioni mediastini, pro cordis sustentatione, & musculationi variorum.

ossa innominata, ileum, ischium, & pubis.

136. Ultimam trunci partem constituunt duo ossa, INNOMINATA quidem vulgo dicta, quæ vero in infantibus & pueris ex tribus frustis distinctissimis componuntur, quorum quodlibet suum nomen habet: vocaturque superius ILEVUM; anterius, OS PUBIS sive *pectinis*; inferius & posterius, OS ISCHIVM. Hæc intervallum cartilaginis iunguntur quasi in medio *b*) inferioris illius cavitatis, *acetabulum* dictæ, & ad pubertatem usque ibidem distincta videri possunt, postea vero concreescunt, & in unum os abeunt, ita, ut ne minimum pristinae divisionis vestigium relinquunt.

137. Iun

a) Quomodo in infantibus non solum ex variis ossibus constitet, verum etiam tam ingenti vasorum sanguiferorum copia abundet, videri potest in *Ruyssch. Adversar. Anat. Decad. II. Tab. II. fig. 3.*

b) Male igitur a quibusdam asseveratur, acetabulum in ischio solo existere, cum commune sit omnibus tribus.

37. Iunguntur in parte posteriore utrinque ossi sacro per cartilagines & ligamenta, unumque articulum, licet quodammodo mobilem, ibi constituunt; atque cum hoc osse unitatem, quæ *pelvis* vocatur, conficiunt. In anteriori vero parte ossa pubis inter se per cartilaginem coeunt *a*); ubi quandoque in mulieribus, præsertim iunioribus, in partu difficili, rupta cartilagine, parum a se invicem recedunt *b*), pro foetus egressu facilitando. Cohærent vero hæc ossa ulterius utrinque cum osse sacro per duo adhuc *peculiaria robusta ligamenta* transversum quasi digitum lata, & tres quatuorve digitos longa *c*): quorum superius ab apophysi ischii acuta posteriori ad os sacrum tendit; alterum vero & inferius, *tuberculum ischii* ad os sacrum iungit: quibus tamen non obstantibus, os sacrum & ossa ilei in partu a se invicem secedere observarunt varii. *d*)

38. Ceterum in ossibus innominatis consideranda *figura*; *superficies* externa & interna, origines variorum musculorum; *apophyses* duæ anteriores, superior, & inferior, ac duæ posteriores, ampla & acuta; *incisura* magna inter has duas posteriores; *crista* ilei; *tuberculum* sive *tuberositas ischii*, variis musculis & ligamen-

Santorinus coniunctionem horum ossium non per synchondrosin fieri existimat, l. c. Cap. XI. §. IV.; quod vero aliis iudicandum relinquo.

Autores varii, qui hoc observarunt, citantur in Morgagni Adversar. Anat. III. p. 28. & Stalpart. van der Wiel. Obs. ent. I. p. 289. idem testatur Santorin. l. c.

Id. de his ligamentis Cowperi Myotom. nova. itemque Santorinus p. 175.

Paræus lib. 23, cap. 13. Guillemeau Oeuvr, chir. p. 298.

gamento(137) ortum præbens; *foramen* ossis pubis & ischii commune, ovale, omnium in ossibus maximum & membrana clausum, pro puncto fixo musculorum obturatorum; *acetabulum* a pro femoris articulatione: in quo *minor cavitas* proglandulæ mucilaginosæ situ commodo; & *incisura*, pro vasorum in hanc glandulam & ligamentum teres *b*) femoris ingressu; *locus infectionis* hujus ligamenti; & *supercilia* cum eorum usu notanda.

*differentia
in mare &
femina.*

139. Denique hic non negligenda est consideratio *diversæ constitutionis horum ossium in mulieribus & viris*: in mulieribus enim tenuiores sunt & magis a se invicem distant, quam in viris, præsertim ossa pubis: ut sic non solum cavitatem pelvis, sed & angulum inter ossa pubis & ischii, maiorem efficiant, pro foetus commodiori gestatione, faciliorque in partu exclusione.

usus.

140. *Usus* horum ossium, præter iam indicatos, sunt 1. sustentatio spinæ dorsi, omniumque partium superiorum; 2. iunctura reliqui corporis cum femoribus; 3. musculorum multorum origo; 4. formatio pelvis, quæ pars est abdominis, & defensio partium contentarum.

DI

a) de mirabilibus eius vasis vid. Ruysch. Adversar. Anat. Dec. II. Observ. 1.

b) Haud pridem inter *Andryum* & *Petitum* Parisiis lites ortæ sunt, utrum hoc ligamentum vocandum sit *teres*, an *planum*. Planum revera in cadaveribus deprehenditur, non teres; attamen usu invaluit, ut præstantissimi etiam Anatomici illud *teres* appellaverint.

DE EXTREMITATIBVS SIVE ARTIBVS.

141. *Extremitates* sunt vel superiores, vel inferiores : *superiores*, manus aut brachia ; *inferiores*, pedes audiunt.

142. *Superiores* complectuntur *scapulam*, *claviculam*, *os humeri*, sive *brachii*, *cubitum*, & *manus extremam*.

143. In SCAPVLA, quæ Græcis *homoplata* vocatur *scapula*, consideramus situm, numerum, figuram, connexionem, substantiam tenuem, fatiscam, *caput* cum cavitate glenoidea, (quam nulli *acetabulum scapulae* appellant) *collum*, *basilangulos* duos, superiorem & inferiorem ; *superiorem* & *inferiorem* ; superficiem anteriorem, qua costis incumbit, lævem & conuexam ; posteriorem vero, inæqualem ; *spinam* interea, *cristam*, *acromion*, cavitatem supra- & *in-spinatam*, processum *coracoidem* ; duas incisuras, unam inter acromion & collum, alteram in costa superiori, iuxta processum coracoidem, ubi musculus coracohyoideus oritur ; *mentum* robustum, acromion & processum coracoidem iungens, atque luxationem humerum impediens. *Vsus*, 1. sustinere & conseruare brachium cum trunco, 2. ortum autem præbere multis musculis ; 3. defendere thoracis. Denique notandum, acromium & processum coracoidem in pueris esse cartilagines, postea fieri epiphyseas & tanquam ossa distincta circa annum xvi, circa vigesimum, quod imprimis de processu coracoide valet, adhuc deprehendi.

144. In-

clavicula.

144. In CLAVICULA, quæ primum fere c in foetu, observamus nominis rationem, numerum, situm transversum, & connexum cum sterno atque acromio, interventu cartilaginis mobilis; figuram, quasi litteræ *s*; *substantiam* spongiosam, fragilem; *corpus*, pro puncto fixo musculi pectoralis, deltoidis, mastoidei, & *protuberantiam* pro musculo subclavio, unde etiam ligamentum ad processum coracoidem abit; duas extremitates, rotundiores, quæ cum sterno & costa prima iungitur; planiorem quæ cum acromio articulatur; defectum in plerisque quadrupedibus; usum 1. pro brachii sustentatione, ne nimis, ut in bestiis, versus pectus ruat; quo ipso magna brachio agilitas conciliatur; 2. pro musculorum variorum origine, 3. pro defensione magnorum, quæ subiacent, vasorum subclavio.

os humeri.

145. In OSSE HUMERI sive BRACHII consideramus primo situm, iuncturam, magnitudinem; deinde *corpus*, multis musculis pro origine vel fine inserviens; quod superius crassius est & rotundius, inferius tenuius & compressius: porro *protuberantiam* asperam circum medium, cui speciatim musculi deltoides & pectoralis inferuntur; spinam externam & internam, in duos condylos desinentes; *intus* *cavitatem* insignem, medullam continentem motum, præ omnibus reliquis ossibus liberissimum, sive amplissimum.

146. In *extremitate* vero eius *superiori*, *caput* magnum, levi cavæ scapulæ iunctum, hinc tam facile excidit; *collum*, cui ligamentum articulare nulum

alare & multi muscoli inferuntur ; *sulcum*, cavitas alterum muscoli bicipitis includentem ; & duo tubercula, maius & minus.

147. In *extremitate inferiori*, figuram & articulationem cum ossibus cubiti, opetrium calcutorum & duarum cavitatum ; a) duos *condyles*, sive tubercula, quorum externus extensoribus, internus flexoribus carpi punctum firmum largitur ; duas *foveas*, anteriorem & posteriorem, in extensione & flexione cubiti, duos hæ processus alternatim excipientes.

148. In CUBITO consideramus generatim *cubitus*, unum ; numerum ossium binarium, *ulnam* sive *cubitum*, stricte sic dictum, & *radium*, ob flexionis seu motus diversitatem ; magnitudinem crassitiem eorum diversam ; *iuncturam*, tam inter se in extremis, quam cum osse humeri & carpo ; *ligamentum* robustum, quo utriusque corpora colligantur ; 1. pro firmiori connectione ; 2. pro musculorum hic copiosorum commoda origine.

149. Speciatim in ULNA, (quæ & *cubitus* dicitur *ulna*) si manus supina consideratur, notamus unum interiorum ; longitudinem radio maiorem ; angulos sive *spinas* tres, quarum exteri prædictum ligamentum (§. 148.) ; duabus quo internis muscoli varii inferuntur. *Motum* mittit flexionis & extensionis.

150. In *extremitate superiori*, cavitatem 1. internam, *sigmoideam* dictam, aut *semilunarem*, in eminentia in medio, eminentiis & cavi-

D

tati

tati ossis humeri respondentem ; 2. *cavitatem* exiguam in latere externo , pro articulo cum crista radii ; *duos processus* , anteriorem coronoideum & posteriorem *anconæum* sive *olecranium* , eorumque usus ; *collum* & mox sub eo *tuberculum* , pro insertione muscoli brachialis interni , flexoris cubiti.

151. In *inferiore* , capitulum , malleolum quasi constituens : in quo 1. *cavitas* levior pro articulo cum carpo ; 2. *apophysis* parva *styloides* , pro firmiori articulatione carpi, ne hic facile luxetur ; & 3. *crista* , pro articulo cum radio 4. *cavitas* inter hanc cristam & processum styloideum , pro situ tendinis muscoli ulnaris , carpi extensoris , notanda.

radius. 152. In RADIO animadvertimus *situm* exteriorem ; *longitudinem* ulna minorem ; *spinam* cui ligamentum (148) inferitur ; *motum* pronum & supinum. a)

153. In *extremitate superiori* , capitulum cum cavitate glenoidea pro articulo cum capitulo humeri ; eius *cristam* , quæ cum ulna ad latus articulatur ; *collum* ; & ultimo *tuberculum* , pro muscoli dicti *bicipitis* , insertione.

154. In *inferiori* , spectamus capitulum superiori crassius & angulosius , in cuius extremo *magna fossa* , pro articulo cum carpo ; in latere interiori , *foveam* , pro rotatione cristæ ulnæ ; in latere exteriori , *apophysin* brevem , crassam , pro prædicto carpi articulo firmando.

a) Radium in quadrupedibus arcte concretum esse cum ulna , sicuti fibula cum tibia : quia illis motus pronus & supinus deest , notavit Schelham, *Analest.* dissert. V. §. 78.

o; in facie posteriori, aliquot leves incisuras : quibus collocantur tendines musculorum tenforum manus & digitorum, præsertim pro pollicis.

155. Sequitur iam MANVS EXTREMA, quæ *manus extrema* *carpum, metacarpum, digitos & ossa sesamoidæ* dividitur.

156. In CARPO consideranda *definitio, situs, carpus.* *ossicula octo* in infantibus adhuc cartilaginea; *eorum figura* irregularis, *connexio*, pars posterior convexa; pars opposita, concava; promodiori tendinum & vasorum ad manum, digitosque transitu; *ordo duplex* : superior sive *superius* quasi capitulum efficit, pro articulo mobili cum radio; inferius vero cavitatem præstat pro recipiendo ordine inferiori, quibus metacarpi iungitur, ubi vero in articulo primi et secundi ordinis horum ossiculorum inter se motus deprehenditur. a) Hinc *articulatio ossium carpi* triplex est : 1. inter se, 2. cum radio, 3. cum metacarpo. b)

157. In METACARPO examinanda *ossa quæ metacarpus* *eorumque* triplex quoque, cum inter se, cum cum carpo & digitis *articulatio*; atque in *ovis* esse corpus & extremitates. In *corpore*, figuram observamus quasi teretem; *cavitates* intus pro medulla; magnitudinem, *os-*

D 2

sa

Manifestam hanc in medio carpo articulationem se primo observasse affirmat idem Schelham. in Programmate leonensi ultimo.

Sunt, qui *carpi* ossiculis nomina imponunt; quod vero supervacaneum esse censemus. Si tamen forte distinguenda vel nominanda, numero illud fieri posse censeo.

sa digitorum superantem. Pars gibba five posterior earum *dorsum manus* ; concava, *volans* conficit. Corpora a se invicem distant, & interstitia musculis, *interosseis* dictis, digitos moventibus, replentur ; capitula vero five extremitates iunctæ & contiguæ sunt. *Magnitudine inter se differunt* : illud enim, quod digitum minimum sustentat, minimum est ; subsequentiæ versus pollicem, sensim fiunt longiora ; aliter quam ossa digitorum. Extremitas carpi iuncta, irregularis est figuræ ; sed quæ digito tangit, capitula habet rotunda satis magna quæ cum cavitate glenoidea digitorum articulantur.

digiti.

158. In DIGITIS notamus situm, numerum, *nomina* cuique peculiaris : ut *pollex, index, medius, annularis, auricularis*. Ossa tria sunt in unoquoque, quæ tres ordines, *phalanges* dictas, conficiunt : quarum superiores longe maiores inferioribus. *Superficies* earum exterior gibba est ; interior plana & concava ob prehensionis commoditatem. Prima phalanga, ubi cum capitulis metacarpi iungitur, cavitationem habet glenoideam, & motum quaque versum. In altero extremo duo capitula, cum duabus cavitatibus secundæ iuncta, ubi flexio tantum & extensio fieri potest : quod eodem modo inter secundam & tertiam se habet. In superiori extremo phalangæ secundæ & tertiæ inter duas cavitates, exigua eminentia adesse eundem præstans usum quem olecranon. Extremitas ultima tertiæ phalangæ apicem habet paulo latiore, quam corpus, ut digito

rum

in extrema fiant ampliora, pro variis usibus.

159. POLLEX speciatim crassiora habet ossa quorum primum figura, articulatione, situm quidem convenit cum ossibus metacarpi; verum motu ab his differt. *Articulationem primæ phalangæ cum secunda, & secundæ cum tertia, coincidunt cum articulatione & motu secundæ ac tertiæ ceterorum digitorum.* In reliquis digitis, præter ea, quæ in dicta sunt, nihil peculiare notandum occurrit. Restant *ossa sesamoidea* manus examinanda: sed de his infra §. 180.

pollex.

DE EXTREMITATIBVS INFERIORIBVS.

160. EXTREMITATES INFERIORES, PÆDES dictas, constituunt, *femur, tibia* sive *crus, tibia, pes extremus & ossa sesamoidea*, totum corpus sustentantes.

161. In FEMORE, maximo & robustissimo totius corporis osse, consideramus situm, numerum, figuram, magnitudinem, motum, corpus & extremitates, una cum eorum usibus.

femur.

162. In *extremitate superiori* perlustramus *caput magnum*, & in hoc *fossam*, pro *ligamento rotundo*, sive *tereti* vulgo dicto, (licet *vera planum* sit, a) quo acetabulo iungitur, & facile luxetur; *locumque* ubi hoc ligamentum acetabulo adhæret; *situm* capitis obliquum, & *articulum* cum acetabulo. 2. *collum*,

D 3

cui

De lite circa hoc ligamentum vid. *Examen de divers points d' Anatomie &c.* par M. Andry pag. 77 & seq.

cui ligamentum robustum annulare, ab ambitu acetabuli oriundum, inferitur, *a)* quod collum & caput quasi in *capsula* continet, pro firmiori articulatione. Præterea colli huius progressum, non perpendicularem, sed obliquum, fere horizontalem, extrorsum vergentem, pro femoribus magis disiungendis, ut firmius stare et incedere queamus, & ob meliorem multorum muscutorum hic requisitorum collocationem; *substantiam* eius spongiosam cavernosam, ob quam sæpe frangitur; *foramini-
cula* pro ingressu vasorum nutrientium. 3. duas apophyses, *trochanteres* dictas, maiorem sive externum, & minorem sive internum, muscutorum femoris insertionibus inservientes: quarum vero una cum capite ante pubertatem distinctæ epiphyses sunt. *b)*

163. In *extremitate inferiore* contemplanda
1. *duo capitula* & cavitas media, pro articulatione cum tibia; 2. *cavitas posterior*, pro tuto vasorum ad tibiam transitu; 3. *cavitas anterior*, pro patellæ collocatione & motu; 4. *duo condyli* sive tubercula iuxta capitula, pro muscutorum pedem moventium puncto fixo: in quorum exteriori, in peculiari conspicienda fovea, sæpe insigne os sesamoideum; quandoque etiam minus in altero tuberculo, præsertim in valde senili

a) Delineata hæc vid. in *Vesal.* cap. de Ligamentis, & *Bovendon.* Tab. anat. 5. fig. 31. Vasa vero eorum eleganter depicta in *Ruysschii* Adversar. Anatom. Decad. II. Tab. III.

b) In superiori parte articuli femoris & ossis innominati *ligamentum* esse robustum, a D. *Douglas* inventum, quod valde muniret hunc articulum, ne mole corporis hic fieret luxatio, scribit *Cbeselden* in Anatomie sua. Verum quia illud clarius non describit, reperire hucusque non potui.

nibus, reperitur. *a)* Tota hæc extremitas ad ubertatem usque distinctissima conspicitur piphysis.

164. In corpore femoris notamus faciem anteriorem convexam, posteriorem concavam; eius obliquitatem singularem, sive naturalem flexionem; *robur* ingens; *spinam*, sive *lineam asperam*, pro muscoli tricipitis insertione; & *cavitatem* magnam, pro medulla multa condensata. *Vsus* ossium femorum est, ut corpus sive truncum sustineat, quando stamus vel ambulamus, & ut super capitibus eorum præcipua totius corporis flexio fiat. *b)*

165. PATELLA, quæ & ROTULA dicta, *patellas* consideranda offert situm, figuram, numerum, magnitudinem, crassitiem diversam, superficiem anteriorem æqualem, leviter convexam; posteriorem, inæqualem, eminentia & duabus foveis præditam; substantiam spongiosam & fragilem; connexionem per tendines & ligamenta cum femore *c)* & tibia; motum ascendentem & descendentem in flexione & extensione tibiæ; & denique usum, pro robore conciliando musculis tibiæ extendentibus, qui pro trochlea inservit, ut firmitus stare & incedere valeamus. In *infantibus*, imo & in pueris, mere adhuc *cartilaginea* est.

D 4

166. In

vid. delineatio eorum Tab. nostra I. fig. 2. 3. & 4.

Schelham. Analest. diff. VI. §. 71.

Ligamentum, quo femori iungitur, vid. in Ruysch, Thes. anat. VII. Tab. 3. fig. 1.

tibiae.

166. In TIBIA sive CRURE in universum notamus situm ; os duplex , *tibiam* stricte sic dictam , & *fibulam* ; magnitudinem & crassitiam horum diversam ; articulationem utriusque tam inter se , quam cum femore & pede extremo.

167. In *tibia* speciatim situs in interiori cruris parte , corpus & extremitates perpendenda. In *extremitate* vero *superiore* crassities , duæ cavitates glenoideæ , pro articulo cum femore , quibus duæ cartilaginee *semilunares* mobiles incumbunt ; a) eminentia interiecta , quasi bifida , pro nervosorum & quasi *cruciformium* ligamentorum , quibus femori iungitur b) , in sertione ; *cavitas* post hanc eminentiam , in qua *glandula mucosa* collocatur. In facie anteriori tuberculum , cui extensores tibiæ , quibus patella innata est , inferuntur ; ad latera duo tubercula , punctum fixum præbentia musculis quibusdam pedis extremi ; quorum exteriori etiam arcte iungitur fibula : sic tamen , ut hæc nihil faciat ad articulum cum femore , quia femur non attingit.

168. In *extremitate inferiori* , notamus excavationem pro articulo cum tarso ; in latere exteriori aliam pro articulo cum fibula ; in latere interno apophysin crassam & robustam , *malleolum internum* dictam , pro articuli pedis firmi-

a) vid. *Morgagn.* Advers. II. fig. IV. & V. *Winslow.* in Hist. Acad. Reg. Scient. An. 1719. qui de illarum mechanica dispositione & usu eleganter differit & *Cant.* Tab. 5. fig. 4.

b) *Bourdon.* Tab. anat. V. fig. 33.

mitate. Vtraque extremitas ad pubertatem
ue ex distinctis constat ossibus.

69. In corpore tres angulos sive spinas: qua-
m exteriori *ligamentum interosseum* iungitur,
ulam cum hoc coniungens; anterior acu-
ma est, sed roboris causa crassissima, sola
e & periostio tecta: quapropter in contu-
ne eius dolorum valde sensibilem saepe caus-

Hi anguli in infantum tibiis vix apparent,
eorum tibiae fere cylindricae sunt, tandem
o angulosae fiunt. Denique tibia intus ca-
vatem pro medulla habet insignem.

70. In FIBULA, quae & PERONE audit, exa- *fibula.*
minamus situm & iuncturam, longitudinem,
ossitiem valde exiguam; *capitulum superius*,
quod articulationem cum femore non attin-
et, sed tantum tibiae lateri externo iungitur;
perius, malleolus externus dictum, ad articulum
in tarso concurrat, sua eminentia articulum
ornat, & sic facilem luxationem multum impe-
dit. *Corpus* fere triangulare est, & a tibia distat;
a spinæ acutiori *ligamentum* inseritur *interos-*
sum, quod cum tota fibula pro commodiori
insertione muscutorum multorum pedis extre-
mitati inservit. *Motum tibiae* unice sequitur, nul-
lum habens peculiarem.

71. In PEDE EXTREMO consideramus si- *pes extre-*
tum, longitudinem, in homine præ reliquis *mus.*
animalibus, longissimam, ob firmiorem inces-
sum; pedis deinde *dorsum*; *plantam*, quae con-
vexa, ne vasa, dum homo stat vel ambulat, fa-
cile comprimantur; partes, quibus, dum sta-
mus vel ambulamus, proprie insistimus; di-

visionem in *tarsum*, *metatarsum*, *digitos* & *oss. sesamoidea*.

tarsus.

172. In TARSO notamus situm, numerum septenarium ossium, ut *astragalus*, *calcaneum*, *naviculare*, *cuboides*, & *tria cuneiformia*; horum figuram irregularem; articulationem cum tibia, inter se, & cum ossibus metatarsi; atque connexionem per ligamenta fortissima; denique statum in recens natis; ubi pleraque adhuc sunt cartilaginea.

173. Nominatim in *astragalo*, qui & *talus* vocatur, situs, figura, articulatio cum tibia, fibula, & calcaneo, atque capitulum pro articulo cum naviculari præcipue notanda.

174. In calcaneo, seu *osse calcis*, considerandus situs, figura, magnitudo, articulatio cum astragalo & osse cuboide; apophysis retrorsum prominens, ad lapsum supinum prohibendum, in cuius faciem posteriorem inseritur tendo Achillis omnium fortissimus. In latere interiori excavatio, pro tuto vasorum transitu ad metatarsum & digitos, conspicitur.

175. In *naviculari* seu *scaphoide*, situs, articulatio, cavitas glenoidea, pro capitis astragali articulatione; & tres facies anteriores, ossa cuneiformia excipientes, perpendenda se offerunt.

176. In *cuboide*, lustramus situm, in tarso latere externo, ubi sustinet os metatarsi extimum, quod minimo digito articulatur, & simul os metatarsi huic proximum; deinde articulationem cum ossibus vicinis; *incisuram* in inferiori parte, in qua os sesamoideum frequenter, in tendine muscoli peronæi postici, reperitur.

177. In

177. In ossibus tribus *cuneiformibus* situm, magnitudinem diversam, articulationem cum viculari & tribus ossibus metatarsi, pollicem scilicet, secundum & tertium digitum sustentantibus.

178. In METATARSO notamus situm; ossa quinque, in quibus corpora fere teretia, superiorius convexa, inferiorius concava; interstitia pro collocandis musculis interosseis; capitula posteriora, cum tarso iuncta, inæqualia; anteriora, rotunda, pro articulo cum digitis, quæ multum prominent, ut vim musculorum digitos flectentium ageant; magnitudinem diversam horum ossium; apophysin in extimi sive quinti ossis calculo posteriori magnam, cui pes, adeoque tota moles corporis, multum insistit.

179. In DIGITIS PEDVM pleraque ita se habent, ut in manuum; attamen tredecim plerumque tantum in adultis; sæpe tamen etiam quatuordecim hic inveniuntur ossa, longe minor & tenuiora, quam in manibus, (si pollex excipiat). Motum habent strictiorem quam digiti manuum; atque digitorum maximus est pollex, quamvis solum duo habeat ossa sive internodia; reliqui sensim minores, aliter quam a digitis manuum: digitusque minimus ut plurimum, & sæpe etiam huic proximus, duo tantum distincta in senibus habent ossa, quia duæ ultimæ phalangæ haud raro concreescunt: hinc non nisi duodecim tunc numerare possumus.

180. Superfunt OSSA SESAMOIDEA: quæ ossa sesamoidea. sunt parva officula, in annosioribus & senibus maxime conspicua, ad figuram seminis sesami ali-

aliquando accedentia: quorum situs frequentissimus 1. in pollicibus manuum & pedum, in quolibet sæpe duo, non raro tantum unicum; 2. unum in iunctura metacarpi & digiti auricularis, in abductore huius digiti frequentissime hærens *a*); 3. unum sæpe in quovis condylo externo femoris *b*); 4. unum sub osse cuboide tarfi, in tendine peronæi postici. Hæc quatuordecim in virili ætate & senibus plerumque reperiuntur, quandoque tamen etiam unum in condylo femoris interno, sed rarissime. Aliquoties etiam unum in facie externa ossis metacarpi, quod indicem sustentat, in tendine musculi adductoris indicis, reperi; sæpius vero in pollicibus manuum alterum deest. Plura igitur sedecim rarissime, sed frequentius pauciora inveniuntur; hinc errant illi, qui ultra quadraginta generatim adesse scribunt & numerant, atque cuivis digitorum articulo duo & adpingunt & adscribunt, ut tamen plurimi fecerunt. Omnia inhærent tendinibus musculorum, exceptis iis, quæ in condylis femoris reperiuntur: hæc enim principiis musculorum innascuntur. Figura & magnitudo eorum diversa est & irregularis. In iunioribus cartilaginea sunt, idcirco facilius in senibus reperiuntur. Musculis pro trochleis inserviunt, eorumque vim augent. Conf. Notæ sub signo (I*).

DE NUMERO OSSIVM.

181. Exhibitis sic ossibus omnibus totius corporis

numerus
ossium.

a) vid. eius figura & situs in Tab. nostra I. fig. 5.

b) Tab. I. fig. 2. 3. & 4.

ris, facile iam erit *numerum* eorum nosse, in
o determinando Auctores tantopere variant.
senibus plerumque ultra 260. non reperiun-
: in iuvenibus & pueris maior quidem est
merus, verum incertior ; quia multa in u-
m postea concrefcunt.

capite exposuimus sexaginta novem: ex qui-
bus cranium, una cum sex officulis auditus,

nabet	-	-	-	-	-	-	14
maxilla superior	-	-	-	-	-	-	13
maxilla inferior	-	-	-	-	-	-	1
dentes in utraque maxilla	-	-	-	-	-	-	32
os hyoides	-	-	-	-	-	-	5
larynx	-	-	-	-	-	-	4

trunco adfunt ossa 53: nimirum vertebræ 24

costæ - - - - - 24

sternum(licet sæpe ex duobus frustis constet) 1

os sacrum - - - - - 1

os occygis - - - - - 1

ossa innominata - - - - - 2

extremitatibus adfunt ossa 138: ut scapulae 2

claviculae, - - - - - 2

ossa humeri, - - - - - 2

- - ulnae, - - - - - 2

- - radii, - - - - - 2

- - carpi, in singula manu octo, - 16

- - metacarpi, - - - quatuor, - 8

- - digitorum, - - - 15. - 30

- - femoris, - - - - - 2

- - tibiae, - - - - - 2

- - fibulae, - - - - - 2

rotulae sive patellae, - - - 2

ossa

ossa tarfi utriusque pedis,	-	14
- - metatarfi,	- - -	10
- - digitorum,	- - -	26
- - sesamoidea, raro ultra 16. repiuntur,	-	16

Igitur totus numerus sive summa erit - 260

182. EPIPHYSES (§. 51.) in hominibus circa annos pubertatis facile adhuc 124. distinctæ demonstrari possunt ; quæ si his 260. addantur, numerare possumus in universum ossa corporis humani 384.

DE IVNCTVRIS SIVE ARTICVLATIONIBVS OSSIVM.

de iuncturis ossium. 183. De IVNCTVRIS OSSIVM, quarum scientia in chirurgia adeo necessaria, Anatomici vulgo agere solent in principio osteologiæ; quod ego in fine eius, cogitis prius ossibus, rectius fieri existimo: quapropter iam ad eas progredior.

184. Græci nomina iis imposuerunt Græca, a figura articuli & medio coniungente desumpta: in quorum vero explicatione, quia scriptores anatomici immensum variant & confuse multi scribunt, sequenti modo eas, ex mente *Galen*i & *Hippocratis*, optime discesci atque explicari posse credidi; alio tempore prolixius forte de iis acturus.

185. SYNTHESIS sive SYNTAXIS OSSIVM, (Latinis *commisura*, *coniunctio*) genus est apud hos Autores omnium iuncturarum, tam cum, quam sine motu, complectens duas species,

Arthron,

thron, id est, *articulum*, *iuncturam* : quæ considerat contactum ossium sive figuram coniunctionis, sine respectu ad connexionem. Huius species rursus duæ sunt :

Diarthrosis, motum habens manifestum : qua comprehenditur

Enarthrosis, quando caput profundæ cavitati iungitur : ut caput femoris cum acetabulo

Arthrodia, quando caput cavitati leviori iungitur : ut iunctura humeri cum scapula.

Ginglymus, si os suscipit & suscipitur : (Gallis *charniere*) sicut in iunctura humeri cum cubito &c.

Quibus a Fallopio *Trochoides* additur, ubi motus instar rotæ circa axin, sicut articulus primæ colli vertebræ cum secunda. His a recentioribus quibusdam adiecta est *Amphiarthrosis* : qua comprehendere volunt omnes iuncturas cum motu manifesto, differentes a præcedentibus, vel figura

Synarthrosis, motum habens vel (vel motu.

obscurum, ut ossa carpi, metacarpi, tarsi, metatarsi &c.

nullum, cuius species sunt : *sutura*, *harmonia*, *gomphosis*.

amphysin, s. *unionem*, indicans ossium connexionem : & fit vel

sine medio, (scil. alieno, aut ab osse in adultis diverso) ut in osse frontis, maxilla inferiori, ossibus innominatis, vetebis &c.

cum medio, (scil. alieno, ab osse adhuc diverso) : cuius pro diversitate tres sunt species, ac quælibet cum & sine motu, ut

Synchondrosis, in ossibus pubis, vertebris inter se &c.

Synnevrosis, in omnibus iuncturis artuum, futuris cranii &c.

Syssarcosis, in scapulis, osse linguale, gingivis &c. DE

DE PERIOSTIO, MEDVLLA, LIGAMENTIS ET CARTILAGINIBVS,

tanquam partibus ad ossa adhuc pertinentibus

periostium. 186. PERIOSTIVM est membrana nervosa vasculosa *a)*, sensus acutissimi; omnia ossa externe & interne proxime investiens, dentibus quantum super gingivas eminent, locisque ubi muscoli inferuntur, exceptis: hinc in *externum* & *internum* dividitur, vocaturque *periocranium*, ubi ossa cranii extus, *dura mater* vero, ubi intus ea investit.

187. Constituit rudimenta ossium in utero organum est secretionis materiæ osseæ, sicut membrana adiposa pinguedinis, & ossa ab hoc accretionem, augmentum & nutritionem capiunt: nam huius vasa sanguifera ossa innumeris in locis penetrant, sicut in iuniorum ossibus maxime observatur. Sensum ossibus largitur: nam hoc orbata, uri & secari possunt sine dolore. Terminum & figuram præscribit ossibus: nam ubi læsum est, exostoses, tophi, caries &c. oriuntur. Diversam in variis partibus habet crassitiem; internum tamen exteriori longe est tenuius, & ossa intus nutrit, vasaque sanguifera & nervos recipit per singulares canales, ossibus hinc inde insculptos, quæ cum medulla communicat. Oriri vulgo dicitur a dura matre cerebri: quod vero recte loquendo dici non potest; quia simul & eodem tempore cum dura matre in foetu generatur.

188. ME-

a) Vascula huius copiosissima variis in figuris exhibuit *Ruysebius*.

88. MEDULLA, massa olim informis habi-^{medulla}
 constat ex substantia oleosa, pingui, sub-
 & minutissimis vesiculis membranaceis,
 quibus e sanguine arterioso, fere ut pin-
 do, pinguis hæcce substantia secernitur;
 tineturque in plerisque ossium cylindrico-
 cavitatibus: nam in cavernosis ossibus
 pus tantum rubicundus, pinguis, quasi me-
 ofus, deprehenditur. Vasa medullæ, per
 dictos canales, hinc inde in ossibus occur-
 tes, ad cava ossium penetrant: arteriæ ma-
 tam medullosam adferunt & secernunt, ve-
 sanguinem redundantem revehunt; nervi
 o sensum eius vesiculis largiuntur. a) *Neque
 fit neque decrescit secundum lunæ augmentum
 decrementum*, ut nonnulli existimarunt; sed
 ut animalia motu exercentur, vel quie-
 sudent, idoneo & sufficienti, vel inepto
 ulo, fruuntur. Hæc subtilis pinguedo si-
 oleum, interstitiis fibrarum ossæarum se-
 nuans, ossa ab ariditate & fragilitate præ-
 at; sed ea, ut olim putarunt, non nu-

89. LIGAMENTA sunt vincula robusta,^{ligamenta.}
 plurimum membranacea, iuncturas mobi-
 specie annuli cingentia, connectentia, ossi-
 que collis firmissime innata; nunc cartila-
 gea, nunc nervea quoque aut tendinea, sive
 etia, colligandis ossibus destinata. Dantur
 idem adhuc alia ligamenta, quam quæ ossa
 unt; sub quibus vero semper partes mem-
 E brana-

branaceæ intelliguntur, certas partes colligantes: ut ligamenta musculorum, linguæ, uteri penis &c. de quibus suo loco.

Cartilagine.

190. CARTILAGINES denique ad ossa pertinent, quæ, ut §. 31. dictum est, sunt partes ossium æmulæ, elasticæ; nihil vero plerumque, vel parum medullæ aut medullas continent.

191. Cinguntur suo *perichondrio*: & 1. ad ossa coniungenda, ut in vertebribus, &c. 2. ad cavitates articulorum formandas; 3. ad extrema ossium obducenda, eaque polita & lævia reddenda, ubicunque eorum motus requiritur, inserviunt. Ceterum etiam ad asperam arteriam, laryngem, bronchia, nares, aures, oras palpebrarum, aliasque partes, de quibus infra, constituendas, utilissimæ sunt.

DE SARCOLOGIA.

& quidem primo

DE TEGUMENTIS COMMUNIBUS CORPORIS HUMANI.

192. Consideratis hætenus ossibus, tanquam fulcris machinæ humanæ, partibusque ad ea pertinentibus, progredimur nunc ad partes molles examinandas: quarum doctrinam §.

35. SARCOLOGIAM VOCAVIMUS.

193. Di-

93. Dividi hæc potest 1. in doctrinam de tegumentis five velamentis communibus corporis humani, 2. in *Splanchnologiam*, 3. in *Anatomologiam*, 4. *Neurologiam*, 5. *Myologiam*, & 6. *Chirologiam*.

94. In *Splanchnologia* considerantur 1. viscera abdominis *chylopæa*, five digestionis alimentorum destinata : quæ sunt, ventriculus, *stomachus*, hepar, lien & pancreas ; 2. *uropæa*, five urinæ secretionis inservientia : ut renes, testes, vesica urinaria, urethra ; 3. *paragenesi dicata*; 4. *organa respirationis & circulationis sanguinis*, in thorace & collo sita : pulmones, cor, diaphragma, partesque ad hæc pertinentes ; & denique ultimo *cerebrum*, & omniaque sensuum in capite collocata.

95. Antequam vero ad interiora pergamus, TEGVMENTA COMMVNIA, totum corpus circumcingentia, prius consideranda sunt ; quoniam in bestiis quidem plura, in homine vero nisi tria reperiuntur : ut *CUTICULA*, *CUTIS* & *PINGVEDO*, s. *membrana adiposa* : quas res iam, cum sequentibus reliquis, in *forabularum*, ut vocant, exhibebimus ; ut tyrosin sectionibus omnia, quæ in parte quavis corporis notanda & discenda occurrunt, uno quasi intuitu perspicere intuerique possint.

196. **CYTICVLA** est membrana tenuis, totam cutem, cuius quasi pars est, arcte ambiens, unde & Græco vocabulo *Epidermis* vocatur. In hac notanda,

Adhesio, firma cum cute, interveniente *corpore reticulato* *Malpighii*; sic, ut in sectione cadaverum non scalpello, sed aqua fervente separari possit. Alias tamen etiam in viventibus eam putrefactione, igne & vesicatoriis a cute recedere observamus.

Color, in Europæis albus; in Aethiopibus, niger.

Structura vel *substantia* ex minutissimis lamellis, & quasi squamulis, arcte tamen cohærentibus, microscopio observandis, constat: in quibus copiosissima

Foraminula, pilis, transpirationi & sudori exitum, mercurio aliisque rebus ingressum præbentia; *pore* vulgo dicta. His quidam *valvulas* tribuunt, pro sudore moderando; quod tamen vi elastica horum vasorum potius fieri, existimo.

Crassities diversa, eaque maxima in plantis pedum & volis manuum: reliquis in partibus valde tenuis.

Sulci, five *lineæ*, incisuræ Plinio, varii, profundiores & leviores ubique, præsertim vero in volis manuum, conspiciuntur: ex quibus multi vaticinari conantur. In apicibus digitorum, spirales sunt, ductusque cutis excretorios, certo ordine hic dispositos, defendere videntur.

Regeneratio, in viventibus facilis est; attamen eius

Ortus, non a condensatis ab aere exhalationibus corporis, ut veteres voluerunt; sed potius, secundum *Leeuwenhœkium*, ab expansione ductuum cutis excretorios, vel secundum *Ruyfchium* ab expansione papillarum cutis nervearum, multas minimas squamulas five lamellas, inter se cohærentes, conficientium; vel forte, ut mihi videtur, ab utrisque simul. Vid. Notæ sub num. (2*).

Vasa, neque a *Ruyfchio* subtilissimis suis iniectionibus detegit, neque ab aliis adhuc certe demonstrari possunt; hinc læsa sanguinem non fundit, & sensu fere destituitur; a subtili tamen liquido eam nutriri & regenerari necesse est.

Usus, 1. defendere cutem ab attritu, dolore, & siccitate, atque sic 2. sensum tactus iuvare & moderari. 3. moderari humorum nimiam exhalationem.

197. CORPVS RETICVLARE MALPIGHII, sive TICVLVM CVTANEVM, est tenuissima membrana innumeris minimis foraminulis, reticuli instar, perforata, cuticulæ proxime subiacens, eique, dum arte vel casu a cute aufertur, firmissime adhærens, ut vix inde separari possit, & interior quantum eius superficies videatur. In hoc examinanda *cutis*, ubi maxime reperitur: illis in partibus, ubi sensus cutis exquisitissimus est, nimirum in volis manuum, apicibus digitorum, & plantis pedum: deinde etiam in lingua, & quidem longe manifestius & accuratius, quam alibi conspicitur; ex qua etiam eius natura & constitutio melius patent, quam ex omnibus aliis partibus. In aliis partibus ob tenuitatem vix conspicitur.

Color: in Europæis, album est; in Aethiope vero, (cutis licet candidissima) nigerrimum; in semi-æthiope, dilutius nigrum: hinc color hominum, & præcipue nigrities æthiopum, maxime ab eo dependet. 4)

Us: per foraminula sua pilos, papillas cutaneas, ductusque excretorios & absorbentes cutis transmittit: quæ certo ac determinato ordine detinet, ne facile de sede sua dimoveri queant: papillarumque mollitiem & ad tactum aptitudinem conservare videtur.

E 3

198. CV-

Wid. *Ruysschii* recentissimas hac de re observationes in *Advers. anat.* Dec. III, pag. 26. qui etiam frustum cutis æthiopis, cum cuticula ex parte inde separata & dependente, in spiritu mihi transmisit: in quo apparet cutis candidissima, ut in europæis; cuticulæ superficies exterior, nigra: interior vero, ubi reticulum conspicitur, nigerrima. Ex quo apparet, in corpore reticulari præcipuam nigritudinis sedem esse. Confirmat idem *Santorinus*, *Obs. anat.* p. 2: qui simul indicat, colorem cutis europæorum multum a colore bilis pendere; nam in ictero flavo, bilem quoque esse flavam; in ictero nigro, nigram; in chlorosi vero pallidam. Conferri de cuticula uberius merentur, *Malpighius* de Tactus organo, & *Ruysschius* in *Epist. prima*, fig. 4, 5, 6 & 7: qui posterior prioris inventum egregie illustravit.

198 CUTIS est membrana robusta, instar corii crassa, elastica, totum corpus investiens: in qua consideranda

Connexio: superficies superior cum *reticulo Malpighii*, & *cuticula*: inferior vero cum *pinguedine*, & quidem in quibusdam locis laxa, in aliis arctissime, cohæret.

Crassities & durities varia, in variis corporis partibus & in variis quoque animalibus, sicut ex diversitate corii patet.

Sulci, incisuræ sive lineæ, multi, cum cuticula communes.

Foramina { *maiora*, ut in ore, naso, auribus, &c. ubi tamen cutis potius reflexa, quam perforata, dici potest.

{ *minora*, vulgo *pори*: qui rursus sunt vel *maiores* vel *minores*; pro pilorum, transpirationis & sudoris exitu, mercuriique, contagiorum &c. ingressu. *Maiores*, præsertim in naso, nudus oculus percipit; *minores* vero microscopia, atque mercurii transitus per corium demonstrant.

Structura sive substantia ex

{ *Fibris tendineis* singularib⁹ tenacissimis mire implexis.
 { *Vasis sanguiferis* copiosissimis, ex *Ruyschii iniectionibus* stupendis primum rite cognitis. vid. eius scripta
 { *Nervis copiosis*, papillas ut plurimum *pyramidales*, per *rete Malpighianum* in cuticulam protensas, constituentibus: quæ in labris, volis manuum, præcipue circa apices digitorum, & in plantis pedum, cuticula ablata, maxime conspicuæ, *tactusque organum* constituunt primarium. a)

Glandulæ cutaneæ miliares copiosissimæ, a plerisque recentioribus, post *Stenonem* & *Malpighium*, in cute ubique statuuntur, pro secretionem materiæ exspirandæ; quæ tamen vix, vel saltem paucissimæ, demonstrari possunt, earumque attributa functio a solis in cute arteriis fieri potest. b)

Folliculi sive Receptacula cutanea, aliorum forte sunt *glandulæ sebaceæ*. c)

Ufus cutis est: 1. partes subiacentes involvere & defendere; 2. organum tactus esse; & 3. emunctorium universale sanguinis, ope sudoris & transpirationis: quæ vero simul pro ariditate cutis avertenda inservit.

199. Pr-

a) *Ruysch*, Epilt. Tab. XVII. fig. 2. & *Advers. Anat.* Dec. II. Tab. 1. fig. 3.

b) *ibid.* Dec. I. pag. 9. b) *ibidem* descripta. Conf. Nota (3*)

PILI ad cutim quoque referri solent, atque in capite, ubi CAPILLI dicuntur, maxime notabiles sunt: horum extra cutem apparet teres: at microscopio perlustrata, inæqualis est, pellucida & sæpe nodosa; sed nec cava a), nec ramosa: extremitas vero sæpe instar penicilli in filamenta fissa:

intra cutem radix, & ob figuram *bulbus* vocatur: verisimiliter cava & vasculosa, ut pennæ avium iuniorum in radicibus, quæ vasculosa pars folliculo includitur, in senis & maioribus pilis barbæ bovis, felis &c. conspicuo. b) *go*: in cute & infra cutem in pinguedine c): probabiliter ex nervis, ob dolorem, qui in evulsione eorum percipitur. d)

tertia nutriens eadem est, ac aliarum partium; non excrementitia, ut veteres voluerunt; nec post mortem crescunt, ut vulgo credunt, sicuti certo experimento edoctus sum. e)

color: in regionibus calidissimis, nigerrimus; in temperatis, fuscus vel niger; in frigidis, flavus, rufus, subfuscus; qui vero in sentibus ubique in canum mutatur, & in cuprum tractantibus, in viridescentem.

longitudo: ratione partium corporis, in capite, longissimi sunt; ratione vero *subiectorum* aut *regionum*: sub zona torrida, brevissimi & crispi; in temperatioribus, longiores.

assistentia ad tactum: 1. pro diversitate *subiectorum* & *regionum*: in æthiopibus & ficioribus, duriores: in humidioribus & infantibus, molliores. 2. Pro diversitate *locorum corporis*: in pudendis & alis, durissimi; in capite molliores; in reliquo corpore, brevissimi & mollissimi.

æternitatis tempus: quidam connascuntur, ut in capite, ciliis & superciliis; quidam vero certa demum ætate proveniunt, uti barbæ, alarum & pudendorum. Sic & quidam pili semper; quidam vero post nativitatem non crescunt.

us: 1. caput calefacere & ornare; 2. partes quasdam defendere, ut *cilia*, *supercilia*, *vibrissæ*, reliquorum vero pilorum non adeo manifestus.

200. VNGVIVM (§. 32.) situs, numerus, figura, magnitudo & color omnibus nota sunt; sed notanda

Partes: pars extrema *apex*, opposita *radix* sive principium appellatur: hæc tenuior & mollior; illa crassior & durior; candicansque ad radicem pars *lunula* vocatur.

Substantia: Constant ex papillis cutaneis prolongatis, induratis, & ordine parallelo firmiter coniunctis: propterea in radice, ubi papillæ adhuc teneriores, valde sensiles; in apice vero, ubi induratæ, sine dolore refecari possunt. Illæ papillæ tam a radice, quam ab inferiori parte, e cute proveniunt: propterea in progressu versus apicem, ob maiorem papillarum accedentium copiam, crassiores sunt & fortiores, earumque beneficio firmissime cuti subiectæ cohærent. Aqua tamen fervida in cadaveribus facile separari possunt.

Nutritio: Sicuti aliæ papillæ cutaneæ sua habent vasa, a quibus nutriuntur; ita & hæc ea habent in principio: quæ papillæ quasi radices sunt, ex quibus deinde simili modo, ut in pilis, fibræ solidæ induratæ emergunt: atque sic eadem etiam ratione nutriuntur & crescunt. Cessat vero hæc accretio post mortem, secus ac multi perhibent. a)

Usus: 1. munire digitos, ne tam facile ab iniuriis externis lædantur. 2. In manibus apprehensionem, præsertim rerum subtiliorum, expeditiorem reddere. 3. Iis commodè utimur ad partes prurientes scalpendas; & ad varia, fordes v. g., abradenda. 4. In pedibus ingressum firman, & dolorificam allisionem præcavent. &c.

Animalia quædam (in quibus analogam habent conformationem) eis apprehendunt, & prædam arripiunt: ut feles, leones. Aliquibus inserviunt hamorum loco, ut scandere possint, sicuti fimiis, sciuris. Quædam iis loco calceorum, alia armorum loco utuntur; ut equi, boves, &c. dum iisdem se defendunt & feriunt. vid. *Schraderi nostri dissertatio de Armatura brutorum.*

201. In

a) Confirmat hoc *Ruyseb.* Advers. Anat. Decad. II. pag. 46.

o 1. In PINGVEDINE (§. 28.) seu MEMBRANA ADIPOSA notanda
us: ubique fere per totum corpus sub cute; præterea
inter muscutorum interstitia, in orbita oculi, in omen-
to, mesenterio, circa renes, & variis aliis in locis.

Substantia ex

[*Membrana tenui* transparente, innumeras cellulas,
seu loculos, inter se invicem communicantes, ha-
bente, &

[*Materia pingui*, oleosa, quasi butyracea sanguinis,
cellulas has replente: ex arteriis illius mem-
branæ, non ex glandulis, secreta. In valde ema-
ciatis vero tantum adest membrana illa cellulosa,
a materia pingui vacua.

Distinctio Autorum inter adipem sive sebum, & pinguedinem:
secundum quam in homine non datur verus adeps.

Vasa sanguifera, arteriæ & venæ, a partibus vicinis copiosa,
cellulas membranaceas adeuntia & quasi cingentia; *nervi*
vero pauci: hinc parum sentit.

Vasa adiposa, tanquam peculiaris vasa, a quibusdam addun-
tur: quæ vero a vasis lateralibus sanguiferorum & prædi-
ctis cellulis non distincta esse arbitramur.

Resolutio, motus, sive regressus pinguedinis ad venas, ex con-
sumptione eius in certis morbis & motu fortiori animalium,
sæpe valde celeri, abunde patet.

Usus: 1. defendere corpus vestimenti loco a frigore; 2. a salium
acrimonia; 3. cutis, muscutorum, aliarumque partium,
quibus interiacet, flexionem conservare; 4. partium qua-
rundam motum facilitare: ut oculorum, maxillæ; 5. loca
vacua sive interstitia replere: quo respectu primo ad pul-
chritudinem facit in facie, collo, oculis &c.; deinde, dum
spatia replet inter anum, vaginam uteri & ossa ischii, dictæ
partes in fæcum & fætus exclusionem rite extendi sive dila-
tari possunt; 6. dolorificum attritum prohibere, ut in plan-
tis pedum, natibus, & pubis regione: quibus pulvinaris
instar subiacet; 7. forte penuriæ tempore aliquo modo,
dum venas rursus ingreditur, corpori pro nutrimento in-
servire.

202. PANNICVLVS CARNOSVS pro quarto corporis humani integumento sive tegumento communi a multis describitur : qui est tunica carnea , musculosa , robusta , quæ quidem in bestiis multis adest , inter cutem & pinguedinem , cuius beneficio , ut in bobus videmus , cutem movent & muscas abigunt ; sed in homine talis non reperitur , nisi in facie ; fortasse , quia homo , utpote vestibis instructus , eo aliis in corporis locis non ita indigebat : quare plura de eo non dicemus.

203. MEMBRANA MUSCULORVM COMMVNIS quoque inter tegumenta communia a nonnullis refertur : quæ pinguedini subiecta esse , & omnes musculos cingere dicitur. Verum & hæc immerito pro universali tegumento habetur : quia per totum corpus non est expansa ; sed solum in quibusdam partibus reperitur : multis vero in locis deficit. Male etiam *Mangetus* cum *Verheyeno* tunicam adiposam , ut numerum veterem tegumentorum compleant , in tres membranas dividit *a)* , cum ex hac reliqua in homine deficientia arte formari non possint.

204. Sequuntur iam , absolutis velamentis communibus , ABDOMINIS TEGVMENTA sive PARTES CONTINENTES PROPRIÆ , ut , præter duo *ossa innominata* , *os sacrum* cum appendice sua , & quinque *vertebras lumborum* , *diaphragma* ; *musculi abdominis* & *peritoneum* : nam ad ventris sive abdominis partes examinandas primum progredimur ; quia hæ ob fæces , quas continent , præ reliquis corruptioni maxime sunt obnoxia : sic postea reliquæ diutius & melius sine fœtore & corruptione tractari conservarique possunt.

a) Morgagn. Advers. Anat. II. p. 17.

1. Circa MUSCULOS ABDOMINIS notanda

Linea alba : Occupant & conficiunt maximum abdominis ambitū. *Linea alba*, per medium abdominis, a sterno ad iuncturam ossium pubis, extensa, ex tendinibus horum musculorum conplicate inter se implexis confecta, in cuius medio est *umbilicus*.

Generus : vulgo quinque paria, a)

1. *rectum*, ortum habens in ossibus pubis; finem in sterno, & quatuor costis : in quo variae *distinctiones tendineae*.
2. *oblique descendens* : provenit ex costa 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, & definit aponevrosi sua in spina ilei, osse pubis, atque maxime in linea alba; quam tamen multae fibrae transeunt.
3. *oblique ascendens* : oritur ex ambitu ossium ilei; atque inferitur partim costarum spuriarum margini inferiori, partim iunctus tendini praecedentis, lineae albae.
4. *transversum* : provenit a lumborum processibus, costis spuriiis, atque crista ilei, & sub recto in lineam albam abit.
5. *pyramidale* : valde exiguum, oritur basi sua ad iuncturam ossium pubis, ad 4. digitos transversos recta ascendit, & definit in linea alba; sed modo penitus desideratur, modo unicus in uno latere tantum musculus adest, modo uterque.

Vasa : arteriae & venae ab intercostalibus, lumbaribus, mammariis & epigastricis vicinis. *Nervi*, a dorsalibus & lumbaribus. *Canaliculus* in parte inferiore oblique descendentis; pro transitu *processuum peritonaei* & vasorum spermaticorum in viris; pro *ligamentorum uteri rotundorum* in mulieribus; in herniis, pro intestini & omenti; ascendentem vero & transversum non penetrant, sed sub eorum limbo transeunt.

Ligamentum Poupartii dictum inter spinam ilei & os pubis; sub quo vasa cruralia; musculus psoas &c. egrediuntur. (4*)

Officia : 1. continere & defendere contenta abdominis; 2. motu suo perpetuo digestionem & progressum chyli iuvare, 3. excretionem faecum, urinæ, foetus & secundinarum, tempore partus, promovere; 4. respirationi inservire; 5. flexiones corporis varias adiuvere; 6. ad vomitum (5*); & 7. forte etiam ad saltum concurrere.

206. Muscu-

) Figuras horum praestantissimas vid. in Cowperi Myotomia in folio,

206. Musculis abdominis transversis proxime subiacet & adhæret PERITONÆVM: quod est tenuis, lævis & lubrica membrana, totum abdomen interius investiens, & viscera abdominis pleraque, quasi in sacco, continens. Præterea cohæret cum diaphragmate, omnibusque visceribus abdominis: quorum omnino involvit *ventriculum, intestina, mesenterium, omentum, hepar, lienem & pancreas*: quæ propterea in *duplicatione peritonæi* sita esse dicuntur. *Renes vero, ureteres, cisternam, vasa maiora abdominis &c.* solum ab anteriore; sed vesicam a parte superiore tegit, aliter quam in brutis. *a)* *Lamella* constat duplici: inter quas vasa umbilicalia sita, *b)* multisque in locis *substantia cellulosa* cincta est. *Ligamenta* efficit hepatis, venæ umbilicalis, intestinorum varia, uteri lata, &c.

Processus duos extra abdomen demittit, vasa spermatica & testes involventes: circa quos notandus

- [1. *progressus mirabilis* inter musculos abdominis;
- { 2. *hiatus*, in abdomine canum, in homine deficiens;
- [3. *septum*, testiculum a parte superiori separans.

Involucra ligamentorum rotundorum in mulieribus; eorumque diverticula a Nuckio delineata. Adenogr. fig. 39 & 40.

Arteriae & venæ, ab epigastricis, mammariis, lumbaribus, & diaphragmaticis: quibus quidam addunt *vasa lymphatica*.

Nervi, a diaphragmaticis, dorsalibus, lumbaribus, ossis sacri.

Glandulae quoque in eo a nonnullis adesse statuuntur: quæ tamen in statu secundum naturam non conspicuæ. (6*)

Usus: 1. continere contenta abdominis: nam eo nimium dilatato, secto, vel rupto, e sede sua dilabuntur, vel herniæ oriuntur; 2. tunicam extimam præbere partibus in abdomine contentis fere omnibus; quæ propterea membranam suam extimam vulgo dicuntur habere a peritonæo; 3. formare *processus peritonæi* & tunicam vaginalem testium.

207. CON-

a) Quo modo vesicam tegat, figuris eleganter ostendit Cheselden. Tract. de Lithotom. ubi hoc scitu summe est necessarium. *b)* Santorin. p. 164.

207. CONSPECTVS CONTENTORVM ABDOMINIS.

Aperto prudenter peritonæo spectantur,
asa, umbilicalia dicta, in adultis in ligamenta mutata,
duæ arteriæ, una vena, & urachus, intra duplicem peri-
 tonæi lamellam contenta *a)*; quæ in animalibus bru-
 tis, annosioribus, fere disparent; aut saltem minus
 in conspectum prodeunt, quam in homine. Arte-
 riæ vero umbilicales, ex observatione *Duvernei*, sem-
 per cavitatem retinent, usque ad fundum vesicæ uri-
 nariæ, & hæc vesica inde perpetuo ramos accipit. *b)*
mentum seu Epiploon, intestinis incumbens.

testina, maximam abdominis partem occupantia:

{ in medio, *tenuia* dicta.
 { in circumferentia, *crassa*.

mesenterium, sive membrana intestina coniungens.

ventriculus, in parte superiori & sinistra magis situs.

hepar cum vesicula felle, in latere vel hypochondrio dextro.

lien, in latere sinistro, post ventriculum, diaphragmati co-
 stisque spuris adhæret: hinc non conspicitur, nisi pro-
 tracto ventriculo.

renes duo, sub intestinis latentes, & lumbis incumbentes.

vesica urinaria, in infima abdominis parte, *pelvis* dicta, ossi-
 bus pubis ope peritonæi nexa: quæ in homine, si non
 distenta, plerumque vix adparet. *c)*

pancreas: quod est glandula magna, post ventriculum sita.

partes quædam generationi inservientes: ut

{ Virorum, *Vesicula seminales*, &c.

{ Mulierum, *Uterus*, ligamenta eius, ovaria, tubæ

Fallopianæ, aliæque partes ad hunc pertinen-

arteria magna seu aorta.

(tes

vena Cava.

vena Porta.

arteriæ & venæ iliacæ, emulgentes, mesentericæ, aliæque.

208. OM.

Santorinus Observ. anat. p. 164. *b)* *Garengéot* Chirurgie Tom. I. pag.
 222. plura de his vasis vid. capite de fœtu. *c)* vid. *Cbeselden*. figuras
 pag. præced. laudatas.

208. OMENTVM est pars membranacea, pinguedine plerumque multa instructa, sub peritonæo intestinis proxime incumbens.

Synonymia : Rete vel reticulum : quia sæpe foraminula in eo apparent, quando elevatur ; quæ vero non sunt naturalia ; Græcis *epiploon* dicitur.

Situs : plerumque superiorem solum abdominis partem occupat ; non raro tamen quoque per inferiorem extenditur.

Pondus : in homine adulto, nec pingui nec macilento, circiter lb̄ss : sed in *brutis* ratione pinguedinis multum variat.

Connexio : in parte *inferiori*, liberum est & fluctat ; in *superiori*, antè, cum ventriculi fundo, duodeno & liene ; postè, cum intestino colo & pancreate.

Substantia ex

{ *membrana* tenerrima, duplici, marsupium quasi venatorium formante, cavitate, *Bursa* dicta, instructa.

{ *pinguedine*, in cellulis adiposis, *ductus* quasi formantibus, contenta, vasa sanguifera ambientes ; inter quos *Areolæ*, sive spatia membranacea.

{ *arteriis*, a cœlica copiosissimis, *epiploicis* dictis. *a*)
vasis { *venis*, a vena portæ, imprimis a rano splenico.
 { *nervis*, ab intercostali & pari vago ; & *lymphaticis*.

Apertura naturalis insignis, a *Winsloo* detecta, sub magno lobo hepatis, prope collum vesiculæ fellis, per quam omentum flatu pulchre distendi potest. vid. Nota (7*).

Ductus adiposi Malpighii, nil sunt nisi vasa lateralia sanguiferorum, qui in cellulas, sanguifera ambientes, pinguedinem deponunt : quæ vero cellulæ, ut in reliqua pinguedine (201) inter se *b*) & cum venis quoq; comunicant. conf. Nota (8*).

Usus : 1. lubrica pinguedine sua intestinorum motui inservire ; 2. intestina fovere contra frigus ; 3. bilis præparationi succurrere, præbendo partem pinguem : quicquid enim ab omento refluit, hepar ingreditur ; 4. acrimoniam humorum temperare ; & 5. forte rursus nutrire in nutrimenti defectu, sicut de pinguedine generatim dictum est.

209. VE-

a) In *Ruyschii* Thes. anat. II. Tab. V. fig. 1. elegantissima harum arteriarum delineatio videri potest, *b*) *I. M. Hoffm.* idea p. 23.

99. VENTRICVLVS five *Stomachus*, est pars membranacea, cava, in sinistro potissimum hypochondrio, mox sub diaphragmate, inter hepar & lienem oblique sita; in quo notanda

ura: quæ cum utriculo luforio convenit.

visio: in *orificia* duo, & *fundum*, qui anteriora spectat.

{ *sinistrum*, five *Cardia*, quod longe altius dextro, cum
orificia { *gula* continuum, multisque nervis instructum; &
 { *dextrum*, five *Pylorus*, cui intestina iunguntur; ubi
valvula singularis, ventriculum claudens. *a*)

amentum, quo pylorus ventriculi supremo nequitur.

ignitudo: varia, in heluonibus ut plurimum maxima, ut & in viris plerumque maior, quam in feminis.

merus: in homine unicus; in bestiis vero variis, plures.

{ *Arterie*, *gastricæ* dictæ, a *cœliaca*.

{ *Venæ gastricæ*, ad venam portæ tendunt, ubi notanda

{ *Vasa brevia*, ad ramum splenicum abeuntia, &
 { *Vena coronaria*, ventriculum ambiens.

{ *Nervi*; in primis circa sinistrum orificium intrantes, a
 { pari vago, admodum insignes: hinc adeo sensibile.

{ *Lymphatica* ad receptaculum chyli abeunt.

stantia: membranacea, ex quinque tunicis conflata.

1. *Membranacea*; cuius fibræ transversæ, & sub ea 2. *cellulosa*.

3. *Musculosa*: in qua fibrarum ordo varius & quasi inextricabilis: quædam enim quasi circulares a parte superiori ad inferiorem descendunt; aliæ in superiori ventriculi parte, inter utrumque orificium; aliæ a sinistro latere ad dextrum oblique excurrunt; quædam orificia ambiunt. (9*)

4. *Nervea*: rugas efficiens, multis vasis sanguiferis & parvis glandulis, liquidum gastricum secernentibus, instructa: quæ in porcis facilius, quam in homine observantur. (9**)

5. *Villosa*, tenuis, porosa *b*), præcedenti arcte adhærens.

5, 1. *Concoctio*. h. e. ut alimenta recipiat, contineat, solvat, mutet, per pylorū ad intestina expellat, & forte etiam subtiliorem eorum partem absorbeat. 2. famem excitare.

210. IN-

id. eius delineatio nostra fig. 6. *b* *Ruyseh*. Thes. anat. II. Tab. V. fig. 2.
 de papillis ventriculi vid. *Ruyseh*. Advers. III. p. 33. (9**)

210. INTESTINA sunt canales magni, longi, membranacei, a ventriculo ad anum usque extensi: in quibus notanda *Longitudo*, sexies quasi maior homine, ex quo deprompta sunt. *Circumvolutiones* mirabiles, earumque utilitas.

Connexio: ope mesenterii, cum vertebris lumborum.

Numerus: proprie unum; sed dividi solet in sex; quorum

Tria dicuntur tenuia, ut

1. DVODENVUM: a longitudine xii quasi digitorum: *ortum* habens ad pylorum, & primo parum ascendit, dein descendit, & postea iterum ascendendo, transverse versus renem sinistrum excurrit. Recipit, ad iii vel iv. digitorum distantiam a pyloro uno hiato prominente, *Oscula* ductus cholidochi & pancreatici, pro bile & succo pancreatico suscipiendo. Tunicas habet crassiores, & cavum maius, quam reliqua tenuia. *Valvulas* conniventes *Kerkringii*, a) sive *rugas* in principio habet nullas; in progressu quamplurimas, *iuga* quoque dictas. b) *Glandulas Brunneri* copiosissimas pro liquidi tenuis secretionem. c) *Arterias* a coeliaca; *venas*, uti reliquorum intestinorum, a Porta.
2. IEIVNVUM, quia plerumque reperitur *vacuum*: ob chyli fluiditatem, stimulum bilis maiorem, & vasorum lacteorum copiam. Eius *Situs* est in regione supra umbilicum. *Valvulas* quoque conniventes habet multas. *Principium*, ubi duodenum definit, & *finis*, ubi valvulae oblitterantur. Hinc *longitudinem* eius in diversis cadaveribus diuersam observavi: nunc tantum 13. nunc 16. spithamas æquabat, & ut plurimum ileo brevius erat.
3. ILEVUM, quia eius *situs* potissimum est infra umbilicum, iuxta *ossâ ilei*. *Longitudo* quandoque vix xv, quandoque vero xx spithamas excedit. *Principium*, ubi valvulae conniventes vix amplius conspiciuntur; *finis* vero, ubi crassa incipiunt: quo loco lateri sinistro coli, singulari modo, ut valvula inde fiat, inseritur, d) quam *valvulam coli*, *Baubini*, appellant. Ceterum valvulas habet nullas; sed *Glandula* circa finem ut plurimum plures adfunt, quam alibi.

Tria

a) Spicileg. anatomi. pag. 89. b) Santorin. p. 167. c) Traët. de Gland. Duodeni. conf. Nota (10*). d) vid. dissert. nostra de Valvula Coli item fig. huius compend. 7. Morgagn. Advers. III. fig. II.

ia crassa : ob amplitudinem maiorem ita dicta :

1. COECUM ; quod sacculi instar , una cum *appendice vermiformi*, situm est ad os ileum dextrum. Incipit infra finem intestini ilei , & in fundo sacculi finitur. Longitudo huius intestini non excedit 3 vel 4 digitos transversos. In appendice , in latus cœci plerumque hiantes , glandulæ observantur ; quæ una cum situ ut plurimum erecto innuunt , eam aliquid secernere. In *gallinis* , &c. duplex ; in piscibus plurimis, multiplex est hæc appendix a) ; in homine vero quandoque deest. b).
2. COLON , situm est in circumferentia tenuium , in variis subiectis varie & mire flexum : Principium eius est, supra ilei finem ; & finis , ad os sacrum. Conneditur ope peritonæi cum osse ilei , rene dextro , vesicula fellis, hepate , omento , ventriculo , liene , rene sinistro &c. Longitudo , quandoque vix quinque ; sæpius tamen septem spithamas excedit. Amplitudo omnium maxima. Ligamenta habet tria , secundum longitudinem excurrentia , & in processu vermiformi desinentia. c) Appendicula adiposæ externæ d) , ad lubricanda intestina inserviunt : valvulae conniventes in hoc intestino maximæ ; tunicæque robustiores sunt , quam in tenuibus.
3. RECTUM , dicitur , quia eius situs fere rectus super osse sacro. Longitudo , palmas circiter duas. Latitudo , trium digitorum. Principium ad imam lumborum vertebra ; finis vero , anus dictus , musculos habet tres : primo sphincterem , pro ano claudendo , & elevatores duos , pro eodem retrahendo : de quibus in Myologia. Nectitur osse sacro , coccygis ac vesicæ in viris ; at in mulieribus , vaginæ uteri. Tunicæ eius omnium crassissimæ sunt & carnosissimæ. Valvulae hic ut in colo non adsunt ; sed tantum leviores quædam rugæ : ne fæcum exitus remoretur. Lacunæ , in quas setæ sæpe immitti possunt , e) in vesiculas desinentes. f) Anus pinguedine multa cingitur : ut in fæcum excretionem facile dilatari queat.

F

211. STRV.

vid Grevv. Comparative Anatomy. b) Ex Observ. Morgagni Advers. anat. III. pag. 27. c) ibid. fig. III. d) Ruysch. Mus. anat. pag. 75. 6. e) Vid. fig. nostra 28. Tab. VI. f) Morg. Adv. Anat. III. 10. 11.

211. STRUCTURA INTESTINORVM, membranacea, e quinque tunicis composita.

1. *Membranacea*, five communis a peritonæo.
2. *Cellulosa Ruyschii*, mesenterio continua, & flatu detegenda, in pinguibus animalibus sæpe pinguedinem continens. *a)*
3. *Musculosa*, ex duplici fibrarum ordine composita, longitudinalium, (quæ maxime in parte mesenterii adversa) & annularium, motui intestinorum inservientium.
4. *Nervea*, glandulis, vasculis & cellulis copiosis instructa, ceterisque amplior: unde rugæ & valvulae vid. Not. (11*).
5. *Villosa*: fines sanguiferorum *b)* & principia vasorum lacteorum sustinens: unde accurato examine cribri instar apparet. *c)* Ergo percolationis chyli organum vid. (12*).

Vasa copiosissima, substantiam eorum perreptantia:

Arteriæ, mesaraicæ dictæ: superior, pro tenuibus intestinis; inferior, pro crassis, mirabiles anastomoses conficientes.

Venæ, quoque mesaraicæ, ad venam portæ & hepatis abeunt.

Nervi, a pari vago & intercostali.

Vasa lactea, quæ & *lymphatica*; de quibus mox seorsim.

Rectum intestinum etiam vasa ab hypogastricis recipit.

Glandulæ Peyerii d), præter *Brunnerianas* duodeni, in intestinis

tenuibus plerumque congregatæ, parvæ, *miliares*; quæque etiam *solitariae*: maiores versus duodenum, minores versus crassa; liquidum in intestina deponentes, pro chylo attenuando & intestinis lubricandis.

crassis & appendice vermiformi; *solitariae*, *maiores*, lenticulari maxime in recto, cum ostiolis, liquidum, pro fæcum & intestinorum lubrico: ne fæcum excretio nimis sit molesta, secretantes.

Usus intestinorum tenuium, concoctionem ciborum continuam, secretionem chyli perficere, fæcesque ad crassa propellere *crassorum*, fæces colligere, & suo tempore expellere.

112. N

a) Thes. Anat. VI. Tab. V. fig. 2. *b)* Albin. diss. de Intestinis. *c)* Ruysch. Epist. XI. Tab. 12. *d)* Exercit. de Gland. intestin. fig. 1, 2, 3, 4.

MESENTERIVM est membrana in homine crassa, pinguis, in medio intestinorum, præsertim tenuium, sita; unde ratio nominis intelligitur. In hoc considerata:

stantia: quæ ex membranis, pinguedine, vasis omnis generis, & multis glandulis in homine constat.

posicio: in parte superiori, cum tribus superioribus vertebris lumborum; in inferiori cum intestinis, præsertim ieiuno & cæco: quibus extimam quoque largitur tunicam.

divisio: partem illam, quæ colon tangit, quidam *Mesocolon*, reliquam *Mesenterium* sive *Mesaraum* appellant.

transferebatia: in qua, si ab intestinis separatum est, notandæ

Plicæ, specie ornamentorum manuum. (*Manchettes*.)

Longitudo, trium circiter ulnarum, cui tamen iunguntur intestina quadruplo longiora.

Membrana, seu *tunica*, duæ: anterior & posterior; intra quas *cellulosa substantia*, pinguedinem continens, glandulæ, & *vasa mesaraica* locantur. Hanc quidam haud inepte propriam partem numerant, & *cellulosam* appellant. a)

{ *Sanguifera*, eadem cum intestinis, mirabiles hic anastomoses, arcus & insulas constituentia. b)

{ *Nervi* quoque a pari vago & intercostali.

{ *Lactea & lymphatica*, de quibus mox seorsim.

Glandulæ multæ, per totum mesenterium dispersæ c): quarum

Numerus, magnitudo & situs valde variant. In canibus tantum unica adest, sed maior quam in homine, *Pancreas Asellii* vulgo dicta. In decrepitis fere evanescent.

Ufus harum est, liquidum secernere, eoque chylum transeuntem diluere: vasa enim lactea eas transeunt.

1. suspendere, colligare & in situ retinere intestina.

2. sustentare vasa sanguifera intestinorum ac lactea.

3. viam, vasis lacteis ad receptaculum, breviorē facere.

213. VASA CHYLIFERA constituunt VASA LACTEA, & ductus thoracicus: illa sunt canaliculi subtiles in intestinis & mesenterio, chylum vehentes; circa quæ notanda

Inventor, Asellius; A. 1622: olim quidem iam ab Erasistrato & Galeno notata, sed pro arteriis, lacte plenis, habita. (13)*

Tempus optimum ea demonstrandi: duabus vel tribus horis post pastum, in bestiis antea bene pastis, & recens strangulatis, quia tunc chylo turgent: nam extra tempus digestionis tantum lympham vehunt, & vasa lymphatica sunt.

Methodus ea optime demonstrandi: ductus thoracicus, de quo mox agemus, in talibus bestiis filo est constringendus. Sæpe tamen etiam sine ligatura satis in his apparent.

Difficultas ea demonstrandi in hominibus inde oritur: quia non calidi, aut mature satis post mortem dissecantur; nam in frigidis plerumque disparent. Haud raro tamen in suffocatis, strangulatis, variisque morbis defunctis, observari possunt.

Origo: ex intestinis, potissimum tenuibus omnibus, radicibus innumeris, ac pluribus longe in homine a) quam in canibus. (14) Deinde etiam, sed rarissime, ex crassis. b)*

Distinctio vasorum lacteorum, in lactea

*[primi generis: quæ ab intestinis, ad mesenterii glandulas
secundi generis: quæ a glandulis, ad receptaculum, ubi eorum finis, abeunt. Hæc prioribus ampliora, sed pauciora.*

Valvule semilunares, duplices, oppositæ, refluxum impeditæ, sed non ita frequentes, ut in aliis lymphaticis. c)

Usus: chylum & lympham ex intestinis per mesenterium cisternam five receptaculum chyli deducere.

Defectus vasorum lacteorum in animalibus pennatis: in quibus chylus venas mesaraicas ingreditur.

214. D

a) vid. nostra delineatio fig. 8. ex homine: quas enim delineatio alii dederunt, ex bestiis videntur desumptæ. b) vid. observ. nostra in Ephem. N. C. Cent. V. p. 234. Schelhamm. in M. N. C. 8. Analect. Anat. præfatione. in mesocolo visæ, in Act. Anglic. N. 3. p. 2283. c) Raysh. dilucidatio Valvularum.

DUCTVS THORACICVS, seu CHYLIFERVS, est canalis terrimus, chylum e vasis lacteis, & lympham e lymphaticis, recipiens, eaque per thoracem ad venam ut plurimum subclaviam devehens. In quo notanda:

Antor: *Pecquetus a)*, A. 1651. Diu quidem ante hunc iam *Eustachio b)*, sed obscure nimis descriptus.

Originium: *cisterna*, vel *receptaculum chyli*, dictum, in sinistro latere superiorum vertebrarum lumborum, sub aorta, vasis renis sinistri, situm; reliquo ductu specie sacculi paullo amplius, haud raro duplex, & figuræ irregularis, id. (15*)

Cursum, in vena subclavia, ut plurimum sinistra, vel in iugulari. Pressus & situs, sub aorta in canibus; in homine vero ascendit in dextro latere vertebrarum dorsi, inter aortam & venam azygos: nunc simplici, nunc diviso trunco.

Textura, calami straminei crassioris, ubi indivisus.

Modus eum optime demonstrandi in animalibus, est, si ex. gr. a cane, bene pasto, recens iugulato, in thorace prope subclaviam, filo ligatur: sic simul cisterna, vasa lactea & lymphatica bene in conspectum prodeunt. Vel etiam in homine mortuo, si, secundum *Salzmannum c)* in vas lymphaticum magnum, per venam emulgentem sinistram, vel venas iliacas, vel cavæ partem inferiorem decurrens, flatus, vel liquidum, vel cera iniiciatur; vel 2. si in vas lacteum secundi generis, in centro mesenterii indagandum, idem tentetur, ex descriptione *Henningeri d)*; vel 3. pleura inter venam azygos & aortam caute dissecatur, verumque ibi deprehendi potest.

Membrana, ex membrana tenera, subtili, & pellucida.

Utriusque, in toto ductu, sicut in lacteis & lymphaticis, chyli fluxum impediens: plures in homine, quam in bestiis, Utriusque semilunaris *e)* tegens finem eius in subclavia. (16*)

Officium: Chylum ex cisterna, & lympham ex vasis lymphaticis per thoracem ad sanguinem transferre.

F 3

215. VA-

vid. *Pecqueti* Experim. anat. *b)* Lib. de Vena azygos. *c)* in *pecul. dissert. hac de re edita*, Argentor. 1711. *d)* in *Ephem. Nat. Curios. Cend.* IV. Append. p. 120. *e)* *Louvet de Corde* Tab. 6. fig. 2.

215. VASA LYMPHATICA, ob similem structuram, idemque demonstrandi tempus vasis chyloferis mox subiungimus. In quibus notanda:

Descriptio: Sunt vasa subtilia, tenera, pellucida, liquidum vehentia aquosum, *lymphæ* dictum; in intestinis vero præsertim tenuibus, digestionis tempore, chylum quoque vehunt: & tunc, ut supra dictum, *vasa lactea* vocantur, quæ in intestinis eadem sunt vasa.

Inventor: eorum, quæ extra intestina, Th. Bartholinus & Rudbeckius, Anno 1651. a) Angli tamen, ut Glissonius b) Charletonus (c), aliique, Iulio suo inventionis gloriam adscribunt.

Situs, in superficie plerarumque partium, præsertim hepatis parte concava, collo vesiculæ fellis, trunco venæ portæ & cavæ, &c.

Structura, ex tenuissima membrana: sicuti lactea.

Valvule copiosissimæ, semilunares, duplices, a Ruyschio optime demonstratæ, lib. de Valvulis lymphaticorum. (17*

Principium, in plerisque corporis partibus: nam in omnibus nondum demonstrata sunt; licet probabile sit, ea adesse.

Finis, sive insertio:

- { 1. in venas maiores varias, imprimis cavam, portæ &
- { 2. in cisternam sive receptaculum chyli.
- { 3. in ipsum ductum thoracicum.

Modus ea demonstrandi: vel

- { ligando ductum thoracicum, vel venam cavam, portæ
- { splenicam, renalem, vel aliam maiorem in animalibus adhuc vivente, vel recens iugulato;
- { flatum fortiter impellendo in venas, vel arterias, vel ductus excretorios viscerum, præsertim adhuc calentium.

Usus: lympham a nutritione redundantem, vel ad massam sanguineam, vel ad vias chyloferas, a partibus revocare. *Lymphæ* vero ipsa refluens pro chylo & sanguine rursus diluendis inservit.

216. PAN

a) vid. Bartholin. de Vasis lymphat. & lacteis: atque Rudbeck. de ductibus hepaticis aquosis: vel Hemsterhusii Messis aurea. b) Tr. de hepate, Cap. XXXI. c) Oecon. animal. Exercit. IX. p. 107.

PANCREAS est glandula magna, plana, carnei utplurimum coloris, post ventriculum, transversim a duodeno, versus lienem extensa: in qua considerata, *flexio*: cum duodeno, mesenterio, vasis splenicis & liene. *plex* in homine; at in canibus & felibus quasi bipartitum. *longitudo*: octo vel novem quasi pollicum.

latitudo: digitorum duorum, vel duorum cum dimidio.

partes: unius digiti. *Pondus*, trium circiter unciarum.

locus: in homine ad linguam caninam accedit: latior prope duodenum, angustior sensim versus lienem.

membrana cingitur, quæ cum peritonæo continua est.

structura, glandulosa: ex multis minoribus conglomerata.

vasa habet, arterias a cœliaca, & ramo splenico; venas quoque a splenica; nervos a pari vago & intercostali; vasa lymphatica vero incerta sunt.

Situs extretorius, ex multis minoribus conflatus: cuius

Inventor primus, *Mauritius Hoffmannus*, Professor postea *Altorfinus*, Patavii A. 1641. in gallo Indico; & deinde post huius demonstrationem demum a *Wirsungo*, Bavaro, in homine repertus est: teste autopta *Th. Bartholino*. a)

Numerus: utplurimum unicus in homine: quandoque duplex: quod ordinarium in anseribus, anatibus, gallis Afric. phasianis; triplex vero in gallis, columbis, aquila &c.

Situs, in medio pancreatis, venam quasi vacuum referens, *crassitie* calami straminei tenuioris.

Finis, seu apertura in duodeno obliqua, 4 vel 5 digitis infra pylorum, utplurimum eodem orificio cum ductu cholidochi; quandoque vero duplicem habet aperturam. In bestiis multis ad notabilem distantiam infra cholidochum, peculiari orificio in duodenum inferitur.

Officium: secernere liquorem, *succum pancreaticum* dictum, quiaturæ est salivossæ, & ad chylum attenuandum inferitur.

217. **HEPAR** five **JECUR**, est viscus maximum, rubicundum, in dextro hypochondrio situm, bilis secretioni destinatum: in quo

(possit.

Magnitudinis ratio: ut copiosa bilis pro digestionem fecerni

Figura, irregularis, superior superficies convexa & æqualis, inferior concava, inæqualis, vesiculam fellis & glandulam continens.

Eminentia, ubi vena portæ hepar ingreditur, porta dicta, & alia adhuc, quem lobulum Spigelii quidam appellant.

Fissura magna, qua in partem dextram, quæ crassior, & sinistram dividitur; sed non in tales lobos, ut in canibus

Connexio: ope 1. ligamenti suspensorii, dextri & sinistri, cum diaphragmate; rotundi, cum umbilico; quod vena fuit umbilicalis in fœtu. 2. Membranae propriae posterioris cum diaphragmate; 3. Vasorum, inprimis venæ cavæ & venæ portæ.

(nua

Membrana, hepar ambiens, tenuis est, cum peritonæo conti-

Capsula Glissonii: est tunica peritonæo continua, venæ portæ ramos, arteriam & ductus bilarios prope & intra hepar includens. a)

Arteriæ: pro nutritione 1. a cœliaca; 2. cysticis; 3. diaphragmaticis; 4. interdum etiam a mesenterica superiori.

Venæ: 1. a Vena portæ, cavam superficiem intrante: quæ venæ & arteriæ officium præstat, sanguinemque affert pro bilis secretionem: de qua alibi plura; 2. Venæ cava; 3. a diaphragmatica, pro refluxu sanguinis supervacui ad cor.

Nervi: a plexu hepatico nervi intercostalis.

Vasa bilaria (quibus sæpe glandulae adjacent) sunt ductus

Vasa

Cholidochus communis: oblique in duodenum hians

Cysticus, ex vesicula fellis ad cholidochum, angulo acuto cum hepatico coniungens: in hominibus tortuosus

& sæpe valvulis varii generis instructus. vid. (18

Hepaticus, ex hepate ad cholidochum: cuius rami per totum hepar distributi, Pori bilarii dicuntur

Hepatico-cysticus & radices felleæ, in bobus. (18**)

Vasa lymphatica, deteguntur, 1. ligatura venæ portæ in vivis; 2. flatu in arteriam vel ductum hepaticum.

Canalis venosus in fœtu, & sinus venæ portæ magnus.

Su

Substantia secundum

Veteres, ex sanguine circa vasa sanguifera concreto.

< Malpighium, & plerosque recentiores, glandulosa. (19*)

! Ruyschium, vasculosa, ex congerie vasculorum minimorum.

VESICULA, aut cystis fellea, est vesicula, ad figuram pyri aliquo modo accedens, sita in parte hepatis concava: in qua

Magnitudo: parvo ovo gallinaceo fere æqualis.

Collum sive Cervix, quæ quasi sphinctere claudi potest.

Fundus, qui, nobis erectis, deorsum; collum vero sursum spectat: incumbit colo, illudque suo colore tingit.

Cohæsiō, 1. per membranam communem, 2. per vasa.

Ductus cysticus, ad cholidochum abiens: de quo supra.

Frænulum, quo ductus cysticus cystidi iungitur.

Structura, ex quatuor membranis: 1. communi, 2. cellulosa & vasculosa, 3. musculari, ex fibris tenuissimis rectis, obliquis & transversis; 4. nervea, intus rugosa & reticulata, humore unctuofo imbuta, in qua subinde minimæ glandulæ: quæ fabrica ductibus quoque bilariis communis videtur.

Vasa communia cum hepate, quæ hic cystica vocantur. a)

Radices felleæ in bobus, non in homine a me inveniuntur.

Modus, quo bilis in vesiculam fertur. In homine pars maxima e ductu cholidochi per cysticum ascendere; pars vero amarissima ex ipsa vesicula provenire videtur. Sed in bobus etiam per hepatico-cysticos & radices felleas. b) (19**)

[Hepatis, secernere bilem sive fel ex sanguine Venæ portæ; secundum veteres vero, sanguificare.

Usus { Vesicula fellea: colligere bilem, ulterius eam perficere, ad certum tempus asservare, & tandem expellere.

[Bilis: chylum attenuare, oleosa aqueis miscere, intestina stimulare, acidum chyli ex parte immutare.

Bilis vero duplex est: hepatica, quæ fere insipida, tenuis, & vix colorata; cystica, quæ crassior, coloratior, & amarissima.

a) Ruysch. optime delineata Ep. V. ubi & alia huc pertinentia. b) v. Bobn. in Act. Erud. A. 1682. p. 20. A. 1683. p. 126, Verheyen. Tab. XI. fig. 6.

218. LIEN five **SPLEN**, est viscus atro-rubens, in sinistro ventriculi latere sub diaphragmate ad costas situm: in quo notanda

Numerus: ut plurimum unicus; quandoque plures inventi. *a)*

Figura, varia: haud raro linguæ quodammodo æmula; concava, versus ventriculum; convexa; versus diaphragma & costas: sæpe tamen irregularis est, & hinc inde varias fissuras obtinet.

Connexio: cum ventriculo, per vasa breviora; cum pancreate, omento, diaphragmate & rene sinistro, per membranas.

Magnitudo, varia: *Longitudo* sæpius 5 vel 6 circiter pollicum; in porcis, canibus &c. multo longior, at tenuior. *Latitudo* 3 pollicum; *crassities* unius. *Pondus* XII. circiter uncularum.

Membrana: una in homine, porcis, canibus; at in vitulis duæ: exterior, communis, robusta, laxè adhærens per vasa sanguifera interiori, propria: quæ, priori ablata, flatum transmittit.

Vasa, pro parvitate huius visceris admodum insignia:

Arteria, a cœliaca, in homine aquam, aerem aut mercurium iniectum per venas facile transmittens, *splénica* dicta.

Vena splénica, in vitulis mox ab ingressu in cellulas mutata; in homine vero per totum lienem, ut in aliis visceribus, ramosissima est. *b)* In vitulis utraque vasa, in uno extremo; in homine vero, variis distinctis ramis, in toto tractu superficiei concavæ sive internæ ingrediuntur.

Nervi, a plexu splénico. *Ductus* vero excretorius, nullus.

Vasa lymphatica, ad receptaculum abeuntia.

Substantia, cellulosa & glandulosa statuitur: cellulosa quidem est in vitulis; sed in homine, vasculosa & fibrosa: glandulas enim, quas adesse scribunt, *Ruyschius* vascula esse demonstrat. (20*)

Glandula lymphatica, una vel altera, fabæ circiter magnitudine, extra lienem, circa vasorum in eum ingressum sæpe reperitur.

Usus, mihi verisimillimus est, sanguinem hepatis, ex quo bilis secernenda, natura sua spissum, fluidiorem reddere, & sic cavere obstructions & bilis secretionem promovere. (21*)

219. RE-

a) Schelham. Analect. diss. X. §. XII. Cheselden. Anatom. p. 181. *b)* demonstrante *Ruyschio*, contra plerosque recentiores, Epist. IV. Tab. 4. qui plerumque lienis vitulini, loco humani, descriptionem dederunt.

19. RENES sunt duo viscera rubicunda, phaseoli figuram representantia, utrinque in lumbis sita, in quovis latere unus: quorum concava pars introrsum, convexa extrorsum respicit. In his præterea consideranda

Situs: ad infimas duas costas spurias; sic tamen, ut nunc æquali, nunc diversa paullo altitudine siti sint: modo enim sinister altior dextro; modo dexter sinistro, contra opinionem vulgarem.

Connexio cum lumbis, costis inferioribus, intestino colo, renibus succenturiatis, vasis renalibus, & ureteribus.

Membranae duæ: prima communis, adiposa dicta, robusta, laxè renes ambiens, propriis vasis instructa; altera propria, tenuis, & arctè undique substantiæ renum adhærens.

Magnitudo: longitudo, digitorum circiter quinque vel sex; latitudo, trium; & crassities, unius cum dimidio.

Superficies in adultis æqua & lævis; in fœtu vero sæpe, vitulis, bobus, ursis &c. in varias inæqualitates & lobos divisa.

Vasa: membrana peritonæi, sive capsula, ut in hepate, inclusa: { Arteriæ & venæ amplæ, modo una, modo plures, emulgentes ac renales dictæ: quarum hæ, ex vena cava; illæ, ex aor-
 { Nervi a plexu renali. Ductus excretorius, ureter, dictus. (ta.
 { Lymphatica, ad receptaculum chyli abeuntia.

Substantia, firma ac dura, duplex in eis observatur:

{ exterior sive corticalis, secundum Malpighium, glandulosa; sed secundum Ruyschium a), tota pulcherrime vasculosa. vid. Notæ (22*).

{ interior, tubulosa, tubuli urinarii Bellini dicta, definens in papillas viii, x. vel xii, multis foraminulis in pelvim hiantes b): quæ tamen papillæ in omnibus non apparent. c)

Pelvis, est cavitas renum membranacea, productiones emittens, tubulos pelvis dictas, papillas renales amplectentes.

Usus: urinam, pro depurando sanguine, secernere in pelvim, & inde per ureteres ad vesicam demittere.

220. RE-

a) Thes. anat. III. Tab. 4. fig. 2. & 3. Thes. IV. Tab. I. fig. 1. b) Ruysch. Thes. III. fig. 3. & Thes. IV. Tab. I. fig. 1. c) Schelham. Anat. diss. XL

220. RENES SUCCENTURIATI, capsula atrabiliaria five glandulae renales, ab Eustachio primum descriptæ a), sunt duæ glandulae flavescentes, compressæ, utrinque superiori renum parti incumbentes, in quibus angustissima cavitas, liquore fusco subdulci imbuta. In his notanda.

Figura: irregularis, quadrata, triangularis, ovata &c.

Magnitudo, varia: in adultis, sæpe instar nucis vomicæ maioris; in fœtu vero maior, & æqualis renibus, imo subinde maior.

Membrana ambiens, tenuis est, arcte cingens substantiam glandulosam, eamque cum rene coniungens.

Vasa sanguifera, quandoque ab aorta & cava, sæpius ab emulgentibus. *Nervi*, a plexu renali. *Vasa lymphatica*, multa.

Ductus excretorius, nullus cognitus: ideoque & *Usus* incertus; qui tamen maior in fœtu, quam in adulto, esse videtur.

(23*)

221. URETERES, sunt canales duo membranacei, calami scriptorii quasi crassitie, inæqualis tamen diametri: a quovis rene ut plurimum unus ad vesicam extensus. Horum *Ortus* in renibus: ubi infundibuli forma ampliati, *pelvim* faciunt.

Finis, in vesicæ parte inferiori & posteriori: ubi oblique intra membranas eius progrediuntur, & ad modum valvulæ, angustis orificiis, in vesicam terminantur, nihilque ex vesica admittunt.

Figura: non recta, sed quodammodo ad figuram literæ sinflexa.

Substantia, membranacea, ex tribus tunicis composita: 1) communi a peritonæo, 2) musculari tenui, 3) nervea, humore lubrico obducta, in qua subinde glandulae b) observatæ.

Vasa: sanguifera, & *nervi* a partibus vicinis.

Usus: urinam, in renibus secretam, ex pelvi suscipere, & ad vesicam deferre: his enim obstructis, urina supprimitur; adeoque eius ad vesicam nullæ aliæ dantur viæ.

Amplitudo præter naturam sæpe insignis, a calculis renalibus transgressis, subinde ipsis inducitur. vid. Ruysch. Obs. xv. & Coschvitz. dissert. de Valvul. in ureteribus.

222. VE-

a) Lib. de Renibus. b) Ruysch. Obs. XV. Morgagn. Advers. III. 71.

22. VESICA VRINAE est pars membrancea cava, piri fere forma, in pelvi sita, ad urinam colligendam & expellendam destinata: circa quam indigitanda

Magnitudo: quæ circiter libram unam liquidi capit in adultis.

Connexio: 1. singularis cum osse pubis, per peritonæum, aliter quam in bestiis; 2. cum partibus genitalibus, per urethram; 3. cum umbilico, per urachum & arterias umbilicales; 4. in maribus, cum intestino recto; 5. in feminis, cum uteri vagina.

Divisio: in cervicem sive collum, corpus vesicæ & fundum. Horum tunicæ sunt tenuiores, illius crassiores.

{ sanguifera, ab hypogastricis, umbilicalibus & hæmorrhoidalibus; at in mulieribus quoque ab uterinis.

Vasa { Nervi, ab intercostali, & imprimis ex osse sacro.

{ lymphatica, a nullo observata novi, nisi a Zeller. a)

Structura: membranacea, ex tribus membranis constans:

{ 1. communis dicitur, peritonæo continua, fundum solum ambiens b); sub qua plerumque pinguedo observatur. (24*)

{ 2. muscularis, ex vario fibrarum, præsertim tamen longitudinalium & transversarum, tractu, composita. (24*)

{ 3. nervea, humore mucoso obducta, in arteriis vel glandulis huius tunicæ, iuxta collum subinde conspicuis, secreto. c)

Sphincter, est series fibrarum transversarum, sub rectis extremum colli vesicæ arcus specie ambiens, & claudens; ad urinæ involuntarium exitum cohibendum: in viris, intestini recti; in mulieribus, vaginæ fibris cohærens. conf. Santorin. p. 203.

Foramina tria: duo, ubi ureteres (221) ingrediuntur, per quæ urina influit: & unum maius in collo, pro via urinæ in urethram.

Usus: ex definitione iam constat.

223. VRETHRA est canalis membranaceus, fere cylindricus, vesicæ collo continuus, urinæ e vesica exitum concedens: in mulieribus, vix duos digitos superat; sed multo longior in viris: de qua vero plura in partium genitalium descriptione.

224. Cir-

a) Disput. de Administr. vasor. lymph. p. 3. b) Cheseld. de Lithotom.

c) Graaf. de Org. gener. Tab. V. Drake Anthropol. Tab. III. fig. 1. lit. b.

224. Circa PARTES GENITALES VIRORVM notanda primum TESTICVLI, five *didymi*, duo, in scroto contenti: quorum *Figura & magnitudo*, omnibus nota.

Involucra five *velamenta communia & propria* sunt,

1. SCROTVM, five *bursula*, infra penem dependens, *pilis* in adultis instructum: in quo notanda

Sutura, qua in dextrum & sinistrum latus dividitur.

Substantia, ex cuticula, cute, & membrana musculosa, *dartus* dicta, constans, cuius ope corrugatur.

Septum, ex duplicatione darti factum, quo scrotum in duos *loculos* dividitur. vid. *Ruyseh.* & *Rau* de septo scroti.

Vasa, a pudendis & hypogastricis. *Nervi*, ex osse sacro.

Usus: continere & fovere testiculos.

2. TUNICAE tres:

1. *musculus cremaster*, five *elevator testiculi*.

2. *vaginalis*, laxè testem ambiens, a processu peritonæi.

3. *albuginea*, robusta, arcte cum substantia testis cohærens; *vasa spermatica* recipit, & ad testem transmittit.

Vasa: præter communia cum scroto modo indicata, speciatim *arteria spermatica*, ut plur. ex aorta, angusto principio oriunda.

venæ: dextra, ex vena cava; sinistra, plerumque ex emulgentè sinistra; *valvulis* sæpe destitutæ, varias *anastomoses* & *corpus pampiniforme*, *pyramidale*, formantes.

nervi a plexibus nervorum pelvis & lumbaribus.

lymphatica, in animali vivente copiosa videri possunt.

Substantia: *vasculosa*, ex tenuissimis vasculis, *seminalia* dictis, intestinorum more intortis, constans a) pulchre apparens, si testis aceto maceratur; *glandulae* vero in eo nullæ patent.

Corpus Highmori: in homine, in dorso testis: in cane, in illius medio: cui *cavitas*, pro semine suscipiendo, adscribitur. b)

Usus: semen prolificum generare, in quo vivi vermiculi. c)

225. II.

a) *Cheselden*, Anat. Tab. 28. & eorum dissolutio *Ruyseh.* Thes. IV. Tab. I. fig. 2. & Thes. IX. Tab. III. fig. 3. itemque fig. nostra 24. b) *Highmor.* Anat. Tab. X. & XI. *Lealis* fig. 1. c) *Leeuwenhæck* variis locis; *Bærbæave* Inst. Med. edit. altera p. 256. sed in *Harris* Lexic. techn. *Valhsner.* de generat. Tab. I. & *Cheseld.* Tab. 28. delinsantur. (25*)

25. II. EPIDIDYMIDES, sive *Parastatae* duæ, in quovis teste una: quæ sunt partes oblongæ, fere cylindricæ, testiculi oræ superiori, erucæ vel bombycis similitudine, incumbentes. In his consideranda.

Connexio: cum teste, ope membranæ albugineæ; & cum *vase deferente*. (conf. de his & reliquis partibus genital. *Graaf*.)

Principium: in teste, quinq; vel sex vasculis seminalibus minimis.

Finis: in altero extremo, ubi *vas deferens* incipit.

Membrana ambiens, robusta, cum *albuginea* continua.

Substantia, quoque *vasculosa*, ut testium: vasculis tamen, non solum magis conspicuis constans; sed quorum meatus etiam per iniectiones visui se sistunt. Omnia vero hæc vascula tandem in unum ductum, *vas deferens* dictum, abeunt.

Tasa, eadem cum testibus, *spermatica* dicta.

Nervi: ab iisdem ramis ac testium.

Fusus: genituram ex testibus recipere, ulterius digerere ac perficere, & ad *vas deferens* transmittere. conf. Nota (36*).

26. III. VAS DEFERENS, sive *ejaculatorium* dictum, est canalis robustus, albicans, nervum referens, calami straminei mediocris crassitie, unus ab epididymide qualibet, ad vesiculas seminales & urethram extensus. In hoc notanda

Ortus & progressus: ab epididymide per processum peritonæi ad abdomen ascendit, & deinde ad collum vesicæ reflectitur.

Finis: in anteriori parte vesicularum seminalium, partim recta in urethram; partim oblique in vesiculam seminalem desinit: sic, ut in utramque, pro necessitatis exigentia, liquidum suum deponere possit.

Substantia: valde robusta & tenax, fere ut nervus fortis.

Cavitas: in principio & progressu vix setam admittit; prope vesicam multo amplior: in fine rursus angustior, nihil sponte in urethram transmittens; sed solum in cæstro venereo.

Fusus: liquidum genitale ex epididymidibus continuo ad vesiculas seminales; at in coitu quoque ad ipsam urethram, deferre. Forte & ad perfectiorem eius elaborationem conferre.

227. IV. VESICULAE SEMINALES, sunt receptacula duo membranacea, cellulosa, parti posteriori colli vesicæ iuncta, ad semen ex vasis deferentibus recipiendum, ulterius perficiendum, & suo tempore, per urethram expellendum. Harum

Longitudo : trium digitorum transversorum; *latitudo*, unius. *Substantia*: ex membrana valida, vasculosa, & quasi masculosa, varias cellulas, inter se communicantes, efformante, & peritonæo robusto adhuc cincta: quæ vero cellulae in cæcum quasi intestinulum, unum, resolvi possunt. a)

Ductus excretorius, duplex, ex quavis vesicula unus, duplici osculo in urethram ut plur. desinens: contra *Lealem*, qui unum ductum, unumque solum osculum statuit & delineat. b)

Vasa sanguifera, a vasis vesicæ & intestini recti copiosissima. *Nervi*, a pelvis plexibus. *Facies interna*, reticulata, rugosa, ut in cystide fellea. c) *Glandulae* quoque a nonnullis hic visæ perhibentur. *Usus* ex definitione iam patet.

228. V. PROSTATÆ, rectius *Prostata*, est unicum corpus, globosum, quasi cordiforme, mox ante collum vesicæ situm, & totum urethræ principium cingens. d) *Huius Magnitudo*: instar nucis circiter iuglandis.

Prominentiæ duæ, natiformes, in parte posteriori.

Eminentia, caput gallinaginis dicta, in urethra, cum duobus osculis, quæ ductibus eiaculariis & vesiculis seminalibus communia sunt: *sinuloque* novo his sæpe interiecto. e)

Substantia glandulosa & spongiosa robusta membrana cincta. *Foraminula*, sive *ductus excretorii* huius glandulae, ex cavernulis in urethram, humorem albicantem excernentes: in hominibus, decem vel duodecim; in canibus, quamplurimi.

Vasa, cum vesiculis seminalibus communia.

Usus: liquorem albicantem secernere: qui vero, cum eum etiam eunuchi habeant, fecundum semen non constituit, licet in coitu quoque effundatur; sed pro lubricanda urethra & vehiculo seminis inservire videtur.

229. V.

a) *Lealis* de part. semen confic. fig. II. b) *ibid.* (27*) c) *Santorin.* p. 201. d) *Cbesel*, de Lithot. Tab. VI. e) *Mergagn.* Adv. IV. p. 6. fig. I, II.

29. V. PENIS, primum generationis organum est: cuius

onyma: membrum virile, virga, mentula, colis, prius, &c.

ra, situs, numerus, magnitudo, omnibus nota sunt.

tes sunt, 1. penis ipse; 2. glans; & 3. urethra.

ene notanda,

Cuticula, & *cutis*, tanquam tegumenta communia.

Præputium: quod est cutis replicata, glandem tegens: in cuius inferiori parte *frænulum*: quæ utraque papillis nerveis, & glandulis, (rectius forte folliculis: nam veræ glandulæ hic vix conspiciuntur) a *Tyfone*, Anglo, odoriferæ dictis, stipata sunt. a)

Tunica, propria, robusta, naturæ tendineæ, reliquam penis substantiam amplectens: quæ quandoque duplex, cum interiecta tunica cellulosa, post inflationem & exsiccationem conspicua. b)

Corpora duo cavernosa, seu *spongiosa*, maximam penis molem constituentia: quæ distincta oriuntur utrinque ab ossibus pubis, e peculiaribus quasi *thalamis* c), deinde iuncta, ad glandem usque extenduntur: in quæ, si liquidum vel flatus impellitur, vel mercurius immittitur, penis fit rigidus, atque intumescit.

Septum inter duo corpora cavernosa, a coniunctione parietum horum corporum provenit: & in parte posteriori crassius; in anteriori, tenuius; atque cribri instar perforatum.

Ligamentum Vesalii, quo penis iungitur synchondrosi ossium pubis. d) De lateralibus vid. Not. (28*).

Musculi penis varii sunt, erectioni potissimum inservientes: de quibus videatur *Myologia*.

Vasa penis eorumque mirabilis copia ac distributio, vid. in *Tabula nostra V.*

ANS

G

ovuper. Myotom. reform. p. 228. b) *Ruyseh* Epist. XV. Tab. XIX. Hanc vero cellulosam tunicam non semper adesse, ipse *Ruyseh* in *Advers. Anat. Decad. I. pag. 21.* indicat. c) *Sætorin*. p. 28. d) *Morgagn*. *Advers. Anat.* I. Tab. IV. fig. 4.

GLANS, caput, five *balanus*, anterior pars penis est: cuius figura & color nota sunt. In hoc vero ulterius notanda

Superficies, lævis, quasi polita, & valde sensilis, ob *papillas nerveas*, in pene rigido maxime conspicuas.

Vrethræ finis, reliqua urethræ parte paullo angustior, sua qua *frænulum* penis.

Corona, circumferentia posterior glandis dicitur, cum subiecta cervice: in quibus nonnulli *parvas glandulas* statuunt a) *Santorinus* vero tantum *oscula* five *ductulos*

Substantia: ex epidermide maxime & corpore cavernoso quod urethræ continuum, & hic in globum, vel bulbum quasi, expansum est, constat b): quibus tunica penis intexitur. c)

URETHRA: quæ est canalis membranaceus, fere cylindricus vesicæ collo continuus ad extremum usque glandis se extendens, ad urinam & semen transmittendum. Huius

Situs, in sulco quodam, qui efformatur in inferiori penis parte, interstitio duorum corporum cavernosorum.

Progressus: non est rectus, sed singulari modo flectitur.

Longitudo duodecim vel tredecim pollicum.

Cavitas: cum calami scriptorii crassitie fere convenit.

Substantia: ex membranis duabus robustis, interiori exteriori: quibus *substantia* spongiosa five *cavernosa* interiacet, ubi *glandulae* exiguae a nonnullis statuuntur.

Bulbus, five protuberantia urethræ: est pars eius prostitis proxima, parte reliqua crassior, pollicem longa, bulbum quodammodo referens, substantiæ spongiosæ crassioris.

Superficies interior varia habet *foraminula*, rotunda, oblonga, & *canaliculos*, ex quibus sæpe liquidum viscidum exprimi potest; quod urethram lubricat, & contrariorum acrimoniam inservire videtur. f) Conf. *Littrii* nova urethræ descriptio loco cit.

230.

a) *Littrius* Hist. Acad. Reg. 1700. *Morgagn.* Advers. I. Tab. fig. IV. 4. b) *Ruysch.* Observ. anat. Obs. 100. c) *Santorin.* p. 191. d) fere ut *Algh.* delineavit in Tract. de Lithot. Melius tamen *Morgagn.* Advers. III. p. eum descripsit. e) ita sustinet *Terraneus* lib. de Gland. p. 32. f) *Morgagn.* Advers. I. Tab. 4. fig. 4. e.

30. Ad penis considerationem adhuc pertinent
 GLANDULAE COWPERI, *mucose dictæ*: quarum tres describit. *a)*
duæ, in utroque urethræ latere una, inter musculos ac-
 celeratores & bulbum urethræ sitæ, figuræ ovatæ, aliquo
 modo compressæ, parvæ fabæ quasi magnitudine, liqui-
 dum diaphanum, mucosum (quælibet per singularem
 ductum excretorium, duos fere digitos longum, perfo-
 rata utraque urethræ tunica) in urethram transmitten-
 tes: quod pro lubricanda & defendenda urethra ab uri-
 næ acrimonia, inservire videtur. In plerisque tamen, in
 quibus has glandulas inquisivi, cadaveribus, eas, præfer-
 tim adeo magnas, ut a Cowpero delineantur, reperire non
 potui: hinc valde dubito, an semper adsint. (29*)
una, quæ *tertia* est, in angulo curvaturæ urethræ, sub os-
 sibus pubis, intra corpus spongiosum sive cavernosum
 urethræ, sita esse dicitur, atque etiam ab ipso lentis quasi
 figura delineatur: quam tamen quoque videre mihi
 nondum licuit.

GLANDULA LITTRII *b)*, est glandula, inter utramque
 urethræ membranam sita, proxime infra prostates, Colo-
 ris obscure rubentis, pollicem *lata*, duas lineas *crassa*, ure-
 thræ internam membranam instar zonæ ambiens, eam-
 que multis osculis minimis perforans: per quæ liqui-
 dum mucosum, ad urethram illinendam, infundit.

VASA penis, urethræ, & harum glandularum sunt
 arteriæ, ab hypogastricis & pudendis.

venæ, valvulis instructæ, ad eiusdem nominis venas sangui-
 nem revehunt: in pene vero (vid. Tab. V. nostra) & de-
 inde sub ossibus pubis prius mirabiles anastomoses, quas
 Santorinus p. 193. *labyrinthum* vocat, conficientes.

lymphaticæ, ab ultimis ossis sacri. Vasa lymphatica a Cowpero *c)* &
 Drackio *d)* pulchre delineata.

Usus penis *primarius*, ad coitum & sobolis procreationem.
secundarius, ad urinæ excretionem.

Scriptio Glandul. nuper detectæ. 4. Lond. 1702 cum fig. quæ etiam in
 Alkii Antropol. Tab. IV. & V. & Terraneo Lib. de Glandul. p. 65 Tab.
 lit. M.M. delineatæ sunt. Describuntur etiam a Littrio Hist. Acad.
 g. A. 1700. *b)* loco modo citato. *c)* Myotom. reform. Fig. 10. *d)* An-
 topolog. Tab. VI.

234. IN PARTIBVS GENITALIBVS MVLIERVVM notandæ PARTES EXTERNAE, five eæ, quæ sine sectione, & tantum diductione videri possunt: ut

Pudendum seu vulva: in cuius medio, rima & os vaginae ad inferiorem partem, *frænulum* ac *perinaeum*.

Labra duo, & *mons veneris*, a pinguedine substrata tumida, ac crinibus obsita, una cum eorum usu.

CLITORIS, seu *mentula muliebris*: in qua notanda

Situs: in superiori rimæ parte, tota fere ut plurimum extra veneris stimulum, sub cute five præputii latens.

Figura & magnitudo ordinaria, ad apicem digiti auricularis accedit; extraordinaria, subinde ingens ut penem virilem quandoque æquaverit a); se fine urethra.

Glans, five *apex*, qui vero non est perforatus: humore tamen foetido inquinatus, ut corona penis.

Præputium glandem obvelans a cute pudendi, quo papillis nerveis est instructum, & hinc valde sensibile.

Ligamentum, quo ossibus pubis iungitur, fere ut pene. c)

Crura, duo: clitoride triplo longiora, ab ossibus pubis

Corpora duo cavernosa, cum septo medio, fere ut pene virili, substantiam eius constituentia: quae membrana nervea cincta sunt.

Musculi erectores, duo, ut in eodem pene: qui ossibus ischii oriuntur, & in corpora cavernosa inferuntur.

Vasa: (quæ & reliquis externis partibus sunt communia:)

Arteria & vena, ab hypogastricis & pudendis.

Nervi, ab osse sacro: quorum insignes rami dorsum clitoridis excurrunt, unde adeo sensibilis.

Ufus: gratum titillationis sensum excitare, atque voluptatem veneream mulieribus augere.

NYMPHAE

a) Qualia exempla habent, *Panarollus*, *Platerus*, *Plazzonus*, *Rhodus*, *Graafius* & *Tulpius*, &c. b) *Santorinus* p. 191. c) *Graaf*, de Mulierum organis, cap. 3. & *Morgagni*, *Advers.* l. pag. 20.

NYMPHAE, sunt partes duæ membranaceæ, utrinque ut-plur. una, rubellæ, cavernosæ, cristis gallorum sub gutture pendentibus similes, modo maiores, modo minores, præputio continuæ, atque interiori labrorum lateri iunctæ: in quibus notanda

{ *Papillæ nervæ*, copiosæ, unde valde sensiles.

{ *Glandulæ* parvæ, substantiam sebaceam secernentes. a)

{ *Usus*: titillationem atque voluptatem augere, ut & urinæ fluxum ita dirigere, ne pedes madefiant.

Orificium vaginae, sive *os uteri externum*, cavernosa substantia cinctum, quæ in venere intumescit. In virginibus, angustius; in venere sæpe utentibus, & quæ pepere-runt, largius; semper tamen vagina reliqua est angustius.

HYMEN, est membrana, modo circularis, modo lunata, modo alia ratione constituta b), in virginibus vaginam coarctans, atque in puellis parvis semper præsens: (30*) in quibus exiguam habet aperturam ad vaginam; in adultis vero plerumque maiorem. In coitu primo, nisi forte iam antea læsa, laceratur, sanguinemque sæpe fundit.

Caruncula myrtiformes, ex hymenis laceratione oriuntur, & nunc duæ, tres, nunc quatuor, eo ipso loco observantur, ubi olim hymen erat; desuntque in infantibus.

Urethra, sive *meatus urinaris*; circa quem notanda.

{ *situs*: recta infra clitoridem, parva eminentia se prædens.

{ *longitudo*, duorum quasi digitorum transversorum.

{ *amplitudo*, maior quam in viris: in fine tamen reliqua parte angustior, magnam admittens dilatationem.

{ *ductili*, liquidum mucosum, contra urinæ acrimoniam, excernentes, ut in virili, originis adhuc incertæ. c)

Lacuna Grafi, sive oscula circa urethram conspicua; sunt ductus, humorem pro vagina lubricanda excernentes, ex urethræ corpore glandoso oriundi. d)

Morgagn. Advers. I. Tab. III. ee. b) ibid. GG. Santorin. Tab. 2. fig. I. e. conf. delineatio eius, sicuti in puella, 14. annos nata, a me inventa est, in Ephem. Nat. Cur. Cent. VII. c) Morgagn. Adv. I. §. 10. & IV. p. 44. Terraneus de Gland. p. 44. d) Morgagn. Adv. I. Tab. III. & **.

235. PARTES INTERNÆ, generationi inservientes, sunt
 I. VAGINA VTERI: quæ est canalis amplus, intestino recto non multum absimilis; sed robustior: ab orificio vaginæ, inter vesicam & rectum, quibus adhæret, ad uterum extensus. Huius

Longitudo, sine distractione, sex vel septem digitorum.

Amplitudo, maior intestino tenui; atque in diversis casibus, præsertim partus tempore, multum dilatari apta; orificium vero reliqua parte angustius, & sphinctere coarctatum.

Substantia: membranacea, intus rugosa, nervea, papillaris; (observatore Ruyschio) & hinc valde sensilis; extus musculosa, qua penem in coitu blande complecti queat.

Connexio: pars anterior, cum vesica; posterior, cum intestino recto; superior, cum utero concreta est.

Rugæ vaginæ; quæ non sunt circulares, sed fere ut in ieiuno.
 in virginibus, maximæ, præcipue in parte anteriori;
 in venere sæpe utentibus, minores, quasi attritæ; &
 post crebriorem partum, fere prorsus obliterantur.

Usus: 1. pro voluptatis venereæ, tam maris, quam feminæ, augmento; 2, pro faciliore dilatatione in partu.

Lacune sive *oscula*, uti circa urethram, ita & circa os vaginæ hinc inde reperiuntur, setas sæpe admittentes, magnam partem a glandulis substratis, *prostate Bartholini* dictis, liquidum mucosum pro vagina lubricanda & forte stimulo veneris excitando secernentibus, venientes. a)

Musculus sphincter sive *vaginæ constrictor*, est fibrarum muscularium series, orta a sphinctere ani, amplectens orificium vaginæ, & sub clitoride eius cruribus inferitur. Ibidem *corpus cavernosum*, orificium hoc ambit: quo in venere a sanguine distento, arctatur, ut penem virilem gratius afficiat, & ab eodem vicissim grate afficiatur.

Usus: penem & genituram virilem admittere; foetum vero, secundinas, menstrua & lochia ex utero emittere.

236. II.

a) Morgagn. Advers. primis §. 31. Tab. III.

. II. UTERVS, five *Matrix*, est pars, in mulieribus, inter vesicam & intestinum rectum sita, cava, figura piri aliquo nodo compressi, generationi fœtus destinata. In quo notanda

Connexio: pars posterior libera est; anterior, cohæret vaginæ; partes laterales, per ligamenta; quæ duplicia: lata, membranacea, cum peritonæo continua, utrinque uterum & vaginam pelvis parietibus iungentia. Duplici ea constare membrana, nuper observavi, quibus *cellulosa*, flatu facile detegenda, interiecta est, fere ut in mesenterio.

Rotunda: a parte superiore uteri orta, transeunt per annulos musculorum abdominis, & mox ibidem terminantur in pinguedine iuxta inguina. Constat ex membrana duplici, plexu vasculoso a), fibrisque lacertosis, in puerperis & prægnantibus maxime conspicuis. b)

Magnitudo: in adultis non gravidis, *longitudo* est trium quasi pollicum; *latitudo*, in parte superiori, duorum; in inferiori, unius: *crassities* vero sesquipollicis. In virginibus adhuc minor; sed in gravidis, pro diverso tempore, varia.

Divisio: pars superior & latior, *fundus*; inferior, *cervix* appellatur: & in hac, vagina prius aperta, se offert conspiciendum

Orificium, five *os uteri internum*, figura fere glandis penis in vaginam hians: exiguum valde in virginibus; in iis vero, quæ pepererunt, & in gravidis paullo maius, atque in his humore valde glutinoso clausum: in partu tamen, miraculo naturæ, fœtum perfectum transmittit.

Substantia musculosa, vario fibrarum carnearum plexu composita, copiosissimis vasis interiectis. In non gravidis compacta & firma est; in gravidis, *spongiosa*, *sinuosa*, & mirabiliter dilatari potest, sine crassitie decremento vid. Nota (31*). Extus membrana robusta a peritonæo; intus in *cavitate*, quæ in virginibus parva est c) membrana *porosa*, nervea, cingitur, quæ in puerperis quasi disparet. d)

asa,

G 4

a) Morgagn. Advers. IV. pag. 49. 50. b) Santorin. Observ. pag. 220.
c) vid. in Morgagn. Advers. I. Tab. III. (d) idem Advers. IV. pag. 47.

Vasa sanguifera tortuosa, anastomoses innumeras confidentia, & in gravidis quasi in *sinus a)* dilatata: osculis in uterum & vaginam hiant, & *menstruorum fontes* sunt. (32*)

Arteriæ: 1. *spermaticæ*, ex aorta; 2. ab hypogastricis maximæ; 3. ab hæmorrhoidalibus externis, omnes mire inter se communicantes: ita, ut, si aer, cera vel mercurius in unam earum, quamcunque, iniiciatur, reliquæ omnes, etiam alterius lateris, facile repleantur.

Venæ, quoque triplices, eiusdem nominis, valvulis destitutæ, arteriis longe ampliores, præsertim in gravidis, per quas flatus in cavum uteri & vaginæ; & contra quoque per hæc sæpe in venas impelli potest. *b)*

Nervi, ab intercostalibus & ossis sacri.

Vasa lymphatica, olim in bestiis tantum, nunc quoque a *Morgagnio* in gravida observata. *c)* Quæ enim humano adhuc utero appinguntur, ficta esse videntur.

Ostiola, interiectis rugis, ceu valvulis *d)*, in cervice uteri, ductus videntur, liquidum glutinosum secernentes.

Vesiculæ, sive corpuscula globosa, in uteri cervice & orificio quandoque observantur *e)*, humorem mucosum continentia, a multis pro *hydatidibus* habitæ *f)*, a quibusdam pro *glandulis g)*, liquidum illud glutinosum secernentibus, quod in gravidis os uteri intus claudit. Ab aliis, pro NOVO ET VERO OVARIO, in quo foetus effingitur, habentur. *h)* Nonnullis *vesiculæ seminales mulierum* audiuntur *i)* ex quibus in coitu semen prolificum profundi suspicantur. *k)* Hinc *usus* adhuc dubius. In puerperis & gravidis confertissimæ sunt, *l)* magisque quam alias conspicuæ.

237. III.

a) Morgagn. Advers. IV. p. 48. Vater. de Vtero. *b)* Fanton. Anat. corp. hum. p. 186. Vater. loc. cit. *c)* Advers. IV. p. 76. *d)* ibid. Advers. I. Tab. III. *e)* ibid. delineatæ. *f)* vid. Autores a Morgagn. Advers. I. §. 32. recensiti; & Ruysch. Advers. anat. decad. I. p. 5. *g)* Morgagn. eodem loco, & Verheyen. l. c. c. XXXIII. *h)* Naboth. dissert. de Sterilitate; & Frid. Hoffmann. in Medic. rational. Tom. I. & contra hanc opinionem, Gœlicke Hist. Anat. p. 183. Etmüll. Epist. de Ovario novo, & Hilscher diss. de Generat. p. 2. *i)* I. ettres des Desnoves p. 70. & Blegny Zodiac. Tom. 1. p. 20. *k)* Heinrichi dissert. de Vesic. seminal. mulierum. *l)* Santorin. p. 213.

7. III. Ovaria, olim TESTES MULIEBRES dicta, sunt duo corpora quoddammodo globosa, lævia, albicantia, (utrinque unum) fundo uteri annexa: circa quæ notanda

Connexio: 1. cum fundo uteri, ope ligamenti teretis, a veteribus vas deferens mulierum dicti, quod veromeatu ad uterum destituitur; 2. cum tuba Fallopiana & lateribus pelvis per ligamenta uteri lata, & alas vespertilionum; 3. ope vasorum spermaticorum cum variis aliis partibus.

Figura: fere ovata, superne, gibbosa; inferne, plana.

Magnitudo: pro ætatis & temperamenti ratione diversa: in vigore ætatis & libidinosis, maxima, ad zij. ascendens, & vesiculis prominentibus sæpe ornata; in vetulis vero exsucca, parva, corrugata, vix zß. pendens, cicatricibus fœda.

Ala vespertilionum: sunt membranæ ovariis & tubis interiectæ.

Membrana alba, valida, cinguntur a peritonæo.

Substantia: membranacea, fibrosa, reticulata, plurimis vasis intertexta: inter quæ sæpe apparent *vesicula rotundæ*, plures, pauciores, pro ætatis & temperamenti diversitate, humore albo ovi simili, repletæ: qui humor ebulliendo consistentiam, colorem & gustum quoque albi ovi adipiscitur: hinc ob analogiam cum ovis a *Stenone* primum a) dicta sunt OVULA, quorum maxima pisum vix æquant. Quandoque x, xv, xx, imo plura in uno ovario visa sunt; quandoque vero vix unum vel alterum observari potest: creduntur prima fœtus rudimenta continere. b)

Hydatides ibidem quoque sæpe reperiuntur: quæ vero morbosæ, & sæpe hydropis in mulieribus causæ sunt.

Corpora lutea, sunt substantia quasi glandulosa c), lutei coloris, intestinulorum tenuissimorum similitudine contorta d), ovulis substrata, quæ in sinu eorum continentur, cum in virginibus, tum maxime in gravidis & puerperis conspicua, usus adhuc dubii, e)

) in dissect. pisc. ex can. gen. b) vid. Brendel. de Embryone &c. Vallisnerius de Generat. aliique. c) secundum Graaf, Malpigh. Brendel. Berger. &c. d) Vallisner. & Santorin. p. 221. & seq. e) conf. Morgagn. Adv. IV. p. 51. & 78. Vallisner. & Santorin. lociscit. vid. Nota (33*)

238. IV. TUBAE FALLOPIANAE, (*Ruffo* iam notæ) sunt duo canales fere conici, tortuosi, utrinque unus, fundo uteri iuncti, a similitudine cum tuba a *Fallopio* ita dicti: in his notanda,

Connexio: cum utero, arcta & continua; cum ovariis, laxa, per alas vespertilionum.

Longitudo: VI, VII, quandoque VIII, IX circiter digitorum.

Amplitudo: circa medium ferè minimum digitum æquat;

Extrema vero angustiora & quidem extremitas utero iuncta minima est, in eius cavum hians, flatum ac stylum renuem transmittens. Altera, libere in abdomine fluctuans, amplior est, tubulum mediocrem admittit, *fimbriisque* multis, sive *laciniis*, quasi muscularibus, ornata est, ovario, quando opus est, se applicantibus: vid. Tab. III. fig. 10. 11.

Substantia: membranacea, cavernosa, ex duplici membrana constans: quarum exterior cum peritonæo, interior cum uteri interiori membrana videtur continua. Intus rugosa est, & lubrico humore imbuta; sed non, ut in bestiis, cellulosa.

Vasa copiosissima, *corpus cavernosum* intra membranas earum efficientia, ut erigi sive rigidae reddiqueant, quando ovario applicandæ, a quibus etiam intus humectantur. a)

Usus: Tempore fervidi coitus influxu copioso sanguinis atque spirituum eriguntur, & motu naturali, orificia libera, ope fimbriarum sive laciniarum muscularium, ovariis applicantur, genituram prolificam masculinam transmittunt; b) ovulum imprægnatum ex ovario recipiunt, & ad uterum, si nihil impedit, deferunt. c)

Oviductus in gallinis aliisque avibus appellantur.

239. *Usus uteri*: genituram virilem admittere; ovulum fecundatum, ex ovario & tuba Fallopiana, recipere; fœtum per IX utpl. menses continere, fovere & nutrire, ac tandem perfectum, vi sua musculosa, per os suum & vaginam expellere.

240. *Post*

a) ita *Drake* Anthropol. Tab. X. fig. 2. ea delineat & describit. Vid. hac de re notæ nostræ num. 34*) b) *Russch.* Thes. anat. V. Tab. V. fig. 1. atque *Advers. anat.* dec. 1. pag. 3. *Fallop.* Observ. anat. & *Graaf.* de Org. gener. mul. cap. XIV. c) exempla fœtuum in tuba hac, & alias extra uterum repertorum, vid. Nota (35*)

40. Post *impregnationem*, nova contingit partium in feminis productio; quæ tamdiu in eis existunt, quamdiu durat graviditas. Harum pars principalis est *EMBRYO* sive *FOETVS*; a) reliquæ, ut *membranae fœtus*, *placenta uterina*, *funiculus umbilicalis*, *vasa umbilicalia*, (quæ coniunctim *Celso* *SECUNDÆ*, vulgo *Secundinae* vocantur) & *liquor perlucidus*, *glutinosus*, cui *fœtus innatat*, omnes propter hunc factæ sunt.

41. Circa *FOETVM* igitur perfectum considerata

MEMBRANAE, eum in utero, quasi in ovo includentes. b)

1. Exterior, *CHORION* dicta, crassa, spongiosa, villosa, & vasis sanguiferis copiosissimis repleta est, utero contigua, atque in lamellas sive membranas duas dividua.

2. Interior, sive secunda, *AMNIOS* vocatur: quæ tenuis & perlucida est, priori contigua; in qua vero vasa vel nulla, vel paucissima, conspiciuntur; & *liquor ille glutinosus, perlucidus*, *fœtusque* in ea continentur; quæ vero membranæ in partu rumpuntur, & liquorem emittunt.

3. *ALLANTOIS*, seu *farciminalis* dicta, in nonnullis bestiis, præsertim vaccis, uracho pervio continua, pulchre reperitur; sed non in homine: & pro urinæ collectione in eis inservit. c) *Longitudinem* habet in vaccis duodecim circiter pedum; eiusque diameter, quando flatu distenta est, pedem superat: adeoque pars ingens & stupenda est. Sustinent quidem nonnulli, eam æque esse necessariam in homine quam bestiis; & hinc evincere volunt, quod quoque necessario in homine existat. Alii eam inrer chorion & amnion, alii sub amnio statuunt d), verum quia eam præstantissimi anatomici non inveniunt, & urachus in fœtu humano plerumque clausus reperitur, aliæque graves rationes reddi queunt, quare Deus mulieres ab hoc lotii onere liberare voluerit, a plerisque nondum admittitur. *Vasis sanguiferis* eam destitutam esse volunt; quæ vero copiosa reperi & delineavi. e)

242. II.

a) embryones parvi, vid. in *Ruyseh. Thes. anat. VI. Tab. 2. & 3.*
 b) tales in membranis, *Thes. X. f. 3. & Tab. VI. nostra.* c) vid. observ. nostra de *Allantoide Eph. N. C. cent. VI. obs. 24.* d) vid. *Act. Angl. N. 271. p. 835.* ubi delineata est. e) loco antea citato.

242. II. PLACENTA, veteribus, *hepar uterinum*, dicta: in qua consideranda

Numerus, in mulieribus respondet numero foetuum: ita tamen, ut in gemellis sæpe coalitæ sint; quorum tamen vasa inter se communicare non videntur: in multis vero bestiis, præsertim vaccis, plures & quandoque centum pro uno foetu, reperiuntur: dicunturque ibi **COTYLEDONES**. vid. Fabr. *ab Aquap.* de foetu formato.

Figura orbiculata, diametrum habens octo circiter novemve pollicum, & crassitiem pollicis unius.

Connexio: pars convexa & spongiosa utero adhæret, *interventu membranæ tenuissimæ, reticulatæ, villosæ, chorio continuæ*: concava vero, foetum recipiens, vasa multa & ampla ostendens, atque funiculo umbilicali iuncta, cingitur lævi membrana chorii & amnii.

Locus: cui in utero adhæret, nullus est certus & perpetuus; plerumque tamen eius fundo: ubi *Ruyfchius* haud pridem *novum in puerperis musculum*, fibris spiralibus constantem, sibi detexisse visus est; a) sæpe etiam parti posteriori.

Substantia, secundum recentiores plurimos, est *glandulosa*, ex innumeris parvis glandulis, composita; quæ vero videri nequeunt. Hinc melius secundum *Ruyfchium*, variosque alios hunc iam sequentes, *vasculosa* statuitur, ex meris vasculis, arteriis scilicet & venis umbilicalibus, subtilissime divisis & intertextis, constans b): nam cui usui hic erunt glandulæ, ubi secretio illius, quod ex utero placentam intravit, iam facta est?

Ufus: 1. una cum chorio sanguinem & succum nutritium absorbere, ut intestina chylum c), eumque deinde ad foetum, per venam umbilicalem, transmittere. 2. Verisimiliter etiam sanguinem & urinam, a foetu ad matrem, per arterias umbilicales rursus emittere. vid. Not. (36*).

243. III. VA-

a) vid. Adv. anat. Dec. III. Tab. III.

b) *Ruyfch.* Thes. anat. V. Tab. I. & Hist. Ac. Reg. 1714.

c) *Ruyfch.* ibid, p. 16, conf. Hist. A. R. An. 1708. p. 240.

243. III. VASA UMBILICALIA foetus, post partum in *ligamenta* illa (§. 207.) abeuntia, sunt

Arteriae, duae: vena longe tenuiores, oriundæ ut plur. utrinque ex iliacis internis sive hypogastricis arteriis, quandoque ex ima parte aortæ: progrediuntur in utroque latere vesicæ ad umbilicum; hinc per funiculum umbilicalem, spiralibus contorsionibus, ad placentam: ubi, in infinitos ramulos divisæ & subdivisæ, finiuntur, sanguinemque e foetu ad placentam, & inde forte quoque rursus ad matrem transferunt. *a) Quare vero duæ, non una, ut unica vena?* Forte, ne facile hæmorrhagia lethalis oria-
tur, si funiculus umbilicalis casu abrumpatur; vel aliam ob causam post partum non statim, aut non satis ligetur.

Vena, una: arteriis duplo amplior, in placenta ex innumeris ramusculis, in unum truncum coalitis, orta: pergit inde, similibus fere contorsionibus spiralibus, inter arterias, per funiculum umbilicalem, & deinde per umbilicum ad hepar foetus: ubi finitur in *sinu venæ portæ*, in quem, sanguinem, cum succo nutritio, in placenta haustum, infundit: unde per singularem *canalem, venosum dictum b)*, cylindricum, venæ umbilicali quasi oppositum, ex hoc *sinu portæ*, magna parte mox ad venam cavam & cor transit; pars vero reliqua ramis venæ portæ per hepar distribuitur.

Vrachus, in vitulo, ove, &c. est canalis pyramidalis, a fundo vesicæ primo ad umbilicum extensus, quem transit, & deinde sensim denuo ampliatus, in *allantoidem* (§. 241. 3) tunicam, ad angulos utrinque fere rectos, sive transversim in latus aliquod terminatur *c)*, ad quam, urinam e vesica deducit. *d)* In foetu humano totus pervius non est *e)*, aut tamen rarissime; sed plerumque instar ligamenti solidus reperitur: hinc canalis munere in hoc tunc haud fungi videtur; præsertim quia tunica allantois, aut alius eiusmodi locus, in quem se exoneret, haud reperitur.

244. IV.

a) conf. Nota (36*). *b)* vid. Tab. nostra III. fig. 12. *c)* vid. *Fabr. ab Aquap.* de foetu formato, Tab. 13, 14. *d)* vid. *Ephem. Nat. Cur.* Cent. VI. observ. 24. *e)* Cent. III. & IV. obs. 194. p. 465.

244. IV. FVNICVLVS VMBILICALIS, est pars funiculi specie contorta, crassitie digiti, aut pollicis, ex una vena & duabus arteriis, umbilicalibus dictis, (243) communi membrana crassa, sed molli, quasi spongiosa, ex cellulis plurimis, liquore glutinoso limpidorepletis *a)*, amnio continua, cinctis, composita; cuius

Ortus: est in placenta, multis venæ & arteriarum radicibus; *finis*, in umbilico foetus.

Longitudo, nunc duarum, nunc trium, nunc quatuor quasi spithamarum: 1. ut foetus libere, sine avulsione placenta ab utero, se movere possit; 2. ut foetu excluso, etiam si vasa hæc non mox sint ligata, tam facile lethalis hæmorrhagia non oriatur.

Usus: generatim, ex vasis umbilicalibus constat; speciatim, ne vasa hæc seorsim singula pergentia, a foetu facile lædantur, & ut huius ope placenta post partum ex utero commodius educi queat.

245. V. NVTRITIO FOETVS in utero: quam fieri putamus *mensibus primis*, organis digestionis nondum perfectis, per solum funiculum umbilicalem;

mensibus vero ultimis, multas ob rationes, etiam simul per os, a liquido blando, glutinoso, foetum ambiente: quod ex amnio excerni videtur. Nam reperitur 1. simile liquidum in ore, œsophago & ventriculo, tam foetus humani, quam bestiarum; 2. mutatum & quasi digestum hoc conspicitur in intestinis tenuibus; 3. fæces in crassis, & subinde etiam toto ileo, ut aliquoties observavi, *meconium* dictæ, reperiuntur copiosæ; 4. multum illius liquidi primis mensibus ambit foetum; paucum vero sæpe ultimis reperitur: quod alia ratione non consumi videtur, quam a foetu; 5. quia illud liquidam foetum ambiens nutritioni tam idoneum est, ut aptius desiderari non posset; 6. illudque in os, œsophagum & ventriculum premi videtur a perpetua renitentia uteri, pressione muscutorum abdominis & aeris ambientis *b)*; ut œsophagus, intestina, vasa lactea, ductusque thoracicus hoc ipso melius dilatentur, aperta ferventur, & functioni destinata sensim assuescant. &c.

246. Si-

a) vid. *Roubant*. in Hist. Acad. Reg. An. 1714. *b)* vid. Nota (37**).

46. VI. SITVS FOETVS in utero :

{ *mensibus primis & mediis*, varius est & prorsus incertus.
 { *mensibus ultimis*, plerumque sedens quasi percipitur, ca-
 { pite & collo inclinato; genubus versus genas, & cal-
 { caneis ad nates retractis. Manus eius ut plurimum
 { sunt demissæ: & pedes quasi amplectuntur. a)

{ *brevi ante partum*, plerumque ita se vertit, ut caput pro-
 { labatur deorsum ad os uteri; nates vero & pedes sur-
 { sum erigat. Sæpe tamen toto gestationis tempore va-
 { riat, & ad partum instantem usque caput in suprema
 { vel laterali uteri parte percipitur vid. Spigel. de foetu
 { formato.

47. VII. PARTVS: qui est foetus perfecti, naturalis per
vaginam ex utero, ruptis foetus membranis, exclusio: cuius

{ *cause* excitantes, quotquot ab Autoribus vulgo recen-
 { sentur, ut uterus maiorem expansionem non admit-
 { tens, stimulus meconii & urinæ, aeris & respirationis
 { necessitas, &c. incertæ ac dubiæ sunt.

{ *legitimum & ordinarium*, sunt menses ix solares
 { aut x lunares: sive hebdomades quadraginta.
 { *præmaturum*, menses vii vel viii: quibus tamen
 { *tempus* { foetus vitalis adhuc sive superstes esse potest.
 { *nimis præmaturum*, si foetus ante septimum men-
 { sem excluditur; qui partus ABORTVS dicitur;
 { & vitalis esse non solet.

{ *modus ordinarius sive naturalis* est, si foetus prono capite
 { exitum molitur: ubi os uteri aperitur, membranæ fœ-
 { tum ambientes rumpuntur, liquor contentus effundi-
 { tur, foetusque uteri, musculorum abdominis & dia-
 { phragmatis contractione expellitur; reliqui eius in
 { partu situs, morbofi habentur, & causæ sunt partus
 { difficilis, imo sæpe impossibilis; nisi arte emendetur.
 { Interea tamen illi partus, ubi foetus pedibus vel natibus
 { exitum quærit, ad naturalem quam maxime accedunt:
 { & vel sine artis ope, vel levi tantum adminiculo nasci
 { potest.

248 DI-

a) An. 1722. gravidam incidi, quæ octavo gestationis mense, glande
 plumbea, per caput traiecta, Interfecta erat. In hac caput iam
 infimam, nates vero supremam uteri partem occupabant.

248. DIFFERENTIAE notabiliores, quæ inter fœtum & adultum, ante, aut brevi post partum, intercedunt.

In abdomine, (præter certum quandoque humorem)

{ *Vena & arteria umbilicales*; & *canalis venosus* in hepate, per-
via & ampla satis sunt, in adultis solida, contracta.

{ *Hepar* valde magnum. *Ventriculus*, liquore glutinoso; *intestina* vero crassa, & sæpe etiam ileum, meconio repleta.

{ *Processus vermiformis* intestini cœci, ut plurimum amplior, quam in adultis, & fœcibus quoque repletus.

{ *Renes*, *succenturiati* dicti, maiores, quam in adultis.

{ *Renes* ipsi inæqualem habent superficiem, ut vitulini.

{ *Vesica*, figuræ longioris, ad umbilicum valde protenta.

{ *Hymen* in fœtu feminino plerumque præclare occurrit.

In thorace, (præter similem, ut in abdomine, humorem)

{ *Glandula thymus*, maior quam in adultis;

{ *Pulmones*, qui non respirarunt, collapsi & nigricantes reperiuntur, atque aquæ iniectioni, fundum petunt.

{ In corde, *foramen ovale* inter dextram & sinistram auriculam, (38*) cum *membrana* sua fluctuante, & *canalis arteriosus*, inter arteriam pulmonalem & aortam, aperta, pro peculiari sanguinis circulo in non natis: quia respirare nequeunt in utero. Prope cor in venæ cavæ trunco inferiori *valvula insignis*. a)

In capite: (præter magnitudinem plerumque insignem)

{ *Ossa cranii* hinc inde distant, in primis ubi *fontanella* dicitur, & futuris destituuntur. *Cerebrum* valde molle.

{ *Dentes*, adhuc imperfecti & sine radicibus in mandibulis, sub gingivis absconditi latent.

{ *Meatus auditorius* nondum perfectus est, & *membranula* quadam peculiari, cum epidermide continua, post partum sensim rursus evanescente, clauditur. b)

Ossa totius corporis, paucis exceptis, vel molliora vel imperfecta adhuc sunt: & quædam adhuc prorsus cartilaginea.

Articulationes quoque nondum perfectæ. c)

DE

a) a Winslowv descripta in Hist. Acad. Reg. An. 1717. pag. 172. Chessel-
den. in Anat. edit. I. Tab. IX. fig. I. sub *Valvula nobilis* nomine eam
describit, sed in edit. III. hanc tabulam & descriptionem rursus
omisit. b) Kerkring. Osteogenia p. 222. & Ruysch. variis in locis.
c) Kerkring. ibid.

DE THORACE, ALTERA TRVNCI PARTE.

9. THORAX five PECTVS, dicitur magna illa pars corporis, inter abdomen & collum sita. In hoc consideranda

artes: quæ sunt vel

{ *continentes*, five cavitatem efficientes,

{ *communes*: cuticula, cutis & pinguedo
(§. 197, 198, 201.)

{ *proprie*: mammæ, muscoli pectorales, intercostales, alique plures; item diaphragma, pleura, & denique ossa: ut costæ, viginti quatuor, sternum, scapulæ duæ, & vertebræ duodecim, de quibus in Osteologia.

{ *contenta* in cavitate: ut mediastinum, pulmones, cor & pericardium, cum vasis inde oriundis magnis: præsertim trunco arteriæ aortæ & pulmonalis, venæ cavæ & pulmonalis; ductus thoracicus, & denique oesophagi five gulæ pars maxima. &c.

us: actionibus vitalibus, id est respirationi & sanguinis circulo potissimum inservire. Quibus in mulieribus etiam lactis præparatio accedit.

250. MAMMAE igitur hic primum describendæ : quarum figura omnibus nota. In viris nullius cogniti sunt usus ; hinc mulierum potius considerandæ : ubi notanda

Situs : in quadrupedibus , abdomini ; in mulieribus , thoraci adhærent : plures ob causas.

Numerus : in homine , duæ sunt ; in bestiis variis , varius.

Requisita pulchrarum mammarum : sunt magnitudo mediocris , distantia modica , cutis tenera & candida , substantia duriuscula , non flaccida aut pendula , & papilla parva rosea.

Magnitudo , varia : in virginibus mediocris ; in gravidis , puerperis & lactantibus , maxima ; in puellis , ante pubertatem , & in vetulis , minima : varians quoque variis in regionibus.

Tempus incrementi est annus circiter decimus quartus vel quintus ; quo turgere sive sororiari incipiunt.

Tempus decrementi , varium : plerumque annus circiter quinquagesimus , nunc citius , nunc tardius.

Papilla : quæ est eminentia parva , fere cylindrica , rubella in medio mammæ , *areola* cincta ; cuius

[*substantia* , cavernosa est , fere ut penis ; hinc erigi sive intumescere solet in contrectatione & lactatione infantium : constans fibris nerveis , reticulatis , sensum acutum præbentibus ; vasculis sanguiferis copiosis , a mammariis , tubulorum lacteorum extremis , & epidermide , reliquam substantiam cingente.

{ *foraminula* , seu *orificia tubulorum lacteorum* , in lactantibus optime , quando lac exprimunt , conspicua , sunt VII , VIII ad X in homine.

areola , glandulis parvis obsita a) , in virginibus grate rubella ; in mulieribus iunioribus , plerumque obscurior , aut pallidiuscula ; in vetulis , livida , foeda.

usus : pro lactatione foetus , quæ sine papilla fieri nequit.

Substantia

a) de harum natura vid. Morgagn. Advers. I. §. 12. & IV. p. 8. & sq.

stantia mammarum: Præter tegumenta corporis communia, epidermidem (scilicet, cutem teneram, & pinguedinem, constant ex singulari albicante glandulosa fabrica, substantiæ aberum in bestiis haud absimili, mediū potissimum mammarum occupante: quam copiosa pinguedo, magnam mammarum substantiam constituens, undique ambit, a) & cuius centro *papilla* respondet.

Globosa vero corpora, a Nuckio b) potissimum & Verheyeno c), aliisque, qui hos imitati sunt, pro glandulis multis iunctis, delineata & descripta, glandulæ revera non sunt, sed pinguedo: quod etiam confirmat Morgagnius. d)

Substantiæ vero illi glandulosæ, præter vasa, interiecti sunt *ductus*, sive *tubuli lactiferi*, ex glandulosa substantia oriundi, per anastomoses iuncti, in lactantibus ampli, in sinus quatuor & cellulas dilatati, lac secretum colligentes & asservantes, cum arteriis & venis communicantes: sicut illud lactis generatio; hoc eius dissipatio evincere videtur.

Hæc omnia tantum in *mammis turgidis*, magnis, & in primis puerperarum ac lactantium, conspici possunt; vix vero vel prorsus non in puellis imuberibus, vetulis aliisve mulieribus emaciatis, aut exiguis matris gaudentibus, apparent. *Arteria & vena*; a subclaviis, intercostalibus & axillariis, *mammaria* dictæ; quarum illæ, internæ; hæ, externæ appellantur.

Vi: a dorsalibus *spinalis medullæ*.

lymphatica: Warthonus e) addit.

1. lac ex arteriis in glandulosa substantia secernere, (quod nulla arte alias e sanguine præparari potest) in tubulis & sinibus lactiferis colligere, asservare, & suo tempore infanti per papillam præbere. 2. tenuitatem feminis conciliare. 3. stimulum veneris utrique sexui excitare: virili, dum pulchras mamillas vel solum aspiciunt; feminino, quando earum mammas contrectant masculi.

d. Morgagn. Advers. IV. fig. 3. b) Adenograph. fig. 2. c) Anat. Corp. hum. Tab. XVIII. fig. 2. & 4. d) Advers. II. 92. & V. 7. 8. e) Adenograph, cap. XXXVI.

251. Mammis remotis, consideratae occurrunt

1. duo *musculi*, *pectorales* maiores dicti, utrinque unus sub mammis fiti, ad brachia tendentes.
2. *musculi intercostales*, externi, viginti duo, totidemque interni, inter costas fiti, elevando costas, respiratori inservientes; de quibus vero prolixius in myologia.
3. *Membrana pleura* dicta, mox speciatim examinanda: totum thoracis cavum investiens.

252. His indicatis, *pectus aperiendum*; ubi notanda costarum utrinque in parte cartilaginea, iuxta partem osseam, dissectio & sterni elevatio: quod dum fit, occurrit

253. **MEDIASTINUM**: quod est membrana duplex, pleurae continua, sita sub sterni, eique firmiter cohaerens, thoracem secundum longitudinem, in duas partes dividens: ubi notanda

Interstitium cellulosum, satis notabile, inter utramque membranam, in parte diaphragmati vicina; in quo subinde inflammationes & abscessus oriuntur. (39*)

Connexio; cum sterni, pleura, pericardio, aliisque vicinis.

Situs, non accurate sub medio sterni; sed sensim ad latus sinistrum descendit, quo dextra thoracis pars amplior fit sinistra. a)

Vasa: arteriae & venae, a mammariis & diaphragmaticis; subinde vero propriae, ab aorta & cava, *mediastina* dictae.

Nervi, a diaphragmaticis & pari vago, exigui.

Vasa lymphatica, ad ductum thoracicum abeuntia.

Ufus: I. bipartiri thoracem secundum longitudinem, ob varias commodas, ut: 1. ne, uno lobo pulmonis ulcerato, mox alter inficiatur; 2. ne pus, aqua, &c. in una thoracis cavitate contenta, simul utrumque pulmonem afficiant; 3. ut uno thoracis latere vulnerato, in altero adhuc respiratio conservetur, ne vulneratus mox suffocetur. &c. II. Compensare sustentare pro liberiori eius motu: praesertim quando supini decumbimus.

254. Me.

. Mediaſtino diſſecto & ſterno remoto, conſide-
andus

TVS PARTIVM IN THORACE:

diaphragmatis, in parte inferiori, tranſverſe;
glandulæ thymi, in ſuperiori & media;
pulmonis, in utroque latere;
cordis, in medio quaſi, pericardio involutum, ita tamen,
ut maxima eius pars ſita ſit in latere ſiniſtro;
œſophagi ſive gulæ, in parte poſteriori & ſiniſtra;
vaſorum maiorum, ut *venæ cavæ*, & *venæ azygos*, in parte
poſteriori & dextra;
arteriæ aortæ, maxime in latere ſiniſtro & poſteriori;
ductus thoracici, in homine inter aortam & venam
azygos.

. Antequam autem hæc ſpecialius conſiderantur,
EVRA, prius examinanda: quæ eſt membrana lævis,
obuſta, tenſa, coſtis muſculisque intercoſtalibus adhæ-
ens, & totum thoracis cavum cingens. In hac no-
anda,

1. quod conſtet ex duobus quaſi ſacculis; quorum quilibet
unum latus thoracis inveſtit, & ſingulus ſingulum
lobum pulmonis continet; quodque ex horum con-
iunctione in medio thoracis oriatur *mediaſtinum* (253).
2. quod ex duplici lamella valde vaſculoſa compo-
natur.

[<i>arteriæ</i> , ab intercoſtalibus, mammariis & dia- phragmaticis, copioſiſſimæ. a)
	<i>venæ</i> , a venis eiusdem nominis, ac arteriæ: quæ
3. <i>vaſa</i> {	vero in venæ azygos, ut & cavæ truncum ſuperiorem omnes exonerantur.
	<i>nervi</i> , ex vertebraſ thoracis, & a diaphragma- ticis.
	<i>lymphatica</i> , ad ductum thoracicum abeuntia.
4. *Glandulæ* a quibusdam in ea ſtatuuntur, ſed immerito.
conf. Not. (6*).
5. *uſus*: inveſtire, lubricare & firmare totum thoracem.

256. THYMVS, est glandula, in recens natis valde insignis, in superiori thoracis parte, proxime sub sterno sita, pericardio, trunco aortæ & venæ cavæ superioris incumbens. . Huius

Extensio: a pericardio, secundum situm trunci aortæ, ad carotidum usque initium, imo quandoque ad thyroideam usque glandulam fere ascendit, ut aliquoties vidi.

Figura: incerta, varia, sive irregularis. *a)*

Color: in infantibus pallide carneus; in adultis, obscurior.

Magnitudo: in recens natis, maxima; *longitudo*, trium circiter digitorum; *latitudo*, duorum; & *crassities*, dimidii digiti: in pueris sensim decrescit *b)*, & tandem in adultis & senibus penitus fere rursus evanescit.

Substantia: glandulosa, conglomerata, membrana cincta.

Vasa { *sanguifera* modo a subclaviis, vel mammariis aut mesentericis; modo a carotidibus & iugularibus.

{ *lymphatica*, nunc a ductum thoracicum, nunc ad venam subclaviam abeunt, carentque ut plurimum valvulis. vid. Not. (40*).

Nervi, a pari vago aut intercostali.

Humor lacteus quandoque in recens natis in eo reperitur.

Ductus excretorius nullus cognitus, ideoque &

Vsus adhuc incertus. Forte lympham secernit, eamque per vasa lymphatica ductui thoracico infundit, pro sanguinis & chyli dilutione, sicuti glandulæ mesentericæ & pancreas agunt in diluendo chylo. Maior hinc usus eius est in non natis, quam in natis: quia illi respiratione adhuc destituantur, a qua tenuitas sanguinis maxime procuratur. *Bellingerus* vult, eum in utero præparare liquidum foetus nutritium, illudque per singulares ductus ad os eius demandare *c)*: quos vero ductus nemo adhuc invenire potuit.

257. DIA

a) vid. figura nostra 14 & 15 Tab. IV. *b)* An. 1725. in puero XII annos nato, hæctica extincto, eam scirrhus induratum & valde ingentem vidi. *c)* Traët. de Fœtu nutrito, Londin. A. 1711 edito.

7. DIAPHRAGMA est pellis ampla, musculosa, robusta, abdomen transverse a thorace distinguens; unde Latinis *septum transversum* appellatur. In hoc notanda

situs obliquus, inter abdomen & thoracem: sic, ut anterior & dextra pars altior, posterior longe sit declivior:

superficies superior est convexa; inferior vero concava.

connexio, cum sterno, costis spuriiis, pericardio, mediastino & vertebrae lumborum.

figura vulgo cū reticulo lusorio, vel raia pisce comparatur: at in transversum valde est oblonga & elliptica. v. fig. n. 13.

foramina, duo magna in eo notari solent. vid. nostr. fig. 13.

{ primum, in sinistro latere, pro gulæ & paris vagi transitu.

{ alterum, in dextro, per quod vena cava inferior transit.

interstitium, inter duo capita partis inferioris: aortam, venam azygos, & ductum thoracicum transmittens.

nomen: phrenica audiunt: (φρένες enim diaphragma significat.)

Arteriae, 1. ab aorta, vel cœliaca; 2. a subclavia aut mammaria; & 3. ab intercostalibus ac lumbaribus. a)

Venæ, a cava, azygos & subclavia.

{ Nervi, 1. duo magni diaphragmatici, utrinque a vertebralibus colli oriundi: qui toti fere in illud inferuntur b); 2. ramuli a pari intercostali & vago.

{ Lymphatica, venam iugularem adeunt. c)

Membrana cingitur, superne a pleura; inferne a peritonæo.

substantia: musculosa, cuius pars superior ampla, & elliptica, a costis spuriiis, musculis abdominis transversis, & cartilagine xiphoide carnea oritur; tendineque suo centrum diaphragmatis nervosum, fere triangulare, conficit: inferior vero, duplici surgit principio utrinque ex lumborum vertebrae, & fere in centrum superioris inferitur. d)

usus 1. pro respiratione: nam in inspiratione movetur deorsum; in expiratione vero sursum in cavum thoracis. 2. pro motu contentorum abdominis, ventriculi, intestinorum, hepatis, lienis, chyli, bilis &c. promovendo. 3. pro iuvanda expulsionem fæcum, urinæ, fœtus in partu, secundinarum &c. 4. transmittit, præter dicta, nervos intercostales.

H 4

258. PVL-

2) Ruysch. Epist. IX. pag. 13. b) sinister tamen longior est dextro, Winslow H. A. R. An. 1715. p. 313. c) Nuck. Adenogr. p. 142. d) elegantes diaphragmatis figuræ vid. in Couvperi nova Myotomia Tab. 34. 35.

258. **PVLMO**, est viscus maximum thoracis; in quo notanda
Situs: in utroque thoracis latere, cor quasi in medio continens.

Connexio: 1. cum sterno & vertebris ope mediastini. 2. cum corde, ope vasorum pulmonalium. 3. cum aspera arteria.

Color: in infantibus grate rubens, in adultis & senibus lividus, aut ex albo & nigro variegatus.

Figura: si inflatur, ungulis quodammodo bubulis similis: superius convexa, inferius concava.

Divisio: in duos lobos magnos, (*Celso* fibras) dextrum & sinistrum: quorum sinister, qui minor, in duos; dexter vero, qui maior, in tres minores, & hi deinde in innumeros minimos dividuntur.

Membrana, qua cingitur, cum pleura continua est.

Substantia, *spongiosa* *Celso*, sive *vesiculosa* *Malpighio*, ex meris *vesiculis* minimis, quasi carneis, & vasis variis composita; quæ sunt

Bronchia: ex annulis principio imperfectis, in progressu vero frustis vario modo commissis, cartilagineis & membranis contractilibus composita: quæ, a trachea orta, primo in ramos, dein in ramulos innumeros divisa, *desinunt in minimas illas vesiculas*, (*interstitia* relinquentes inter se communicantia) præcipuam pulmonum substantiam conficientes, quæ ramulis racemorum instar adhærere videntur.

Arteria & vena pulmonalis: fere ut bronchia divisæ, ea ubique, vario tamen in variis situ, comitantur, & tandem extremis suis ramusculis, circa vesiculas, *rete vasculosum Malpighii* efficiunt, serviuntque non nutritioni pulmonum, sed circulo sanguinis per pulmones. (41*)

Arteria bronchialis, *Ruysschii* vulgo dicta, nutritioni pulmonis dicata, ex aorta, aut intercostalibus, modo simplex, duplex, imo triplex oritur, & bronchiis ubique arcte cohæret. a)

Vena bronchialis, ex intercostalibus vel azygos. (42*)

Nervi, a plexu thoracis paris vagi & intercostalis.

Vasa lymphatica, ad ductum thoracicum abeuntia.

Usus, 1. *Respiratio*: qua sanguinis attenuatio in reti vasculoso perficitur. 2. *voci* & *loquelæ* inservit. 3. *odoratui*. 4. *sanguinis emunctorium* est. &c.

59. ASPERA ARTERIA, *Trachea*, five *Fistula spiralis*, est canalis cartilagineus a faucibus ad pulmones extensus: cuius *Situs*, in media & anteriore colli parte.

Connexio: cum faucibus, pulmonibus & œsophago.

Divisio, in Laryngem & Asperam arteriam, stricte dictam.

LARYNX est pars eius suprema, crassior five caput: in quo *Apertura* ad pulmonem, *Glottis* dicta, figuræ fere ellipticæ, quæ cartilaginibus ac musculis a) ampliatur & angustatur, pro vocis in loquela & cantu mirabili variatione. b)

Structura, potissimum ex cartilaginibus quinque:

1. *Thyroide*, five *scutiformi*, quasi quadrangula, in anteriori parte sita, quæ *pomum Adami* vulgo dictum, sua prominentia efficit, & reliquarum maxima est.
2. *Ericoide*, five *annulari*, ceterarum fere basi, infimam partem occupante: cui inferius aspera arteria adhæret.
3. 4. *Arytænoidibus* duabus c): gutturnium quasi efficientibus, figuræ singularis: quæ parti posteriori & superiori cricoidis peculiaribus utrinque articulis iunguntur, ut glottis aptius constringi & dilatari queat. d)
5. *Epiglottide*: figura sæpius folii hederæ, superiori & anteriori thyroidis parti, super quam mox post radicem linguæ erecta eminet, iuncta: cui etiam ligamento suo medio; duobus vero lateralibus, ossis hyoidis cornubus; & duobus posterioribus, arytænoideis cartilaginibus nectitur: quæ in deglutitione, fere ut pons mobilis, glottidem tegit, ne quid in eam incidat.

Membrana, laryngem investiens, valde sensilis, plurimisque osculis pertusa, liquidum lubricans plorantibus.

Glandulæ arytænoideæ, & *epiglottidis* per utramque huius faciem extensæ, liquidum mucosum secernentes pro tota aspera arteria lubricanda.

Ventriculi five *sinus laryngis*, sunt cavæ, modo maiores, modo minores, intus super glottidem extensæ, voci infervientes. e)

H 5

Aspera

a) de his v. Myol. (§. 324) b) v. *Dodart*. in H. A. R. An. 1700. c) *Santorin*. quamlibet ex duplici constare vult, & VII. numerat. p. 97. d) quatuor has priores cartilagines sæpe ex parte in ossa mutari, monuimus (§. 107.) e) de tota aspera arteria vid. *Morgagn*. Adv. I. Tab. I. II. & V. p. 59. & sq.

Aspera arteria, sive *Trachea*, stricte sic dicta, est canalis ille cartilagineus reliquus, quodammodo conicus, a larynge ad bronchia extensus: cuius

Principium, rotundum, digitum facile admittit.

Finis, paullo angustior, sub sterno thoracem subit, ibique, antequam pulmones ingreditur, principio in duos ramos, dextrum & sinistrum, qui *bronchia* dicuntur, dividitur, quæ utrinque per pulmones subtilissimis ramis distribuuntur, donec in vesiculas desinant.

Substantia: ex annulis cartilagineis xvi ad xx, & tunicis.

Annuli, imperfecti sunt: nam a parte posteriori tota trachea, ut & principium bronchiorum, membranacei existunt: partim, ne deglutitioni obsint; partim, ut pro vocis variatione & excrementorum expulsionem, hi canales constringi & dilatari queant.

Tunicæ quatuor sunt: earumque exterior *membranacea* est; altera, *glandulosa* a); tertia, *musculosa*, qua fibris transversis extrema cuiusque annuli inter se coniunguntur & contrahuntur b); quarta, sive interna, *tendinea* ac robusta, longitudinalibus fibris tracheam & bronchia breviora reddere potest, atque in ea plurima oscula glandularum tunicæ secundæ apparent. c)

Vasa: *arteriæ*, a carotidibus externis; *venæ*, a iugularibus.

Nervi: a recurrentibus & plexu cervicali.

Usus: 1. communes cum pulmone. 2. specialis in deglutitione.

Glandule etiam notabiles extus adhuc asperæ arteriæ accumbunt, quæ ei humectandæ inservire videntur: ut

1. *Thyroidea*: quæ insignis est, ut plur. instar lunæ cornutæ, medio suo superioribus tracheæ annulis, cornubus vero sursum erectis, utrinque laryngi & œsophago adhærentibus. De qua vid. plura in Adenolog. N. 383. & sq.

2. *Bronchiales*: quæ sunt glandulæ nigræ inferiori tracheæ parti, bronchiorum divisionibus & œsophago nexæ, maiores & minores: usus dubii. vid. plura ibid. N. 388.

260. In

a) vid. Morgagn. Adv. I. Tab. II. fig. 1. 00. b) ibid. P. c) ibid. Tab. I.

260. In CORDIS examine considerabimus primo PERICARDIVM, quod est faccus membranaceus, in parte media & infima thoracis, inter duos pulmonis lobos situs, cor laxè includens. Huius

Figura: conoides, cordi analoga, fere triangularis.

Magnitudo, talis, ut cor commode continere queat.

Connexio: cum mediastino, diaphragmate & vasis cordis magnis five communibus: a quibus hoc, simul cum corde, ob rationes N. 261. dicendas, sustentatur. In bestiis vero plerisque cum diaphragmate non cohæret.

Substantia: ex membrana duplici, quarum

{ exterior, communis cum mediastino & pleura.

{ interior, propria, lubrica est, cum tunicis maiorum vasorum continua, in qua quandoque innumera

Foraminula, five pori, adverso sole sæpe apparent.

Vasa: arteriosa & venosa, a mediastinis & diaphragmaticis.

Nervi, quoque a diaphragmaticis.

Lymphatica, ad ductum thoracicum abeunt.

Ufus: 1. sustentare cor, quasi pendulum, maxime quando dorso incumbimus; 2. defendere cor, ne aër frigidior, pulmones ingrediens, illud forte offendat; 3. ne pus, aqua, sanguis, in thorace hærens, cor lædere possit; 4. liquorem pericardii, pro expeditiori cordis motu, continere.

Liquor pericardii: est liquidum loturæ carnis simile, quod in pericardio, parva plerumque copia, reperitur, videturque pro cordis humectatione, motusque facilitate (qui liberrimus & continuus hic requiritur,) inservire: quod, ne deficiat, in facculo hoc colligitur. Multi eum ex glandulis deducunt, quas vel in pericardio, vel in corde ipso existere volunt: quia vero hæ demonstrari non possunt, illum potius, in systole cordis & auricularum, ex his exprimi suspicor: nixus observatione Bartholini, de vulnere pericardii, a), & experimento Thebesii b); eumque potius a poris pericardii rursus absorberi, quam excerni, existimo: male vero a quibusdam negatur, c)

Concretio pericardii cum corde in hæticis aliquoties a me observata est. Illud vero defecisse notarunt varii. d)

271. COR

a) Anat. Reform. cap. de pericardio. b) Dissert. de Circ. Sangu. in corde. c) conf. exper. Littrii Hist. Ac. Reg. A. 1711. p. 37. d) ibid. A. 1712. p. 47. Gouey Chirurgie p. 339. Columbus de Re anatomica,

261. COR, est pars musculosa, robustissima, pericardio inclusa, in medio fere thoracis inter pulmones pendula, circulationis sanguinis & vitæ organum primarium. In hoc notanda

Figura, quodammodo conica : cuius pars amplior, *basis*; tenuior, *apex* dicitur : *inferior*, plana; *superior*, convexa est.

Situs, fere transversus five *horizontalis*; ita, ut *basis* in dextro, *apex* cum maxima cordis parte in sinistro latere, ubi pulsare percipitur, hæreat. a) Plana superficies diaphragmati incumbit, convexa sursum spectat.

Connexio : 1. interventu pericardii cum mediastino, sterno, vertebis, & diaphragmatis quasi media parte; ne in motibus corporis variis, e sede sua disturbari, inverti aut distorqueri possit : id quod sine præsentaneo vitæ periculo contingere non posset. 2. *basis*, vasis communibus cohæret; *apex* vero liber est, & cavitate quadam, lobi sinistri pulmonis, iuxta sextam costam veram fovetur.

Longitudo, v i circiter transversorum digitorum; *latitudo* *basis*, v; *circumferentia* eiusdem circiter x i i i digitorum.

Substantia : carnea five musculosa, Hippocrati & Celso iam nota : b) duabus magnis cavitatibus, quæ *ventriculi* dicuntur, instructa, extus & intus *membrana* cincta.

Pinguedo, vasa cordis, basin & apicem obducit, pro eo lubrificando, eiusque motu perpetuo facilitando.

Vasa sanguifera; quæ sunt vel

{ *Propria* : ut *arteriæ* & *venæ*, *coronariæ* dictæ, innumeris ramis per ipsum cor distributæ, pulchre a Ruyschio delineatæ. c)

{ *Communia* eaque maxima : *venæ* duæ, *cava* & *pulmonalis*; atque *arteriæ* duæ, *pulmonalis* & *aorta*.

Nervi : a pari vago & intercostali, non adeo insignes.

Sacci s. sinus, duo; alter ad auriculam dextram, alter ad sinistram

Auriculæ

a) optime delineatus ab Vesalio Lib. III, fig. ult. et. Lib. VI. fig. variis, atque Eustachio Tab. IX. b) Cels. lib. IV. cap. I. c) Epist. problem. III. & Thes. anat. IV. Tab. III.

Auriculæ duæ, (cordis in basi quasi appendices) dextra & sinistra vulgo dicta. Dextra, longe maior sinistra: hæc, in posteriori; illa, in anteriori parte sita est. Sunt diverticula sanguinis, dum cor est in *systole*: & substantiam habent muscularem, ex columnis quasi lacertosis, cum interiectis sulcis, pro constrictione & expulsionem sanguinis in cor, quando hoc est in *diastole*: hinc horum motus, cum cordis motu, *achronos* est.

Cavitates duæ, *Ventriculi* dictæ, perquam insignes, quorum
 { *dexter*, tenuior & debilior, sed ut plurimum capacior sinistro, sanguinem ex vena cava & auricula dextra recipit, atque in arteriam pulmonalem ac pulmones expellit.
 { *sinister*, longe robustior & crassior, at angustior, (43*) dextro, sanguinem ex vena pulmonali & auricula sinistra accipit, atque in aortam magna vi extrudit. Ille in anteriori thoracis parte, hic in posteriori situs est; quare ille *anterior*, hic *posterior* rectius dici posset. a)

Septum, inter duos ventriculos, robustum, non perforatum.

Tuberculum magnum in auricula dextra, inter venæ cavæ superioris & inferioris concursus multum cum *Lowero* statunt, eique magnos usus adscribunt. Verum hoc quidem in bestiis, sed non in homine inveni. (44*)

Lacertuli sive *columnæ carneæ*, cum sulcis interiectis, in utriusque ventriculi & auriculæ parietibus quam plurimi, *totidem quasi parvuli muscoli*, ex quorum tendinearum fibrarum concursu in corde fiunt peculiares membranæ, *valvulæ* dictæ, ad orificia auricularum cordis positæ. Eiusmodi etiam columnæ ex uno ventriculorum latere in oppositum transverse feruntur: partim ut in *systole* contractionem cordis iuvent, partim ut in *diastole* nimiam eorum dilatationem impedian. b)

Valvulæ cordis sunt triplices: 1. *tricuspidales* dictæ, tres, ad ingressum venæ cavæ, in dextro ventriculo; 2. *mitrale*, duæ, prioribus similes, ad ingressum venæ pulmonalis, in sinistro ventriculo: sanguinis ex corde refluxum, dum constringitur, in venas impediens; 3. *semilunares*, tres, tam in principio arteriæ magnæ, quam pulmonalis, reditum sanguinis ex arteriis in cor prohibentes: quæ roboris causa *fibris carneis & corpusculis certis sphaeroideis* instructæ sunt. c)

Orificia

Winslow Hist. Ac. Reg. 1715. p. 312. b) vid. de his, ut & de tota reliqua cordis fabrica elegantissimæ *Couperi* novæ figuræ in *Myotom*, in fol. a Tab. 36, ad 40. c) *Morgagn*. *Advers.* l. Tab. IV. fig. 3.

Oscula venarum Thebesii a) & Verheyeni b in caveis cordis, quæ male pro arteriis, fermentum cordis excernentibus, habitata sunt a *Vieussenio c)*: revehunt enim sanguinem ex substantia cordis, tam ex arteriis quam venis, ad cava eius.

Fibra substantiæ muscularis mirabilem obtinent fabricam, egregie primum a *Louvero d)* extricata. 1 enim occurrunt *rectæ* in ventriculo sinistro. (45*) 2 aliquo modo *spirales*, utrique ventriculo communes, & quidem duplicis ordinis: exteriores, *a basi & tendine cordis* sinistrorsum; interiores, dextrorsum excurrunt, & priores intersecant 3. aliæ *arcuatae, obliquæ, transversæ*, vix satis extricandæ *e)* agendoque cava cordis exacte constringunt, atque sanguinem expellunt. Hanc vero fabricam in duos distinctos musculos, quorum quilibet unum ventriculum efficit, resolvi docuit *Winslous. f)*

Ufus: circulatio sanguinis. Sanguinem enim per venas ex omnibus partibus recipit, & per arterias ad omnes rursus partes suo motu propellit: unde vitæ corporisque conservatio, & omnium reliquarum partium functiones dependent.

Motus hic cordis mirabilis est, dies noctesque, sine intermissione, & sine delassatione, centum quandoque annos perdurans. unicoque die centies millies fere pulsans: quo ipso autem verum a Mechanicis adeo desideratum *perpetuum mobile* constituit, DE Ique stupendam sapientiam manifestat. *g)*

Circulatio sanguinis in fœtu, utero contento, ob respirationis defectum & pulmonum quietem, alia ratione contingit, quam in natis: sanguis enim in illo non (excepta pauca quantitate) per pulmones transagitur; verum partim per *foramen ovale*, inter dextram & sinistram auriculam, partim per *canalem arteriosum*, inter arteriam pulmonalem sinistram & aortam, ad sinistrum cordis ventriculum & aortam transit.

262. OE-

a) differt. de Circ. Sang. in corde. b) Anat. cap. de Corde. c) Nouvelles Découvertes sur le coeur. d) Tract. de Corde. e) *Lancis*. de corde Tab. IV. f) Hist. Ac. Reg. A. 1711. ubi & valvularum cordis nov. præparatio. g) vid *Hamberger*. diss. de DEO ex demonstratione cordis.

262. OESOPHAGVS sive GVLA, Ciceroni, *stomachus*, est canalis membranaceus, a faucibus ad ventriculum extensus, cibum & potum ab ore ad ventriculum transmittens. Huius *Figura*, infundibuliformis: & pars suprema, PHARYNX audit. *Situs*: in collo, fere post tracheam, iuxta longitudinem vertebrarum colli, in thorace tamen parum ob aortam ad dextram, sed mox rursus in sinistram inflectitur. Conf. Not. (46*)

Substantia, membranacea, ex quinque tunicis constans: quarum

1. *exterior membranacea*, in thorace cum pleura continua.
2. *musculosa*, robusta; in homine ex duplici strato, fibris scilicet longitudinalibus & annularibus sive circularibus a); in bobus vero, ex duabus lamellis spiralibus, se decussantibus, constans, constrictioni & propellendis cibis inserviens.
3. *cellulosa*, fere ut in intestinis.
4. *nervea*, quoque satis crassa, in varias adhuc lamellas dividua, multis vasculis & glandulis instructa, (quæ propterea a Verheyeno b) in *vasculosam* & *glandulosam* subdividitur) cum membrana oris & ventriculi interiori continua.
5. *villosa*, vulgo *crusta villosa*, humore lubrico obducta.

Musculi pharyngis oesophagi partem superiorem vel aperiunt vel constringunt: de quibus vero in Myologia.

Glandulae minores in suprema praesertim pharyngis parte copiosae, quæ cum osculo excretorio haud raro apparent.

Arteriae, a carotidibus, aorta, intercostalibus & coeliaca.

Venae, a iugularibus, azygos, & coronaria ventriculi.

Nervi, a pari vago. Forte & *vasa lymphatica*.

Ductus excretorii novi Verceλλονi c) liquidum subsalsum in oesophagum & ventriculum ducentes, orti ex glandulis

gastricis, conglomeratis, sinistro ventriculi orificio vicinis; dorsalibus, circa quintam thoracis vertebram sitis;

bronchialibus, trachealibus & thyroidea. Vid. Notæ sub N. (47*)

Usus: deglutitio & commixtio liquidi, digestionis inservientis.

DE

a) vid. Cowper. Myotom. in fol. Tab. XXIX. fig. 3. Schelhammer. in Anale& anat. diff. VIII. N. 54. & Santorin. p. 138. eas spirales esse contendunt.
b) Anatom. cap. de oesophago. c) dissert. Anat. de Gland. conglomeratis oesophagi.

DE COLLO, TERTIA TRVNCI PARTE.

263. COLLVM, est tertia pars trunci, tenuior scilicet illa, inter thoracem & caput sita: a sterno & claviculis ad caput se extendens. Constat ex

Tegumentis communibus.

Vertebris, ut plurimum septem.

Musculis, multis, caput, collum, laryngem, pharyngem, os hyoides, &c. moventibus.

Arteriis, carotidibus, internis & externis, atque vertebralibus, valde insignibus.

Venis, iugularibus, internis & externis, venisque vertebralibus, admodum magnis.

Nervis, magnis, paris vagi, intercostalis, recurrentibus, diaphragmaticis & brachialibus.

Medulla spinalis parte.

Aspera arteria, sive Trachea, præcipue Larynge, in quo *pomum* Adami hic eminet.

Pharynge & Oesophagi parte.

Glandula thyroidea aliisque minoribus glandulis.

264. Actum vero iam est de *Vertebris* eius N. 116. ad 120; de *Aspera arteria* N. 259, & de *Oesophago* N. 262. Sed de medulla in spina, *musculis*, *arteriis*, *venis* & *nervis* infra speciatim dicturi sumus: non enim negligenda vel omittenda est colli consideratio, ut multi anatomici consueverunt: quia partes continet haud minoris ad vitam momenti, scituque haud minus necessarias, quam abdomen; quæ propterea indicandæ a docentibus, & probe noscendæ a discentibus. Hinc etiam ab *Aristotele*, *Ruffo*, *Oribasio*, *Coitero*, *Riolano*, *Ruy-schio*, *Morgagnio*, aliisque, in suis corporis divisionibus non omittitur, & a reliquis partibus distinguitur; quia neque recte, neque commode, aut ad caput, aut ad thoracem referri potest.

DE

DE CAPIT E, TRVNCI QVARTA PARTE.

6. CAPVT, quarta trunci pars, est omne id, quod supremæ colli vertebræ insistit. In hoc notanda

Figura: rotundo- oblonga, quodammodo ovata, eminens antè & posterius; ad latera vero complanata: sic tamen, ut anterior pars, præsertim circa frontem, minus lata, quam posterior. Figura huic contraria, vel ab hac recedens, deformitatem, atque sæpe iudicii læsionem, & infert & indicat.

Magnitudo: proportionata sit corpori: magna enim vel parva nimis, vitium non solum formæ, sed & iudicii plerumque producit. Præstat tamen caput paullo maius, capite nimis parvo: quippe in quo plerumque etiam parum iudicii.

Situs: in suprema corporis parte, ob utiliorem organorum sensuum, quæ in eo continentur, & animæ quasi satellites sunt, in loco altiori positionem.

Divisio superficiei, in partem

{ *non capillatam*, quæ *facies* dicitur, organa sensuum, ut visus, olfactus, gustus, auditus &c. continens; &

{ *capillatam*: cuius pars anterior, *sinciput*; posterior, *occiput*; suprema, *bregma* & *vertex*; laterales vero partes, *tempora* audiunt.

Partes constituentes: quæ sunt vel *continentes*, vel *contentæ*.

266. CONTINENTES PARTIS CAPILLATAE sunt vel
 { *Communes*, ut in aliis partibus: nimirum
 | { *Cuticula*, sive *epidermis*;
 } { *Cutis*, quæ hic crassissima & durissima;
 | { *Pinguedo*: circa cranium pauca; in genis, copiosa.
 | { *Propria*,

{ *PILI*: de quibus N. 199. actum est.

MUSCULI CRANII, quatuor: valde tenues, duo in fronte, *Frontales*; & duo plerumque in occipite, *Occipitales* dicti: qui suis tendinibus superne cranium, tanquam *galea*, cingunt. vid. Myologia.

PERICRANIVM, est membrana cranium proxime investiens: tenuis quidem, at satis valida.

{ *Cohæret* cum cranio, musculis vicinis & dura matre; præsertim circa futuras.

{ *Dividi* potest in duas lamellas; hinc a quibusdam in *pericranium* & *periostium*, sed præter necessitatem aut utilitatem, distinguitur.

{ *Vasa sanguifera* habet copiosissima, cum reliquo capite communia;

{ *Nervos* vero e vertebrae colli, & pari VII cerebri.

{ *Vsus* eius est, 1. sustentare vasa pro cranii nutritione; 2. pro sensu cranio conciliando: quod, utpote os, sine hac membrana, non sentit.

{ CRANIVM, pro cerebri defensione, mere osseum, ex octo robustis constans ossibus, ope futurarum iunctis: de quibus iam in Osteologia. Hic vero solum notandum, quod, ad interiora lustranda, superior, dimidia circiter pars, ferra transverse sive *horizontaliter* dividenda, & deinde caute auferenda: qua ablata, rubentia puncta, quæ vascula rupta, demonstrant, quomodo subiectæ duræ matri, a qua intus nutritur, per vascula adhæserit.

{ CONTENTAE PARTES, sunt *Cerebrum*, &c. 267. Cir-

67. Circa CEREBRUM, animæ sedem primariam, primum MEMBRANAE, tres notandæ, *meninges* & *matres* dictæ: quarum DURA MATER, mox sub cranio sita, robusta, crassa & dividua membrana, ex fibris tendineis constans a): in qua *Punctula rubra*, s. vascula rupta, avulso cranio secto, apparent.

Figura & magnitudo cum cerebro fere & cranio conveniunt. *Connexio*: iungitur ubique cranio, superius tamen laxius; inferius, arctius: ita & cum subiectis partibus laxè coheret. (butæ. b)

Arteriæ, a carotidibus & vertebralibus, ut ramusculi distri-
Venæ, duplicis generis: quædam ut alibi in corpore, arteriisque sociæ; quædam vero peculiare, triangularis figuræ, robustæ, & SINUS vocantur. In his notanda

Numerus: quidam multos statuunt c); alii tantum quatuor præcipuos numerant: ut primo *Sagittalem* vel *Longitudinalem*, qui a fronte & crista galli ad occiput, per medium cerebri excurrens, desinit in duos *Laterales*, (48*) figuram *circumflexi* Græcorum repræsentantes, utrinque in *venæ iugularis sinum* sive diverticulum se exonerantes: qui cerebro exempto demum videri possunt. Denique *Quartus*, a regione glandulæ pinealis provenit, d) & inseritur fere, ubi illi tres concurrunt: quem locum *Torcular Herophili* appellant. e) *Minores*, infra cerebrum adhuc varii, de quibus infra N. 274.

Venarum cerebri singularis in hos sinus insertio.

Glandulæ conglobatæ *Pacchioni* exiguæ in parte superiori. f)
Chordæ Willisii transversæ in sinibus, nimiam sinuum extensionem impediētes.

Usus: sanguinem peculiari artificio e cerebro revehere.

Nervi, a quinto & septimo pari cerebri, pro sensu,

Vasa lymphatica, nondum certe demonstrata.

Processus: 1. *falciformis*, inter duo cerebri hemisphæria; 2. inter cerebrum & cerebellum; 3. inter cerebelli divisionem, magni usus.

Motus: secundum *Baglivium* & *Pacchionum*, huic membranæ proprius, muscularis; qui vero a pulsu arteriarum eius oriri videtur. g)

Usus duræ matris: 1. loco periostii cranio intus inservire; 2. cerebrum defendere; 3. processibus suis cerebrum & cerebellum firmare compressionemque præcavere; 4. ope sinuum calorem cerebro conciliare.

I 2

DE-

Pacchion. de dura matre. b) *Ruyseb.* Thes. V. Tab. II. f. 4. c) *Ortlob.* in *Oecon. animal.* fig. 1. & *Vieussen.* in *Neurogr.* d) *Kidley Anat. cerebr.* fig. IV. C. e) *ibid.* lit. g. & f. 4. lit. P. & *Vieuss.* l. c. Tab. I. E. f) *tr. de gland. dur. matr.* & *Ruyseb.* Thes. anat. VII. Tab. I. f. 3. g) *Kidley Trans. Angl.* 1703.

DE ARACHNOIDEA

268. II. ARACHNOIDES, altera cerebri tunica, a *Varolio* primum descripta, *a*) valde tenuis, ob similitudinem telæ aranearum ita dicitur : in qua notanda :

Situs : sub dura matre, intra hanc & piam matrem.

Connexio : in superiori cerebri parte, cum pia matre adeo arcta, ut sine laceratione inde separari nequeat ; in inferiori vero parte, præsertim circa cerebellum, medullam oblongatam & totam spinalem, tam laxa, ut ibidem sine sectione facile & abunde conspici queat ; licet nonnulli adhuc hodie eam in dubium vocent, aut prorsus negent, aut solum, ut *Ridleyus* *b*) alique, pro exteriori piæ matris lamella habeant.

Extensio : eadem ac duræ matris, nimirum per totum cerebrum & spinalem medullam ; hanc vero tantum laxissime ambit : ut optime videri potest, si in aqua vel spiritu vini suspenditur.

Vasa sanguifera : nulla in ea, sicut in epidermide, certe observata sunt : quamvis a nonnullis delineentur. *c*)

Glandula inter hanc & duram matrem circa truncos vasorum a *Santorino* hic describuntur *d*), quæ liquidum, quod inter has membranas, secernere videntur.

Vsus : cerebri involucrum constituere. Quid vero tam tenuis membrana, in qua nulla vasa conspiciuntur, cerebro & medullæ spinali prodesse possit, haud adeo patet. Attamen, monente *Santorino* *e*), cum pia mater inter cerebri anfractus alte se demittat, hæc super eam sic protenditur, ut & subeuntia vasa firmet, & frequentissimos eorum flexuum sulcos colligat, & ne quid illuc intro forte descendat, quod cerebrum lædere possit, omnino prohibet.

269. III

a) Morgagn. Epist. anat. 1. n. 91. *b*) Anatom. cerebri. *c*) ut Bidloo Anat. corp. hum. Tab. 8. fig. 5. *d*) Observat. Anatom. pag. 52, *e*) ibidem pag. 53.

269. III. PIA MATER, (quæ vulgo una cum arachnoidea pro secunda habetur) secundum recentiores est tertia cerebri membrana, sub arachnoidea cerebrum proxime & firmiter ambiens. In hac notanda

Extensio: non solum per superficiem cerebri, sed etiam per omnes eius sulcos, anfractus & plicas, se insinuat. Medullam in spina & nervos quoque investit: hinc superficies eius longe maior, quam reliquarum cerebri membranarum.

Cohæsio: cum

{ *Cerebro* sano, arcta & firma; in hydropicis, laxa.

{ *Arachnoidea*, superius arcta, inferius laxa.

{ *Dura matre*, non nisi per venas, ad sinus abeuntes.

Vasa sanguifera, communia cum reliquo cerebro, copiosissima, sic, ut ex talibus fere tota conflata videatur: prout iniectiones mirabiles *Ruysschii a)* docuerunt.

{ *Arteriae*, a carotidibus internis & vertebralibus;

{ *Venæ*, singulari, obliqua ratione varios in sinus duræ matris; hi in *saccos* sive *diverticula*; hæc in venas iugulares & vertebrales se exonerant. *b)*

Nervi, huius substantiam intrantes, nulli observati sunt.

Vasa quoque *lymphatica*, nulla mihi in cerebro visa.

Glandulae, a *Willisio* aliisque in ea statuuntur, secretioni liquidi, meninges humectantis, destinatae; quæ vero ut plurimum tantum circa sinum longitudinalem observantur, vel eadem esse videntur, quæ N. 268. *Santorinus* tunicæ arachnoideæ adscripsit.

Vsus: involvere cerebrum, & sustentare eius vasa sanguifera, ut hæc eo melius per omnes sulcos, plicas & anfractus illius distribui queant, pro liquidi in cerebro secernendi, sive spirituum, sufficienti copia suppeditanda.

a) Epistol. problem. VII. IX- XII. ut & Thes. anat. variis in locis. b) *Vieussénii* Neurograph. Tab. I. & *Lower.* de Corde Tab. 6. f. I. *Ridley* Anat. cerebri fig. IV. **.

270. CEREBRUM stricte dictum : in quo notanda

[*Figura* superius globosa, sed paulo inæqualis, *anfractibus*,
sulcis seu *gyris* suis intestinula quasi repræsentans.

Divisio : in duo quasi *hemisphæria*, interventu processus fal-
ciformis; & hæc in *lobos*, anteriores, medios & poste-
riores.

Magnitudo, seu moles integri cerebri, ad libras quatuor ac-
cedit; & sic fere triplo maius cerebro bubulo.

Substantia : si pars quædam refecatur, duplex apparet :

[exterior, *cineritia* sive *corticalis* dicta : cuius

[*crassities* duarum quasi linearum, & reptatus ser-
{ pentinus, profunde sæpius cerebrum penetrans.

[*structura* : secundum

{ *Malpighium*, *Bidloum*, & plerosque hos se-
{ quentes recentiores, *glandulosa*;

[*Ruyschium* vero, *Bergerum*, *Vieussenium*,
& alios tota *vasculosa* a) : certe enim, si
ubique in aliis visceribus, hic tamen glan-
dulas non demonstratas esse puto.

[interior, alba, *medullaris* appellata, cuius

[*structura* : videtur fibrosa, tubulosa, totum reli-
quum cerebri constituens.

{ *origo* : ex arteriolis minimis substantiæ corticalis.

[*finis* : principium nervorum, qui inde omnes ori-
untur.

[*durities* : paulo maior corticali.

Corpus callosum : in conspectum prodiens hemisphæriis di-
ductis : quod album est, duriusculum & hemisphæria
cerebri fibris transversis coniungit : in quo *Lancisius*
aliique sedem animæ cogitantis constituunt. b)

Ventriculi

a) *Ruysch*. Epist. XII. & *Thesaur. anat.* variis in locis. *Bergerus* in *Physio-*
logia. *Vieussenius* in novo systemate vasorum. b) *Dissert. de Sede ani-*
mæ cogitantis. *Camerar.* in *Elect. Medicin.* p. 18.

Ventriculi : sunt notabiles sive insignes cavitates in cerebro, figuræ irregularis & quatuor vulgo numerantur :

Anteriores duo : primus scil. & secundus, qui maximi ; apparent demum, quando cerebrum, horizontali sectione, ad corpus usque callosum, aufertur. a) In his notanda

Septum lucidum, seu potius *pellucidum*, elevato corpore calloso, inter duos hosce ventriculos conspicuum : ex substantia quidem tenui medullari, duplici tamen pariete, caveam oblongam comprehendente, pia matre obducta, constans, dictos ventriculos, fere ut mediastinum pectus, distinguit. A *Galeno* appellatum est *diaphragma cerebri*.

Fornix : sub septo lucido occurrit, ex medullari substantia compositus ; cuius pars anterior duplici surgit radice, quæ mox coeunt ; posterior rursus bifida, *Crura fornicis*, item *Pedes hippocampi*, dicta.

Plexus choroideus, est membrana vasculis repletissima ; at glandulis destituta : pulchre delineatus a *Ruy-schio*. b)

Corpora striata : extus cineracea, intus pulchre striata, principia medullæ oblongatæ constituunt.

Thalami nervorum optitorum : extus albi, intus cineracei ; inter quos & cerebellum

Ventriculus tertius : c) in quo, præter plexus choroidei partem, notanda *Glandula pinealis*, substantiæ cineritiæ, cum processibus & basi sæpe medullaribus ; *Nates*, *Testes*, atque sub his *Valvula magna cerebri*, & *Aqueductus Sylvii* : d) cuius orificium posterius *Anus*, antè *Rima ad infundibulum*, ac *Vulva* multis vocatur, communicationem præbens duobus anterioribus ventriculis & tertio cum quarto. Quæ vero pleraque exemto cerebro melius videri possunt.

Ventriculus quartus : est cavitas inter cerebellum & subiectam medullam oblongatam, exemto, & dissecto per medium cerebello, demum rite conspicuus : de quo plura N. 272.

l 4

271. CE-

a) hos glacie totos repletos reperi in cadavere senis A. 1726. b) in Epistolis Tab. 15. c) multi de hoc ventriculo aliter sentiunt. d) a *Vesalio* & *Arantio* iam descriptus ; *Morgagn. Epist. anat. l. n. 91.*

271. CEREBELLVM, quasi parvum cerebrum: quia hoc sexies fere minus est. In quo notanda

Situs: sub posterioribus lobis cerebri, & posterioribus duræ matris processibus, in inferiori cranii parte: quibus, ne a cerebro comprimatur, impeditur.

Figura: ad globosam, aliquo modo compressam, accedit.

Superficies: minus gyrata, quam cerebri, sed quasi *sulcata*, & in lamellas fere parallelas divisa: quæ lamellæ in medio maximæ, at per gradus utrinque, tanquam diversa circuli segmenta, sensim minores, desinunt utrinque in *Processum*, *vermiformem* dictum, anteriorem & posteriorem.

Substantia: si in partem dextram & sinistram cultro dividitur, corticalis quoque est & medullaris, sed corticalis longe hic copiosior medullari, atque arbusculas pulchre repræsentat, quarum trunci ita dictos *Pedunculos cerebelli*, constituunt.

Cavitates: nullæ adsunt in cerebello, secus ac in cerebro.

Lobuli cerebelli, racematim quasi arbusculis medullaribus, foliorum instar, diviso cerebello, adhærentes, apparent, a) qui vero lobuli sive foliola, cerebro integro lamellæ illæ sunt cerebelli, pia matre cinctæ & totum cerebellum constituentes.

Pedunculi cerebelli, ex tribus processibus medullaribus constant, quorum *primus*, a cerebello versus testes ascendit, & *Valvulam magnam cerebri* format; *alter*, *Prominentiam annularem Willisii*, sive *Pontem Varolii*; *tertius* vero ad spinalem medullam descendit.

272. MEDVLLA OBLONGATA: est substantia inferior, cerebri & cerebelli, medullaris, in cuadam quasi coalita, ad foramen magnum ossis occipitis extensa, spinali medullæ & nervis cerebri originem præbens. a) In huius parte inferiori, Dum cerebrum e cranio decenter eximitur, spectanda

Nervorum cerebri, vulgo x; rectius ix tantum paria, commode sub his versiculis comprehensa:

Olfaciens, Cernens, Oculosque movens, Patiensque,

Gustans, Abducens, Audiensque, Vagansque, Loquensque.

Arteriarum carotidum internarum in cranium ingressus.

Infundibulum, eiusque in glandulam pituitariam insertio.

Nervus spinalis accessorius, Willisii. b)

Postquam cerebrum e cranio exemptum est, considerata

In parte inferiori,

Arteriarum carotidum & vertebraliū anastomoses c) ac singularis per cerebrum distributio. d)

*Crura medullæ oblongatæ cerebri, } ex quibus oblongata,
Crura, seu pedunculi cerebelli, } & spinalis medulla.*

Ortus plerorumque nervorum cerebri parium.

Protuberantiæ orbiculares, pone infundibulum, duæ.

Protuberantia annularis Willisii, five Pons Varolii, male a Willisio aliisque, sed recte a Ruyschio delineata. e)

Finis medullæ oblongatæ, atque in hoc Eminentia pyramidales & olivares Vieussenii f) ac Ruyschii. g)

Tunica arachnoides, maxime hic conspicua.

In Parte superiori, postquam cerebrum rursus invertitur,

Ventriculus iv & Calamus scriptorius, cum crenis suis.

Omnia rursus, quæ in Ventriculo tertio descripta sunt.

Substantia medullæ oblongatæ: extus, medullaris est; intus, paucum corticalis, seu cineritiæ substantiæ, continet.

a) hanc sententiam commune esse existimat Schelhamm. Anal. anatom. diff. XIII. N. XXV. b) de Cerebro, Fig. 1. MM. c) Ridley l. c. fig. 1. d) Ruyschius Epistol. problem. Tab. XII. & XV. e) ibidem. f) Tab. 4. R. S. g) Epist. Tab. 14. f. 4. & 5.

VASA harum partium, & simul totius cerebri:

[*Arteria*, a carotidibus & vertebralibus: *carotides* per singulares canales ossis petrosi; *vertebrales* vero, per foramen magnum occipitis, miris flexibus cranium intrant.

[*Vena*, interiorum cerebri substantiam vix penetrant, sed e corticali prodeunt, se in sinus duræ matris (§. 267.) inferunt.

[*Nervi*, & *vasa lymphatica* haud certe perspecta.

VSVS CEREBRI

[*generalis* est, functionibus animæ famulari, 2. *spiritus discernere*, eosque ad nervos, pro sensu & motu, transmittere.

[Cerebrum tamen *spirituum animalium*; cerebellum vero, *vitalium & naturalium* secretioni magis destinatum est.

[*specialis* vero uniuscuiusque partis cerebri (quibusdam forte exceptis) incognitus, vel certe perquam dubius.

273. Restant, cerebro exempto, in cranio adhuc considerata: *Egressus novem illorum* (§. 272) *parium nervorum* cerebri, *Ingressus arteriarum* cerebri & duræ matris.

SINVS DVRAE MATRIS maiores, (§. 267) II, III, & IV; *sinus falcis inferior*; itemque *circularis a)* circa glandulam pituitariam, *Receptacula* veteribus dicta *b)*, atque alii minores varii, imo quamplurimi, in basi cranii *c)*, una cum eorum exitu e cranio vario *d)*, & partim in venas occipitales & vertebrales, maxime vero in venas iugulares ingressu: quos omnes prolixè describere, vix operæ pretium est.

RETE MIRABILE: quod est plexus vasorum & fibrarum membranacearum retiformis, utrinque iuxta glandulam pituitariam, sub dura matre, ubi sinus circularis est, situs: maior in vitulis, quam homine; sed usus incogniti.

GLAN-

a) Ridley Fig. II. 2, 2. b) Morgagn. Adv. VI. p. 7. c) conf. Vieussens Neurograph. Tab. XVII. Ortlob. Hist. Part. p. 155. Morgagn. Adv. VI. p. 3, 7, 24, 25. Santorin. p. 74, 75. in quibus vero naturam varie ludere observavi cum Schelhamm. Analect. anat. Diff. XIII. N. 9. cum quo ut & cum Morgagn. Adv. VI. p. I. annotavi, inferiorem sinum non semper adesse. d) varios exitus emissariorum nomine describit Santorin, loc cit.

GLANDULA PITUITARIA : est parva glandula, in fella equina, intra duplicaturam duræ matris sita, in qua aliqua cavitas *a)*: cuius

Denominatio : ab attributo usu absorbendi pituitam cerebri.

Membrana, duæ 1. dura matre cingitur & suspensa tenetur. *b)* 2. tenui, piæ matri simili; quæ pro infundibulo perviæ.

Magnitudo, & *figura*, cum phaseolo parvo fere convenit, cum *appendice* in parte posteriore: maior tamen comparate in bestiis, quam homine, plerumque observari solet.

Substantia, glandulosa : ex albo rubens, ut plurimum duriuscula & firma; in appendice mollior & cinerea. *c)*

Vasa: *Arteria*, a carotidibus: *venæ*, ad sinus proximos abeunt; *nervi*, a quinto pari; *ductus excretorius*, forte est *infundibulum* (§. 272.): nam nullus alius notus.

Usus: Vulgo statuitur, quod imbibat pituitam ventriculorum cerebri, eamque postea foras mandet *d)*; qui vero usus mihi haud verisimilis est: 1. quia glandularum officium est aliquid secernere; 2. quia ad illud simplex canalis suffecisset; 3. quia eius substantia firma & dura illi usui inepta videtur. *e)*

274. ME-

a) Littre Hist. Acad. Reg. A. 1707. *b)* ibid. *c)* Morgagn. l. c. p. 31. *d)* conf. Brunn. de glandul. pituit. & Littre l. c. *e)* Drakii Anthropol. p. 490.

274. MEDULLA SPINALIS est medullæ oblongatæ continuatio, & quasi cauda cerebri, canali osseo vertebrarum inclusa, a capite ad finem ossis sacri se extendens. Huius *Longitudo*: convenit cum longitudine spinæ dorsæ.

Crassities: digitum circiter æquat, non tamen ubique æqualis.

Tegumenta sive involucria eius propria sunt sex.

1. *Canalis osseus* 24 vertebrarum & ossis sacri.
2. *Tunica ligamentosa*, robustissima, vertebrae intus colligans.
3. *Tunica cellulosa*, sive *adiposa*, in pinguibus pinguedinem continens, ad emolliendam priorem inserviens.
4. *Dura mater*: in parte superiori, robustior; in inferiori, tenuior; quæ medullam in spina laxè ambit, & antè cum corpore vertebrarum firmiter cohæret.
5. *Arachnoidea*: antè, arcte cum pia matre iuncta, postè vero, libere quasi fluctuat.
6. *Pia mater*: ubique medullam spinalem ac nervos eius ambit, & *divisionem eius longitudinalem* ingreditur.

Divisio, ope fissuræ, in partem dextram & sinistram, quasi in duas columnas, quæ tamen ad medium usque non penetrat.

Vasa sanguifera: *arteria* & *vena*, a vertebralibus colli, intercostalibus & lumbaribus: quæ in latere vertebrarum, ubi nervi exeunt, ingrediuntur, & miras anastomoses conficiunt.

Nervi spinales 31 vel 32. paria; quorum quilibet pluribus fibris ex anteriori & posteriori medullæ parte oritur, quæ deinceps coeunt, membranis colligantur & *nervos* constituunt.

Substantia: partis *superioris*, usque ad ultimas thoracis vertebrae, eadè ac medullæ oblongatæ cerebri, sed paulo tenacior: *extus, medullaris*; ut nervi commode inde egredi queant; *intus, cineracea*, eiusdem usus ac cineracea cerebri. Partis *inferioris* vero substantia, ab ultimis thoracis vertebrae, usque ad finem ossis sacri, *fibrosa*, tenacissima, *cauda equina* dicta.

Ufus: 1. prædictis paribus nervorum originem dare: qui præcipue per artus, partesque externas distribuuntur. 2. spiritus, sive liquidum nerveum, in usum horum nervorum præparare.

275. In FACIE, sive *parte capitis non capitata*, considerandæ partes

[Continentes

[communes : ut 1. *epidermis*, 2. *cutis* : a quorum colore & teneritate magna formositatis pars dependet ; *pinguedo* multa , quam sæpe hic tegit species *panniculi carnosæ* , quoque pro pulchritudine.

[propriæ : ut *musculi* , frontales , nasi , labrorum , maxillæ inferioris , &c. de quibus in myologia : deinde *ossa* , quæ vid. in Osteologia.

[Contentæ : ut organa quinque sensuum :

[Visus,

[Gustus,

[Olfactus,

[Auditus,

[Tactus, qui vero rectius ad totam cutem pertinet.

276. VISVS ORGANA, sunt duo OCULI. In quibus notanda.

Situs : in elatiori faciei parte, ut remotius videre queamus.

Figura : demtis partibus externis, fere *globosa*.

Color : in homine, *niger* , *fuscus* , *griseus* , *glaucus* , *cæruleus*.

PARTES, visui inservientes, oculum vero non constituentes :

[I. SUPERCILIA : quæ sunt duo arcus pilosi, supra orbitas positi ; *ex pilis* , peculiaris magnitudinis & posituræ, tempora respicientis, *cute crassa* , & *pinguedine* subiecta , constructi : quo bene emineant. Pars naso vicina *caput* ; opposita vero, *cauda* dicitur : quæ *inserviunt* ad sudorem , a fronte fluentem, ab oculis arcendum, & ad lucem moderandam.

[2. PALPEBRÆ

2. PALPEBRAE, tegumenta sunt oculorum, in quovis oculo *duæ*, superior & inferior: ad quarum concursum conspiciuntur *anguli* sive *canthi* duo: interior, *maior*; exterior, *minor*. Præterea circa has notanda

Structura: ex epidermide, cute tenera, & cartilagine arciformi, *tarsus* dicta: quæ intus investiuntur membrana valde lubrica, sensili, periosteo & albugineæ oculi continua. a)

Cilia: sunt pili rigidi in oris palpebrarum, singulariter inflexi, ad avertenda extranea & radios fortiores moderandos.

Musculi, pro motu earum; de quibus videatur Myologia.

Glandula sebacea Meibomii, in palpebrarum interiori facie sitæ b), liquidum pingue sive oleosum secernentes, pro attritu palpebrarum impediendo.

Caruncula lacrymalis, rubicunda, in angulo maiori, in qua subinde glandulae & pili conspiciuntur c); itemque

Membrana semilunaris rubicunda, ibidem d) pro lacrymis in puncta lacrymalia dirigendis.

Puncta duo *lacrymalia*, in angulo maiori, ad fines tarsorum, desinentia in ductus, *cornua* dictos, *sacculum lacrymale*, *canalem nasalem*, & *nasum ipsum* f), Galeno iam nota.

Glandula lacrymalis, in orbita, supra angulum minorem sita, cum ductulis suis excretoriis sub palpebra superiori e) emergentibus, facilius in bobus quam homine demonstrandis.

Usus: ad oculum tegendum, defendendum, corneam abstergendam, humorem ex glandulis crebro suo motu proliciendum, & lucem fortiorem moderandam.

3. MUSCULI oculorum, pro motu eorum, sex in homine, quatuor recti: attollens, deprimens, adductor, abductor.

duo obliqui: superior & inferior: de quibus vid. Myologia.

4. *Pinguedo*, inter hos multa, pro usu vario.

PARTES

a) Ruysch. Thes. anat. X. p. 12. b) Epist. de vasis palpebrar. novis.

c) Morgagn. Adv. I. §. 22. d) ibid e) Steno de gland. oculor. f)

Morgagn. ibid. Tab. IV. fig. 1. Verbeyen. Tab. 28. fig. 9. a. Bianchi ductus lacrymal. & diff. nostra de fistula lacrymali.

PARTES PROPRIAE, ipsum oculi *bulbum* constituentes, sunt *tunicae, humores & vasa*.

TUNICAE oculorum sunt variae:

Albuginea, adnata, sive coniunctiva, in anteriore solum parte hæret, oculum orbitæ iungit, & vasis est repletissima.

Cornea, quæ pellucida, convexa & in varias lamellas dividua.

Sclerotica, dura, opaca, a cornea ad nervum opticum extensa: in qua posterius ita dicti *Aquæductus Nuckii* conspiciui: qui vero ipsa vasa sanguifera sunt oculorum. a)

Choroidea, mox sub sclerotica sita, nigra in homine; cuius lamella interior, *Ruyfchiana* vocatur: utraque vasculis distinctis repletissima, b) & visus gratia nigrore imbuta est.

Uvea, quæ pars anterior est choroideæ, perforata, colorata, per corneam conspicienda, convexa; in qua notanda

facies anterior colorata, Iris dicta, tota vasculosa c), varii coloris, unde varii illi oculorum colores in homine.

pupilla, sive foramen in homine rotundum, in medio fere iridis d), quod ob varios usus dilatari & constringi potest.

facies posterior nigra, ubi, absterfo nigrore, videnda

sphincter pupillæ, ex fibris orbicularibus, pro contractione.

processus sive fibræ ciliares, rectæ pro dilatatione pupillæ.

ligamentum ciliare, annulare, pro motu vitrei & crystallini.

circulus arteriosus & venosus sub hoc, ex quibus vascula per uveam, choroideam ligamentum ciliare, humorem vitreum & crystallinum, mirabiliter distribuuntur. e)

ductus nigri, recti, inter processus & ligamentum ciliare.

spatium inter uveam & corneam, *camera oculi anterior* dictum; illud vero inter uveam & crystallinum, *camera posterior*: quod minus est f), aut fere nullum. g)

Glandulae a variis in uvea statuuntur, quæ vero dubiæ.

Retina, tunica tenerrima, albicans, quasi mucosa, nervi optici per oculi fundum expansio, oculi & visus pars primaria, cuius causa omnes reliquæ. (50*)

HVMO.

a) vid Diss. nostra de Tunica choroid. b) ibid. & Ruyfch. Ep. XIII. Tab. XVI. Thes. anat. II. Tab. I. fig. 6. Hovius de circul. humor. in oculo. c) ibid.

d) Winslow. in Hist. Acad. Reg A. 1721. e) Ruyfch & Hovius locis cit.

f) vid. scripta mea de Cataracta & Not. (51*) g) Winslow, loc. cit.

HVMORES in oculo vulgo tres numerantur, qui pellucidi, expansioni tunicarum & refractioni radiorum inservientes.

Aqueus, sive *albugineus*, utramque oculi cameram, (quem locum oculi vacuum dixere veteres a), replens, in quo uvea libere quasi fluctuat & movetur, qui continuo, imo & vulnere amissus sponte reparatur. vid. Nota (§ 1*).

Vitreus, vitro fuso vel gelatinæ pellucidissimæ similis, probabiliter ex *vesiculis* sive *cellulis subtilissimis*, humorem limpidissimum, aqueum continentibus constans b), partem posteriorem oculi replens, tunicæ retinæ parte posteriore ubique contiguus, eamque expandens.

Crystallinus, fere *lentiformis*, reliquis solidior, hinc rectius *corpus* vel *lens crystallina* dictus, foveæ vitrei ope tunicæ tenuissimæ inclusus, a ligamento ciliari, inter aqueum & vitreum humorem, mox post pupillam, libere quasi suspensus, eiusque ope mobilis, ex multis lamellis pellucidis, vasculosis, ad ceparum similitudinem constructus c), sub cuius tamen membrana sæpe aliquid humoris aquei continetur. d)

Tunica subtilissima, *arachnoides* dicta, vasculosa, crystallinum & vitreum corpus cingit e), eiusque auxilio lens crystallina sinui vitrei includitur: qua vero rupta, vel incisa, lens hæc facile excidit. f)

VASA SANGVIFERA, mirabili modo per internas oculi partes distributa g): *Arteriæ* a carotidibus internis & externis, multis in locis oculum adeuntes h), ultimo minutissimæ, lympham tenuissimam vehentes, (§ 2*) quibus tunicæ & humores nutriuntur. *Venæ* vero partim ad sinus duræ matris, partim ad iugulares venas sanguinem revehunt.

Vasa lymphatica in oculo bubulo observavit *Valsalva*.

Nervi, quam plurimi: I. *opticus*, retinam, organum visus primum, conficiens, e latere nasi oculum ingrediens. (§ 3*) Deinde per cerebri III, IV, ramus V & VI. per musculos, membranas, palpebras, glandulam & saccum lacrymalem distribuuntur: de quibus vid. Neurologia (§. 299.)

277. Pri-

a) *Celsus* lib. VII. cap. VII. b) hanc fabricam nos per coniecturam tantum nosse, recte monet *Morgagn*. Adv. VI. p. 106, & *Riolanum* eam primum indicasse: postea vero *Hovius* l. c. pro certa descripsit. c) *Hovius* ibid. d) *Morgagn*, ibid. p. 90. 91. e) *Ruyfch*. Thes. II. Tab. I. fig. 8. f) Nonnulli hanc tunicam negant: sed facile demonstrari potest. g) ostenderunt hæc *Ruyfch*, & *Hovius* l. c. b) vid. Diss. nostra de tunica choroidea.

277. **PRIMARIUM GUSTVS & LOQUELAE ORGANVM** est **LINGVA**: circa quod tamen simul reliquæ oris partes, linguæ functioni famulantes, considerandæ, nimirum *Glandulæ salivales, Os hyoides, Gingivæ, Palatum, Labra, Vvula & Tonsillæ.*

278. **GLANDVLAE, SALIVAM SECERNENTES,** sunt

PAROTIDES, insignes glandulæ, utrinque una, inter aurem & maxillæ inferioris angulum sita, sæpe super magnam masseteris partem se extendens: ex qua notabilis ductus, tres quasi transversos digitos longus, calami straminei crassitie, multis radicibus prodit, qui a *Stenone* An. 1660 inventus, a) *Ductus salivalis Stenonianus*, sive superior, appellatur: transit inde transversim super musculum masseterem, per medium genæ, ibidemque musculum buccinatorem & membranam oris, iuxta secundum vel tertium dentem molarem, perforat, & osculo suo salivam ibidem larga copia (54*) in os deponit.

MAXILLARES, quoque satis notabiles, utrinque una, in interiori latere anguli maxillæ inferioris sita: quarum quælibet singularem ductum, ex variis radicibus coalitum, priori paullo tenuiorem, sed sæpe longiorem, ab inventore, ut putant, *Warthonianum* b) sive *salivalem inferiorem*, dictum, emittit: qui sub lingua, iuxta radicen frenuli, plerumque simplici, nunc etiam duplici, imo quandoque triplici ostio c) in os hiat.

SVBLINGVALES, duæ oblongæ, utrinque una, sub lingua positæ: quas salivam in homine in *Warthonianos* ductus exonerare hucusque vulgo crediderunt. In vitulis peculiarem ductum, ex quavis prodeuntem, primo *Rivinus* d), A. 1679, & deinde etiam *Bartholinus*, in leone, A. 1682, invenit e) qui propterea *Ductus Rivinianus* vel *Bartholinianus* vocatus est. At in homine has glandulas parvis ductulis sive osculis, inter linguæ latera & gingivas utrinque in os hiare, primus me docuit *Morgagnus* f), quos etiam inveni, eosque, sicut a me reperti sunt, delineari curavi Tab. VII. fig. 33. conf. Not. (55*).

K

Foramen

Steno Observ. anat. b) *Adenograph.* cap. XXI. c) *Ruyseb. Thes. anat.* p. 25. d) *Dissert. de Dyspepsia* A. 1679 habita: & *Welsch. Tab. anat.* 30. e) de *Ductu salivali novo.* f) *Advers.* VI. p. 130.

Foramen linguae, cœcum alias appellatum, a *Collino a)*, *Morgagnio b)* & me olim Tab. IV. fig. 20. delineatum, primus pro ductu salivali habuit *Vaterus c)*, multisque experimentis, quod cum glandulosa substantia circa basin linguæ communicet. confirmavit: sed qua ratione hoc fiat, perspicue non demonstravit. *Coschvitzius d)* vero hoc, & quomodo plures ductus per glandulas maxillares & sublinguales excurrant, atque in linguæ superficie loca excretionis varia habeant, ostendere voluit; quos autem, mea forte culpa, aut quia natura sæpe hic ludit, ita reperire non potui. Attamen nuper in cadavere virili, duos egregios ductus aliter se habentes & in foramen illud desinentes, inveni, quos, ut fuerunt, delineari curavi. Conf. Not. (56*) & Tab. VIII. fig. 34. 35.

Glandula dua, utrinque una, in eodem cadavere, in genis, circa dentes molares posteriores maxillæ superioris, aliquot osculis excretoriis, in os hiantibus, a me observatæ sunt, vid. Not. (57*) & Tab. VIII. fig. 36. 37.

Ductus etiam, alias non observatus, in eodem cadavere, sub ossis occipitis apophysi anteriori in suprema faucium parte occurrebat, satis amplus, qui pressus, in fauces liquidum mucosum dabat. vid. Not. (58*) & Tab. VIII. fig. 38.

Glandula præterea, *miliares & lenticulares*, plures deprehenduntur per membranam oris, præcipue per labra, palatum, buccas & linguam dispersæ: quæ pro situs diversitate, *linguales, labiales, buccales, palatina, uvulares &c.* vocari possunt.

Glandula Nuckiana: in canibus utrinque iuxta oculum sitæ, ductus demittunt in os, prope dentem molarem penultimum maxillæ superioris e); quæ vero in homine deficient.

279. Os

a) Anatom. sua Tab. 2. b) Advers. I. Tab. I. c) peculiari dissert. de novo ductu salivali in lingua, bis iam edita. d) dissert. de ductu salivali novo. e) Nuck. Sialograph. p. 15. Tab. III. fig. 1. & 2.

279. Os HYOIDES, *Linguale* sive *Bicorne* dictum, respectu ossium in Osteologia (§. 106.) descriptum, ob nexum cum lingua, & usum, quem hic præstat, uberiores paullo hic requirit considerationem.

Cohæret linguæ basi sive radici, ita, ut inter hanc & laryngem situm sit, & una cum lingua moveatur.

Connectitur ope ligamentorum cum lingua, larynge, & processibus capitis styloideis; interventu vero musculorum, tam cum partibus prædictis, quam cum maxilla, scapulis, claviculis, & sterno.

Musculorum habet quinque paria, quorum ope una cum lingua, cui maxime servit, varie movetur: qui vero videnti in Myologia.

Vsus: 1. linguæ firmam basin præbere, eiusque motui & deglutitioni inservire; 2. variis musculis punctum fixum dare.

80. LABRA, duo sunt, ex musculis potissimum constantia: extus, tegumentis universalibus; intus, membrana oris tecta; sub qua *glandulae miliares & lenticulares*, tam in inferiori *a*), quam in superiori *b*) sitæ sunt. *Prolabia*, epidermide denudata, & aqua aliquamdiu macerata, ostendunt papillas nerveas copiosissimas *c*): hinc adeo sensilia. *Superius labrum*, sub septo nasi *d*); inferius vero ad radices dentium incisorum *e*), quodvis peculiare ligamentum, quod *frenulum* dicitur, habet, atque in loquela, bibendo & manducando magnam nobis operam præstant.

1. GINGIVAE, ex membrana oris communi, & perioestio maxillarum constant, quibus firmissime adhærent. Vasis instructæ sunt copiosissimis: hinc adeo rubent. Interveniunt tegendis maxillis, firmandisque dentibus.

K 2

282. PALA-

a) *Cowper*. Myotom. reform. fig. 4. *b*) vid. Tab. nostr. VIII fig. 36. dd. *c*) *Ruysch*. Thes. anat. III. pag. 26. Tab. IV. fig. 1. lit. B. & Thes. VII. Tab. 2, fig. 5. *d*) *Bidloo* Tab. XII. *e*) *Morgagn.*) Adv. I. Num. 5.

282. PALATVM, fimilem fere habet fabricam : cui vero adhuc copioſæ glandule, Fallopio iam notæ, maxime in parte poſteriori, prope uvulam, ubi veli inſtar pendulum eſt, & velum ſive clauſtrum palati vocatur, accedunt, liquidum mucosum, pro faucibus lubricandis, & deglutitione facilitanda, per oſcula quam plurima a) excernentes.

Ceterum etiam hæc membrana oſſa palati a corruptione defendit, & clauſtro ſuo, ne deglutienda in nares facile irruant, præcavet.

283. VVULA, Celſo uva, aliis columella, eſt pars teres, aut fere conica, inverſa, in parte poſteriori palati, ſupra linguæ radicem, inter duos quaſi arcus palati, & utramque tonsillam, a velo ſive clauſtro palatino pendula. b) In qua notanda

Figura: cum extremo articulo digiti infantis fere conveniens.

Subſtantia: muſculofa; membrana oris glanduloſa cincta.

Muſculi, a quibus varie movetur, vid. in Myologia.

Ligamenta membranacea duo, quibus cum palati oſſibus cohæret.

Uſus: nondum adeo perſpicuus; loquelæ tamen elegantius formandæ inſervire videtur, & ne potus in deglutitione in nares irruat, aliquo modo præcavet. In beſtiis autem deficit. c)

284. TONSILLAE, vulgo Amygdalæ, ſunt duæ notabiles glandulæ, amygdalas sæpe repræſentantes, utrinque ad fauces iuxta uvulam ſitæ, humorem lubricum, pro faucibus lubricandis, ſecernentes, & per varia conſpicua, irregularia foraminula, excernentes. d)

Harum vero omnium partium, tonsillarum, uvulæ, gingivarum, labrorum, palati & glandularum ſalivalium omnium arteriæ, a carotidibus externis; venæ, a iugularibus; nervi, potiſſimum a pari quinto.

285. LIN-

a) vid. Tab. noſtra VIII. fig. 36. bb. b) Ephem. Nat. Cur. cent. III. & IV. obſ. 190. fig. 1. E. & Hiſt. Acad. Reg. A. 1718. p. 390. fig. 1. & 2. c) Ab uvula lue venerea ablata, in aliquibus vocem raucam, in aliis nihil vitii aut impedimenti illatum vidi. d) de Tonsillis legi meretur diſſ. Widdmanni, & Ephem. Nat. Cur. loco antea citato.

286. LINGVA ipsa, nobilissimum illud organum, animæ nostræ optimus interpres, iam examinanda: cuius situs, numerus & magnitudo omnibus nota sunt; sed notanda

[*Figura*: quæ aliquo modo pyramidalis sed plana; eiusque anterior, mobilior & acuta pars *apex*; posterior vero & crassior, *basis* sive *radix* dicitur.

Connexio: cum osse hyoide, maxilla inferiori, processu styloide, pharynge & larynge, aliisque partibus vicinis, per musculos aut membranas.

Ligamenta: 1. *frenulum* habet sub apice, in cuius radice utrinque ductus salivales Warthoniani os ingrediuntur; 2. *membranaceum* ligamentum, quibus maxillæ inferiori, ossi hyoidi & laryngi, speciatim epiglottidi iungitur.

Linea longitudinalis, in medio, *mediana* dicta, linguam æqualiter quasi in duas partes dividens.

Substantia: potissimum ex musculis teneris, nerveisque involucris sive membranis, pinguedine ut & ex glandulis ac vasis notabilibus componitur.

Glandula: præter sublinguales (§. 278.) in superiori & posteriori parte quam plurimæ miliares: quas in nonnullis ad lentis magnitudinem, osculis in medio perforatis, aliquoties vidi. *a)*

Foramem alias *cæcum* dictum in superiori & posteriori parte linguæ, inter has glandulas sæpe conspicuum, usus alias incogniti *b)*; iam vero, si adest, pro *ductu salivali* habetur, (§. 278.)

Arteriae: magnæ & multæ, a carotidibus externis. *c)*

Vena: sunt rami iugularium externarum: quarum eæ, quæ sub apice conspiciuntur, *vena ranina* audiunt, & quandoque, præsertim in faucium malis, incidi solent.

Nervi

K 3

a) vid. etiam Morgagn. Advers. I. Tab. I. *b)* vid. eius delineatio in Collins Anatom. Tab. 2, Morgagn. loc. cit., Fig. nost. Tab. 4. fig. 20. *c)* Ruysch. Thes. anat. I. Tab. 3. fig. 4. pag. 45.

Nervi, valde insignes : duo rami a pari quinto, qui vulgo gustui; duo a pari nono, qui motui inservire creduntur. *Boerhavius* contra, hos gustui, illos motui famulari sentit. a) Forte simul & motui & gustui famulantur. *Lymphatica vasa* & *Coschvitz* b) & *Du Vernoi* c) delineant. *Involucra*, tunicæ five membranæ tres, linguæ substantiam musculosam cingentes :

1. & extima, continua cum membrana oris communi, vaginulas efformat, quasi pyramidales, & globosas, porosas, pro papillis nerveis tertiæ membranæ suscipiendis. d)
2. five media, reticularis *Malpighii* dicitur, ex eleganti rete constans, papillas nerveas per foraminula sua transmittens, & in superiori tantum parte conspicua : vid. fig. nostra 20. difficilius tamen in homine, quam bestiis videnda.

3. papillaris nervosa, in eodem quoque tantum loco, continens papillas nerveas, diversæ figuræ, maxime tamen

{ fungosas, five capitatis, cornubus limacum, vel fungis similes, quæ foraminulis præditæ, emitti & retrahi possunt.

{ pyramidales, maiores & minores, quandoque arcuatas. e)

Vtræque vero hæ papillæ oriuntur ex hac intima tunica & nervis linguæ, transeunt foraminula tunicæ reticularis, & terminantur in exterioris vaginulis, constituuntque primarium organum gustus.

Musculi: quorum, præter eos, quos os hyoides habet, quatuor sunt paria, de quibus in *Myologia*: super quos vero multæ adhuc aliæ musculosæ inextricabiles occurrunt fibræ: f) quibus lingua contrahitur, expanditur, protrahitur, retrahitur, ceterique omnes mirabiles linguæ motus perficiuntur.

{ *Vsus*: *Gustus* & *sermonis* instrumentum est præcipuum: *manducationi* tamen quoque, *suctioni*, *deglutitioni*, *expuitioni* &c. mirabiliter etiam inservit. g)

286. OR-

a) Instit. Med. cap. de Gustu. b) diss. de Ductu salivali novo. c) diss. de auct. salival. novo. d) Ruysch. Thes. anat. I. Tab. IV. fig. 6. Morgag. Adv. I. Tab. I. e) Ruysch. l.c. f) vid. *Malpighius*, *Fracassatus* & *Steno* de Lingua g) Observatio notabilis de puella sine lingua nata, omnes tamen linguæ functiones perficiente, refertur a *Jussieu* Hist. Acad. Reg. A, 1712,

286. ORGANVM ODORATVS, NASVS est: cuius *situs & numerus* nota sunt omnibus: notanda vero

Magnitudo: vel mediocris, maxima vel minima.

Figura: elegans, vel turpis; aquilinus, fimus vel depressus.

Diviso: in partes

Externas: ad quas referuntur

Dorsum, radix, spina, orbiculus, ala vel pinna.

Septum, nasum in duas cavitates dividens, *nares* dictas.

Pili, vibrissæ a nonnullis dicti, muci effluvium involuntarium, illapsumque insectorum in fauces, impediennes.

Tegumenta communia, epidermis, cutis, pinguedo.

Pars superior rigida est, & ex ossibus constat;

Pars inferior, flexilis; ex variis cartilaginibus, musculis & membranis componitur. De musculis vid. Myologia.

Internas, ut sunt

Ossa: quorum multa ad nasi fabricam concurrunt: ut ossa nasi, maxillaria, cribriforme, spongiosa, frontale, lacrymalia, palati, vomer, sphenoides.

Cartilagines: partem inferiorem nasi constituentes, membranis colligatæ, ut nasus flexilis sit. Earum prima anteriorem septi narium partem constituit: deinde in quavis ala duæ satis magnæ existunt, quibus nunc duæ, nunc tres, nunc plures minores interponuntur. *a)*

Septi narium structura: in parte anteriori & inferiori cartilagineum est; in posteriori vero & superiori, osseum: quæ partes membranis robustis coniunguntur.

Nares s. Meatus, duo, ad fauces, pro aeris & muci transitu.

Sinus: ossium maxillarium, frontales, sphenoides, cellulæque ossis ethmoidis: cavum nasi, atque sic simul expansionem membranæ pituitariæ & odoratum augentes. *b)*

Inæqualitates, sive eminentiæ ossium turbinatorum sive spongiosorum in cavo narium; partim eidem usui inservientes, partim illapsum insectorum & aeris frigidi-
oris in fauces impediennes.

K 4

Mem-

a) Ruysch. Ep. VIII. fig. 4. Drak. Anthropol. Tab. XVII. Santorin. V. I. *b)* delineati in Palsini Osteol. Tab. I. & II. Drak. Tab. XVIII.

[*Membrana mollis rubra valde, vasculosa; nares, finus, & inæqualitates earum investiens, mucosa five pituitaria Schneideri dicta a), odoratus & secretionis muci organum.*

Oscula ductuum excretoriorum in hac membrana, præcipue in capite bubulo, optime sunt conspicua. b)

Glandulæ, sub hac membrana exiguæ c), præsertim in medio septi d), observantur, muci quoque secretioni destinatæ.

Arteriæ, a carotidibus copiosissimæ per illam membranam sunt dispersæ e) quæ & secretioni muci inserviunt.

Venæ, a iugularibus, pro supervacuo sanguine reducendo.

Nervi, per pituitariam dispersi, sunt 1. olfactorii, satis insignes, minores tamen, quam in bestiis: qui olfactus organum constituere f); 2. rami paris quinti: qui in villos desinentes hunc usum præstare ab aliis creduntur. g)

Membrana tenuis sub pituitaria h), ossa & cartilagine investiens: in his, perichondrium; in illis periostium dicta.

[*Foramina in naribus notanda,*

{ 1. *ad sinus, frontales, maxillares, sphenoides, & cellulas ossis ethmoidis, pro communicatione eorum cum naribus.*

{ 2. *oscula ductuum lacrymalium, utrinque in nares hiantia, optime delineata a Morgagno. i)*

{ 3. *ductus ex nare utraque ad os, mox post dentes incisores maxillæ superioris, in sceletio quidem aperti; sed neque in vivis, neque in cadaveribus in os hiant; at membrana palati exacte clausi sunt: ideoque & usus vulgo adscriptus, ac si mucus ex naribus ad os transmitterent, nullus esse videtur. (59*)*

Ufus nasi: organum esse odoratus; respirationi & voci inservire; mucum secernere; diverticulum esse humoris oculorum, ad gravitatem & pulchritudinem multum conferre. Sed neque aerem, neque pulveres naribus attractos ad cerebrum transmittit. An vero pituitam vel sanguinem e cerebro emittat, ut veteres & Schlevogtius volunt, adhuc dubium est.

287. OR-

a) de Catarrhis. b) Ruysch. epist. VIII. Tab. 9. f. 7. c) ibid. d) Morgagn. Adv VI. Santorin. p. 91. e) Ruysch. l. c. fig. 6. f) Schlevogt. id negat, eosque tantum pro cerebri emissariis haberi vult diss. de Process. cerebri mamill. &c. g) Santorin. obs. an. p. 92. h) Ruysch l. c. fig. 8. i) Advers. VI.

287. ORGANVM AUDITVS, AVRES sunt: quarum *situs, numerus & figura* externa, omnibus nota sunt. Dividi solet in tres partes, *extimam, mediam & intimam*. Extimam constituit AVRICVLA, quæ rectius *auris externa* vocatur, in qua variæ eminentiæ, excavationes, aliaque notanda: ut
- [*Pinna & Lobulus; Helix & Anthelix, Tragus & Antitragus. Scapha*: quæ est cavitas inter helicem & anthelicem posterior.
 - [*Concha*: quæ maior excavatio ante meatum auditorium, ubi *Glandula sebacea Valsalva a)*, quæ folliculi cutanei.
 - [*Substantia*: ex tegumentis communibus & cartilagine constat.
 - [*Musculi*: in homine valde exigui, & sæpe vix conspicui: nunc duo, nunc tres, nunc plures; *superior, posterior & anterior*, a situ dicendi: quorum usus in movenda aure aut nullus aut certe valde exiguus. Tensionitamen auris, quando accuratius audire volumus, inservire forte possunt.
 - [*Ligamentum*, quo eius pars posterior ossi petroso iungitur. *b)*
- Meatus auditorius*: in quo notanda
- [*Progressus* tortuosus & obliquus, versus anteriora. *c)*
 - [*Substantia*: partim ossea, partim cartilaginea, ex cartilaginibus quasi fractis, tunica elastica obductis, composita.
 - [*Membrana*, internam partem investiens, cuti continua
 - [*Glandula* flavæ, exiguæ, *ceruminosa* dictæ, *Duvernei d)*, in convexa huius membranæ parte, ad medietatem huius meatus sitæ, *cerumen*, quod flavum & amarum est, secernentes, & in meatum auditorium, pro usu vario, deponentes,
 - [*Corpus reticulare Valsalva*, in cuius areolis *glandula ceruminosa* contentæ conspiciuntur. *e)*
 - [*Pili* in meatu auditorio, eorumque utilitas.
- Usus auris externa*: ad sonum, quasi per tubam acusticam, melius suscipiendum, atque sic ad accuratius audiendum. *f)*
- Media pars

K 5

a) Tr. de Aure hum. b) Duverney de Org. Aud. Tab. III. f. 11. c) Valsalva Tab. III. f. 1. & 3. d) l. c. Tab. III. f. 1. & 3. e) l. c. Tab. III. f. 1. & 2. f) Schellhamm. affirmat, se primum docuisse, (Tr. de Auditu) auditum fieri per radios sonoros, ut visio per radios visorios. l. c. N. 59.

- Media pars, TYMPANVM dicitur: in quo notanda,**
- Membrana tympani*, in fine meatus auditorii posita: cuius
 - Situs*: non perpendicularis, sed valde obliquus introrsum.
 - Figura*: elliptica; non plana, sed concava.
 - Connexio*: in circumferentia, cum annulo osseo in infantibus, qui postea in meatum auditorium osseum mutatur; in medio, cum ossiculo, *malleus* dicto.
 - Substantia*: membranacea, tenuis, duplici vel triplici lamella constans: vasis sanguiferis, a *Ruschio* detectis, repleta. a)
 - Foramen exiguum*, obliquum, nonnulli post *Rivinum* b) in hac membrana naturaliter statuunt c), per quod quidam fumum tabaci, ore attractum, transmittunt. conf. (60*.)
 - Cavitas tympani*, ossea, minor in homine, quam vitulis: ubi
 - Periosteum* subtilissimum, vasis sanguiferis repletissimum. d)
 - Chorda tympani*: quæ nervulus est, ex ramuli paris quinti & septimi anastomosi conflatus, membranæ tympani instar chordæ subtentus, usus non satis perspecti.
 - Ossicula auditus*, tria, periosteis obducta e), *malleus*, *incus* & *stapes*, de quibus iam in Osteologia §. 68. conf. N. (61*)
 - Ossiculorum horum cohesio*: *Mallei manubrium*, membranæ tympani adhæret; capitulum vero eius per ginglymum corpori *incudis* articulatur: atque huius crus longius cum capite *stapedis* per arthrodiam; sed *stapes* basi sua fenestræ ovali ope tenuis membranulæ inhæret.
 - Musculi mallei*, duo: *internus* & *externus*: *stapedis* unus. f)
 - Fenestræ due*
 - ovalis*, ad vestibulum ducit, cui *stapes* insistit.
 - rotunda*, ad cochleam, membrana clausa.
 - Foramina*, præter modo dictas fenestras, adhuc duo:
 - alterum, per *tubam* sive *ductum Eustachii*, (Aristoteli iam notum, g) mox post tonsillas in os definit; qui ductus partim osseus, partim membranaceus, partim cartilagineus: auri cum ore communicationem præbet. h)
 - alterum, tendit ad *cellulas processus mastoidei*.

Intima

a) *Ruyseb. Epist. VIII. pag. 12. fig. 9.* b) *Welsch. Tab. anat. LIX.* c) *Valsalva l.c. Cap. II. Drake Anthropol. p. 567.* d) *Ruyseb. Epist. VIII. T. 9. f. 10.* e) *ibid. f. 1.* f) de quibus plura in *Myologia.* g) *Morgagn. epist. anat. I. n. 93.* h) *vid. Tab. nostr. VIII. fig. 38. c, d, ec.*

Intima, five tertia auris pars, LABYRINTHVS dicitur: in qua *Vestibulum*: quod cavitas est mediam labyrinthi partem constituens: cuius introitum fenestra ovalis constituit.

Canales tres semicirculares: maximus, medius & minimus. *Celso* non incogniti; quinque orificiis in vestibulum hiantes: bene delineati post varios a *DuVerneo* & *Valsalva*, loc. citatis.

Cochlea: est pars, canalibus his opposita, cochleæ similis; spiras duas cum dimidia perficiens: in qua *nucleus*, & *canalis*, a *lamina spirali* Eustachii in duos divisus, quorum alter, in vestibulum hians, *scala vestibuli* vocatur; alter, per fenestram rotundam in cavum tympani definens, *scala tympani* dicitur. a)

Membrana subtilissima, per omnia labyrinthi cava distributa, ab expansione nervi auditorii orta, *primaria auditus organi pars*, sicuti retina in oculo: quæ expansiones membranaceæ, in ove & aquila melius, quam homine conspiciendæ, a *Valsalva* *zonæ sonoræ* dicuntur. b)

Canalis nervi auditorii

1. *communis*, amplior, in quo foraminula ad labyrinthum.

2. *proprius*, angustior, at longior, *Aquæductus Fallopii* dictus, definens partim in cranii cavum, partim inter apophysin styloideam & mastoideam infra cranium. c)

Nervi: 1. a pari auditorio: quod duplici constat ramo, molli & duro. Mollis, per labyrinthum distribuitur d): durus vero impertit ramulos duræ matri, tympano, & auri externæ. 2. a tertio pari vertebralium colli, pro aure externa.

Arteriæ, a carotidibus: externis & internis.

Venæ, partim ad iugulares, partim ad sinus duræ matris abeunt.

288. TACTVS

a) *Valsalva* Traët. de Aure humana. b) ibid. Tab. VIII. f. 8. 9. c) ibid. Tab. VII. f. 3. 4. d) ibid. Tab. VIII. fig. 8. 9. Singularis admodum repectus huius nervi per cochleam, vestibulum & canales semicirculares, in forma filamenti, a *Simoncellio* & *Mistichellio* traditur, in *Epistol. Des Noves* p. 208. qui verò, an cum veritate conveniat, oculatiōribus me diiudicandum relinquo. Vid. Not. Num. (62^o)

288. TACTVS ORGANVM constituunt *papillæ cutaneæ*: quæ sunt extremitates nervorum cutis villosæ, in superficie eius ubique, maxime tamen in *volis manuum*, *plantis pedum*, ac potissimum in *apicibus digitorum*, ubi sensus tactus est accuratissimus, *elevatæ*, & *cuticula tectæ*: sicuti iam supra, ubi de cute egimus, indicatum est. Harum ab obiectis commotione, sensus tactus in nobis excitatur, & qualitates tactiles, asperum, læve, humidum, ficcum, calidum, frigidum, durum & molle &c. nobis manifestantur.

289 Cum hoc sensu quam maxime convenit *sensus gustus*; in quo, *papillæ nerveæ in lingua*, a corporibus sapidis affectæ, varias *saporum* differentias excitant. Ita, eodem fere modo, *nervi*, in *membrana narium pituitaria*, ut *papillæ*, dispersi *odores* varios percipiunt: &c. sic, ut sensus tactus communissimus sit, & reliqui sensus eius quasi diversæ tantum species.

DE ANGIOLOGIA.

290. ANGIOLOGIA, proprie vocari solet doctrina de vasis sanguiferis, *arteriis* scilicet & *venis*.

291. ARTERIA est canalis pulsans, elasticus, ramosus, sanguinem a corde ad omnes corporis partes deferens: ubi notanda, Numerus: *duæ* in toto corpore, *pulmonalis* & *aorta* sive *arteria magna*: ex quibus omnes reliquæ, tanquam rami.

Figura, *conoides*: ab ampliori diametro in angustiores pergens. Circa extrema tamen ramuli tandem fiunt *canales cylindrici*, & mutantur modo in *plexus reticulares*, modo in *penicillos*, *spirulas*, *glomos* &c. & tandem in *vasa serosa*, *venas*, *vasa lymphatica*, aut *ductus excretorios* desinunt.

Structura *membranacea*: ex membranis quinque composita, 1. *vasculosa*, 2. *cellulosa*, 3. *tendinea*, 4. *musculosa*, (ex fibris annularibus quam plurimis constans) 5. *nervea*. conf. Not. (63*)

292. ARTERIA PULMONALIS, e dextro cordis ventriculo oriunda primo in ramum dextrum & sinistram, deinde infinitis ramis per solum pulmonem distribuitur.

293. AOR-

293. AORTA, unico trunco e sinistro cordis ventriculo egressa, supra valvulas suas seminulares, mox ad cor, eiusque auriculas reflectit duas arterias, coronariæ cordis dictas: dein vero truncus, ad similitudinem arcus inflexus, emittit

RAMOS ASCENDENTES, tres in homine, (64*) unde proveniunt

{ Carotides duæ, dextra & sinistra: quarum quælibet circa laryngem, mire sæpius hinc inde flectitur (65*), & dividitur in

{ Carotidem externam: quæ ramos dat laryngi, pharyngi, musculis ossis hyoidis, maxillis, linguæ, labris, ori, naso, oculis, auribus, temporibus, omnibusque partibus externis capitis.

{ Carotidem internam: quæ cranium intrando, multis flexibus & anastomosis cerebrum eiusque membranas, oculos, nares, & aures internas adit.

{ Subclaviæ duæ: ex quibus utrinque prodit arteria

{ Vertebralis, quæ ad cerebrum, intra foramina, apophysibus transversis vertebrarum insculpta, (96*) ascendentes, miris prius factis ambagibus cranium subeunt, iunguntur carotidibus, constituunt cervicalem dictam a), reflectunt spinalem b) & cum illis toti cerebro prospiciunt.

Musculares colli, variæ, incerti numeri, per musculos colli.

{ Scapularis externa, per partes scapulæ externas.

Intercostales superiores, per costas duas, tresve superiores. c)

Mediastina, per mediastinum, thymum & pericardium.

Diaphragmatica superior, inter mediastinum ad diaphragma descendit, & dictis modo partibus sæpe ramulos largitur: præsertim si peculiaris mediastina, ut sæpe fit, deest.

Mammaria: sub sternum ad abdomen usque descendens, mammas, musculis variis thoracis & abdominis, imo & subinde mediastino & diaphragmati prospicit.

{ Axillaris: ex qua progerminat

{ Scapularis interna, per partes ossi scapulæ subiectas.

{ Thoracica, s. mammaria externa, per externas thoracis partes.

{ Brachialis, ad flexuram cubiti plerumque uno trunco descendit, ramulos solum impertiens brachio. Deinde in radiam ac cubitæam dividitur, hæque per manum ac digitos distribuuntur. Quandoque etiam brachialis in suprema brachii parte, quandoque in media iam in ramos dividitur: variusque naturæ lusus, respectu huius divisionis, in diversis hic observatur. N. (66**)

TRUNCVM

a) Ridley Anat. cereber. fig. 1, g. b) ibidem i. c) Walther. de Vas. vertebral.

TRUNCVS VERO DESCENDENS aortæ nomine per thoracem & abdomen, usque ad os sacrum, descendit, amplior ut plurimum in feminis, quam viris; & ex eo oriuntur

Bronchialis Ruyschii, quæ tamen sæpius ex intercostalibus. a) *Intercostales inferiores* ad omnes costas, duabus vel tribus superioribus haud raro exceptis, medullam in spina, musculosque dorsi & abdominis.

Oesophagæ ad œsophagum, a paucis olim notatæ. (67*)

Diaphragmaticæ inferiores: quæ quandoque ex cœliaca.

Cœliaca, mox sub diaphragmate prodit: b) cuius ramus

dexter, emitit gastricas & epiploicas dextras, pancreaticam, duodenam, hepaticas, & cysticas gemellas:

sinister, edit gastricas & epiploicas sinistras, gastro-epiploicas, magnam splenicam, & hæc pancreati, quandoque colorem ramos dat. c)

Mesenterica superior, per mesenterium & intestina tenuia.

Renales five emulgentes, utrinq; modo simplex, modo duplex.

Atrabiliaræ, ad capsulas atrabiliarias abeunt. } sæpe etiam ex

Adiposæ, ad membranam renum adiposam. } renalibus.

Spermaticæ, in viris, ad testes; in feminis, præcipue ad uterum.

Mesenterica inferior, ad intestina crassa: cuius ramus ad intestinum rectum abiens, hæmorrhoidalis interna audit.

Lumbares, variæ, ad musculos lumborum, abdominis & vicina.

Sacra, si adest, per medium ossis sacri descendit ad pelvim: quandoque vero una ex quavis iliaca prodit.

Iliacæ, duæ: quarum quælibet rursus in duos dividitur ramos,

internum, vulgo *hypogastricum*: qui prospicit vesicæ, intestino recto, (ubi hæmorrhoidalis externa audit) partibus genitalibus, natibus, partibusque vicinis;

externus: emitit *umbilicalem* d), *epigastricam*, per musculum rectum abdominis, usque ad mammariam excurrentem; *pudendam*, ad cutem pudendorum; & denique *Cruralem*, venæ incumbentem e), quæ dividitur in *externam*, minorem, per anteriorem femoris partem; & *internam* maiorem, unde *poplitæ*, *surales* ac *tibiales*, & quæ per extremum pedem quam plurimæ, sine nominibus, dividuntur.

294 VE-

a) *Ruysch*. dilucid. Valvul. lymphat. p. 61. & Epist. VI. b) *Waltherus* novam huius arteriæ descriptionem dedit 1729. c) ibid. d) cuius vero ortus variat. e) quod chirurgis observandum. *Morgagn*. Adv. II. 87.

294. **VENA**, est vas, sanguinem a partibus ad cor revehens. Venarum tres sunt primariæ: *pulmonalis*, *cava*, & *vena portæ*.
295. **VENA PULMONALIS**, a sinistra cordis auricula prodit: ubi primo sinum format; deinde mox in quatuor, postea in innumeros ramos, per pulmones distributos, dividitur. a)
296. **VENA CAVA** ampliori sinu a dextra auricula provenit, ibique *venam coronariam cordis* emittit: dein dividitur in **TRUNCUM SUPERIOREM**, latere dextro situm: ex quo
- { *Vena azygos* b), & ex hac, *intercostales* atque *œsophagæ*
 - { *Vena bronchialis* quæ & quandoque ex ipsa azygos provenit, quandoque ex *intercostali*; sæpe vero deficit.
 - { *Mediastina*, comes arteriæ *mediastinæ*.
 - { *Diaphragmatica superior*, comes suæ arteriæ.
 - { *Subclaviæ*: (quarum sinistra longior dextra) ex quibus utrinque
 - { *Iugularis externa*, pro externis capitis partibus: a quibus varia nomina recipit, ut *frontalis*, *temporalis*, *occipitalis*, *angularis* &c.
 - { *Iugularis interna*, laryngi, pharyngi, musculis ossis hyoidis, linguæ (quæ sub apice *Raninæ* vocantur) partibusque vicinis ramos dat. Truncus vero terminatur in *diverticulum* five *sacculum iugularem*, & sanguinem e duræ matris sinubus & cerebro reducit.
 - { *Vertebralis*, in apophyseis transversis vertebrarum colli ascendit ad cranium, (68*) & adit sinum lateralem, si foramen post processum condyloid. apertum.
 - { *Intercostales superiores*, per duas, tresve costas supremas.
 - { *Mammariæ*, arteriæ *mammariæ* sociæ.
 - { *Musculares*, superiores & inferiores.
 - { *Scapulares*, externæ & internæ, ac *thoracicæ externæ*.
 - { *Axillaris*: cuius ramus exterior, *Cephalica* dictus, in exteriori brachii latere, versus pollicem, extenditur; interior, *Basilica* nuncupatus, in brachio dextro *Hepatica*; in sinistro *Splenica* vocatur. *Mediana*, fit ex præcedentium concursu in flexura cubiti. *Salvatella* vero ea dicitur vena, quæ per dorsum manus versus digitum auricularem excurrit.

TRUNC. INF.

a) Figura vid. ap. *Drak* Tab. XIII. b) de hac doctissime egit. *Lancisus*, vid. *Morgagn.* Adv. V, 73 & sq.

TRUNCUM INFERIOREM, cum *valvula Eustachii*: (69.*) qui in thorace brevissimus, vix transversum digitum longus, prope hepar singulares inflexiones patitur, a recentioribus neglectus, a *Vesalio* vero & adhuc melius ab *Eustachio* Tab. XXV, ut *Morgagnus* docet, a) delineatus; ex quo venæ

Diaphragmaticæ, sive *phrenicæ inferiores*.

Hepaticæ, magni & multi rami, per hepar distributi.

Renales, ex quarum sinistra, *spermatica sinistra*.

Atrabiliaria & *adiposa*, quoque sæpe ex renalibus.

Spermatica deinde *dextra* & *lumbares* variæ.

Sacra, quæ quandoque duplex reperitur.

Iliacæ, ex quibus utrinque

Hypogastrica: a qua rami abeunt ad intestinum rectum & anum, *Hæmorrhoidales externæ* dictæ; alii ad vesicam, partes genitales, nates, musculosque vicinos.

Epigastrica, *Pudenda*, & *Musculares*: arteriarum eiusdem nominis sociæ.

Cruialis, per pedem excurrent: cuius *ramus internus* iuxta malleolum internum, *Saphæna*; *externus*, circa genu, *Poplitea*; in suris, *Suralis*; & circa pollices pedis, *Cephalica*, chirurgis nostris dici solet.

a) Epist. anatom. I. pag. 15.

297. VENA PORTAE, arbori similis est *a*): cuius

Radices (seu rami inferiores) dividuntur in
 { dextrum, a quo omnes venæ *Mesaraica inte-*
stinorum, Hemorrhoidalis interna, & Epiploi-
cæ dextræ.

{ finistrum, quæ *Vena Splenica* dicitur, a qua
 { *Gastrica* variæ, *Coronariam* ventriculi con-
 stituentes.

{ *Vasa brevia, Epiploica, & Gastro-epiploica.*
 { *Pancreatica, & quandoque Hemorrhoidalis*
 { *interna.*

Truncus, hepar adiens, dat *Cysticas, Gastricam*
dextram, Duodenam, & hæc sæpe Pancrea-
ticam.

Rami: ubi truncus explicari incipit, in hepate
Sinum portæ constituit, deinde innumeris ra-
 mis per solum hepar distribuitur.

{ *Usus*: qui idem esse videtur, ac venæ azygos:
 ut nimirum pondus sanguinis in vena cava
 ascendente sic imminuatur, & reditus eius
 five ascensus ad cor facilitetur.

298. *Structura*: constant venæ maximæ ex tunicis
membranacea, vasculosa & musculosa, sed lon-
 ge tenuioribus, quam arteriæ. *Valvulae se-*
milunares in ramis quibusdam venæ cavæ,
 nullæ in vena portæ aut pulmonali, existunt,
 circulo sanguinis succurrentes.

L

299. NER.

299. Nervi, sunt partes teretes, albicantes, plerumque fibrosæ, sive ex filamentis compositæ, ortæ vel e *cerebro*, aut potius *medulla* eius *oblongata* in cranio; vel e *medulla* in spina, atque ab his ad omnes corporis partes extensæ. (70*)

Dividi solent in Nervos cerebri, & in Nervos medullæ spinalis.

Nervorum cerebri *novem* tantum numeramus paria: §. 272)

I, OLFACTORIVM, per os cribrosum membranam narium adiens Conf. quæ in fine (§. 287.) de hoc pari dicta sunt.

II, OPTICVM, tunicam retinam oculi efformans.

III, OCULORVM MOTORIVM, prope orbitam in sex ramos divisum est, quorum 1. in homine abit ad elevatorem palpebræ, 2. ad elevatorem oculi, 3. ad depressorem, 4. ad adducentem, 5. ad obliquum inferiorem, 6. in oculi tunicas. In bestiis vero alio modo distribuitur.

IV, PATHETICVM, *Willisio* dictum, *Eustachio* iam notum, valde tenue, musculum oculi trochlearem adit.

V, GUSTATORIVM, perquam magnum, in cranio, mox sub dura matre, in tres insignes ramos dividitur: quorum

1, & superior, *Ophthalmicus* dicitur: variis oculi partibus, palpebris, musculis frontis & nasi, tegumentisque faciei prospicit.

2, *Maxillaris superior* dici potest, quia (postquam per foramen rotundum cranio egressus) *per omnes maxilla superioris partes, labra, nasum, palatum, uvulam, gingivas, & dentes* distribuitur. Attamen ramulum quoque ad aurem reflectit: qui ramulo septimi paris iunctus, *chordam tympani* constituit. Præterea surculum unum aut duos adhuc in cranio emit: qui cum ramulo paris sexti principium quandoque *Nervi intercostalis* constituunt.

3, *Maxillaris inferior* vocari potest, quia (egressus per foramen ovale cranii) maxillæ inferioris partibus, dentibus, & imprimis etiam linguæ, prospicit: unde totum par *Gustatorii* nomen accepit.

VI, ABDUCENS,

VI, ABDUCENS, ramulum emittit, pro *Nervi intercostalis* (V, 2) constitutione: tota vero reliqua pars potissimum ad musculum oculi *abducentem* abit.

Intercostale autem ex ramulis duorum præcedentium, vel ex solo sexto, ortum, per canalem carotidis internæ cranio exit, & iuxta par VIII. per collum, hinc iuxta spinam dorsi per thoracem & abdomen, usque ad pelvim descendit, ubique ex spina ramulos accipiens, variosque *plexus*, situ variantes, & *ganglia a)* constituens, ramos dare fere omnibus in collo, thorace & abdomine contentis partibus.

VII, AUDITORIVM: duobus oritur truncis, quorum alter, *portio dura*; alter, *portio mollis* audit. Hæc foramen ossis petrosi intrat, ac per varia foraminula labyrinthum adit, (§. 69.) per omnes eius partes expanditur, & *primariam organi auditus partem* constituit. *Portio vero dura, Aquæductum Fallopii* transiens, reflectit sæpe ramulum, aut plures, ex anteriori facie processus petrosi in cranii caveam, qui sub dura menynge ad receptacula &c. abeunt *b)*; alium vero intus pro *chorda tympani* cum ramo quinti paris constituenda, aliosque minores ad musculos, reliquasque tympani partes. Reliqua pars ad aurem externam, pericranium, musculos ossis hyoïdis, labrorum, palpebras & parotides abit.

VIII, VAGVM (una cum *spinali accessorio Willisii*) iuxta sinus laterales duræ matris egrediens, descendendo per collum & thoracem, (oesophago adhærens) ad abdomen, ramos impendit laryngi, pharyngi, linguæ, *c)* cordi pulmoni, & præcipue ventriculo. *Nervos* quoque e suprema thoracis parte reflectit ad laryngem, qui inde *Recurrentes* dicuntur. Ceterum tam in collo, thorace, quam abdomine, variis plexibus implicatur *unquali, cervicalibus & intercostali* (VI).

XI, LINGVALE. ad linguam abit, & *linguæ motorium* vulgo; a quibusdam vero potius *Gustatorium*, habetur. (§. 28.)

Illud vero par, quod cum *Willisio* vulgo pro decimo cerebri numeratur, varias ob rationes, rectius pro primo colli habendum esse puto. (71*)

L 2

300 NER.

a) de horum fabrica & usu musculari *Morgagn.* Adv. II. 71. & V. 101.

b) idem *Advers.* VI. p. 34. c) *Lancisius* de corde Tab. VI. fig. 1.

300. NERVI SPINALIS MEDULLAE dicuntur, qui ex medulla, quæ in spina est, oriuntur. (Conf. §. 273.) Horum *triginta duo* numeramus paria: nimirum

CERVICIS vel COLLI, paria octo: a quibus innumeri ramuli per musculos capitis, colli, scapulæ & humeri distribuuntur. Speciatim vero a pari tertio ramus quidam *ad aurem* ascendit. Insimul a pari tertio, quarto & quinto ut plurimum oritur *Nervus diaphragmaticus*, per collum & thoracem (ubi pericardio adhæret) ad diaphragma descendens: ex quo ramulos ad venæ cavæ inferiorem truncum emittit. a) Par sextum, septimum, octavum, & primum par *dorsalium*, anastomosibus iuncta, *nervos brachiales* sex robustos componunt, prospicientes scapulis, brachiis, manibus & digitis.

Huc, tanquam nonum nervorum colli par, referendus *Nervus spinalis vel accessorius Willisii*: qui circa par tertium vel quartum colli e spinalis medullæ parte posteriori b) ortus, per foramen magnum occipitis in cranium ascendit; deinde *pari vago* iunctus, & per idem foramen cranio egressus, recedit rursus a pari vago, & reflectitur ad *musculum* scapulæ *cucullarem* sive *trapezium*. b)

DORSI, duodecim sunt paria: hæc, præter ramum, quem nervis brachialibus dant, iuxta tractum costarum, in earum sulco, excurrunt, ac pleuræ, æmusculis intercostalibus, pectoralibus, & abdominis, mammis, aliisque thoracem ambientibus partibus ramos largiuntur.

LUMBORVM,

a) vid. Lancis. de corde Tab. I. b) hoc par non a prioribus, sed a posterioribus, neque infra quintam coniugationem oriri notavit Santorinus, contra Ridleyum, observ. anat. p. 68. c) optime a Duvernoi delineatur, Tract. de Auditus organo Tab. XI. fig. I. T.

LUMBORVM, quinque paria: non solum per lumbos, peritonæum, tegumenta & musculos abdominis distribuuntur; sed præterea etiam eorum

{ *par primum* utrinque sæpe furculum *diaphragma-*
ti largitur.

{ *par secundum* vero, cum ramis *paris primi, tertii*
& *quarti* inosculatum, *Nervum Cruralem* con-
stituit, per anteriorem femoris partem distri-
butum. Sic & ex *pari secundo, tertio & quar-*
to ramus componitur, qui per foramen mag-
num ossis pubis transit ad *scrotum, testes, par-*
tesque vicinas.

{ *par quartum & quintum*, cum primo, secundo,
tertio, & quarto ossis sacri componunt *Ner-*
vum ischiaticum, sive cruralem posteriorem, totius
corporis maximum. Hic inter musculos glu-
tæos pelvi egreditur, atque in posteriori fe-
moris parte, inter duo capitula inferiora fe-
moris, descendens, per tibiā & totum pe-
dem, ad digitos usque, distribuitur. Ante-
quam vero e pelvi exit, ramulos impertit *vesi-*
ca, intestino recto, partibus genitalibus, muscu-
lisque vicinis.

{ OSSIS SACRI, quinque ut plurimum paria, per fora-
mina huius ossis anteriora, egrediuntur: quo-
rum superiora, ut dictum modo est, *Nervum*
• *ischiaticum* constituunt; quod vero reliquum est,
partibus in pelvi sitis, intestino recto, vesicæ,
partibus genitalibus, aliisque vicinis impenditur. Per
foramina vero posteriora huius ossis, etsi satis magna,
nullus notabilis nervus, ut multi male perhibent,
transire observatur.

Ceterum de nervorum subtiliori distributione, evolvi me-
retur *Willisius* de Cerebro & Nervis; atque *Vieussenii* Nev-
rographia, figuris maximis & splendidis illustrata.

301. STRUCTURA sive FABRICA NERVORVM, in nervis maioribus, multisque minoribus, præter vasa sanguifera, & membranas, quibus cinguntur, conspicitur *fibrosa*, ex quamplurimis *fibris*, & quasi *fasciculo filamentorum* cylindricorum, albicantiumque, composita: quæ quidem filamenta solida apparent, & nulla in iis cavitas facile conspicitur, a) multo minus liquidum in eis observatur. Interea tamen *filamenta nervorum esse cava*, & liquidum, quod SPIRITVS vulgo vel *liquidum nerveum* vocant Medici, in eis contineri, eaque propterea non fibras solidas, sed *vera esse vascula*, inter alias sequentibus persuademur rationibus:

1. Quia e cerebro & spinali medulla, uti *ductus excretorii* alii ex aliis visceribus & glandulis, ad extrema scilicet arteriolarum corticalis cerebri substantiæ, oriuntur.
2. Quia ingens copia sanguinis subtilissimi, quæ per quatuor insignes arterias ad cerebrum continuo deferatur, comparatione facta cum hepate, ab exigua arteria nutrito, pro sola cerebri nutritione non requireretur; nisi *secretio*, & quidem larga, ex hoc sanguine hic fieret.
3. Quia a primo ortu in utero, ad perfectam usque corporis magnitudinem, crescunt, elongantur & ad extremum usque vitæ nutriuntur: quod vix recte explicari posse puto, nisi liquidum subtilissimum in nervis admittatur, quod eos extendat.
4. Quia *nervo resecto*, SENSUS, MOTVS, imo & NUTRITIO illius partis, cui inferebatur, cessant: certo indicio, influxum alicuius liquidi, quod alias ad hæc præstanda affluebat, iam sublatum esse.

5. Liga-

a) *Leeuwenhæck* tamen se eas sæpius observasse affirmat Epist. phys. XXXII.

5. *Ligatis nervis*, idem contingit, & speciatim *ligatis phrenicis*, motus diaphragmatis cessat. Pressis vero deinde his nervis infra ligaturam versus diaphragma, motus aliquis in diaphragmate reddit: quod perspicue indicat, motum diaphragmatis a fluido, in his nervis contento, oriri & instaurari.
6. *Somni & vigiliarum natura* sine spiritibus aut fluido nerveo intelligi recte nequit, & nemo eam adhuc sine his clare exposuit.
7. Cur a *nimia venere*, præsertim in debilioribus, aut minus robustis, tanta sæpe sequatur *debilitas*, sine spiritibus explicari aut concipi non potest.
8. Neque *debilitas a studiis nimis* vel in multis morbis, & præsertim subitanea illa *virium prostratio in febribus malignis*, ab ullo sine spiritibus hucusque bene exposita est.
9. *Ex incremento & accretione fructuum*, verbi gratia, ceraforum &c. in quorum pedunculis fibræ sine cavitatibus conspiciuntur, & tamen succum sive fluidum longe crassius, quam nerveum esse ponitur, quod non solum fructum, sed durissimum nucleum efficit, per cava inconspicua pedunculorum transire, incrementum & perfectio fructuum, tanquam manifestus & non denegandus effectus, quam evidentissime docent. Quare igitur tenuissimum fluidum in nervis non concedant multi, rationem idoneam non vidi. Præterea
10. *Spiritus qui negant, nullum, vel saltem nullum perspicuum, usum nervis dare possunt.* Si enim dicunt, animam contractione nervorum agere, motusque produ-

producere : primo contractio neque percipitur in nervo, neque demonstrari potest. Deinde phænomenon ligati nervi (N. 5.) explicare nequeunt ; quamvis enim nervus filo stringatur, ligatura hæc actionem eius impedire non valeret, eodem prorsus modo, quo vis trahendi funi non adimitur, licet filo constrictus sit. a)

302. VSVS igitur NERVORVM mea sententia est, *spiritus*, sive *liquidum subtilissimum*, in cerebro & spinali medulla secretum, fovere, ac *pro sensu, motu & nutritione*, ad omnes corporis partes ; imo subtilissimis suis fibrillis, ad omnia partium puncta, deferre.

DE

a) Conferri hic meretur totum caput de Cerebro ex *Bærbav. Instit. Med. Morgagni Adversar. anat. II, p. 70. 72. & VI, p. 29. 30.* itemque *Burggrav. de Spirit. Exist. &c.* quia hodie tam multi sunt, qui hos, quoniam eos & cava nervorum videre non possunt, aliasque leves ob causas, negant : imo sunt, quos nominare hic nolo, qui in illos, qui spiritus admittunt, scommatibus & conviciis invehuntur. Haud enim subtiliter satis de subtilissimo hoc fluido iudicare videntur, qui illud tam crassum aut spissum fingunt, quasi in oculos incurre debeat ; cum potius tam subtile concipiendum, sicut haud inepte *Schelhammerus* noster iudicat, (*Anal. anat. diss. XIII. 46.*) ut instar lucis velocissime se diffundat, quod profecto non oculis, sed ex effectibus & phænomenis, qualia nonnulla adduximus, ope iudicii sive mentis oculis cognoscendum ; quemadmodum cava vasorum & liquidum tenuissimum in insectis minimis, acaribus, aliisque centies millies his minoribus, (conf. *Hist. Acad. Reg. A. 1718.*) non nisi mentis oculis cognoscuntur. Ita aerem, animam, & multa alia non videmus, quæ tamen ex effectibus, quemadmodum spiritus animales, esse & existere intelligimus.

DE MYOLOGIA.

303. MYOLOGIA est doctrina de *musculis*, *myologia* quid. docens eorum fabricam, originem, insertionem seu finem, situm, actionem & usum.

304. MUSCULVS, est instrumentum motus, *musculus* quid. sive pars corporis, motui præsertim voluntario perficiendo dicata: constans potissimum ex fibris carneis & tendineis: quibus omnis generis vasa, arteriæ, venæ, nervi & lymphatica accedunt: quæ partes omnes comuni membrana involvuntur.

305. Dividitur in corpus, & duas extremitates: *eius divisio.* corpus etiam *venter*, & *extremitates*, præcipue albicantes, quoque *tendines* vocantur. Extremitas, ubi oritur, *caput*, principium, origo, sive etiam *punctum fixum* appellatur; finis vero, *cauda*, *punctum mobile*, & sæpissime *tendo* dicitur: qui, si membranaceus & latus, *aponevrosis* audit.

306. *Actio musculi*, consistit proprie in contractione ventris, quocunque modo hoc fiat, qua eius extrema ad se invicem accedunt, & sic partē, cui finis musculi inseritur, quasi chorda traheretur, movent. *Schelkammerus a)* contractionem hanc fieri existimat corrugatione fibrarum, sicut lumbricos se corrugare sive contrahere videmus. *Morgagnus b)* ad actionem musculi intelligendam multum facere iudicat *experimentum Wallisii*: quo probatur, minimam vim aeris per tenuem cylindrum in vesicam impulsu, lateribus eius distentis, ac longitudine contracta, pondus plerumque librarum 60 vel 70. attollere & sustinere posse. Alii hydrostaticis experimentis demon-

L 5

strant,

a) Analect. anatom. Dissert. VII. b) Adversar. V. p. 112.

strant, quomodo paucum liquidum, per tenuem cylindrum, qui vasi amplioris basis, iam pleno, insistit, immissum, ingens pondus movere & elevare possit. Ex quo sequitur, *ventrem musculi* in contractione sive actione sua *intumescere*. Verum sunt multi ex recentioribus, qui intumescentiam musculi in actione negant. Sed his suadeo, ut, dum maxillam inferiorem fortiter adducunt ad superiorem, digitos duos vel tres musculo masseteri, vel temporali, impo-
nant, tunc manifestissimam intumescentiam & indurationem percipient. Vel solum, manu prona, pollicem fortiter adducant ad indicem, & videbunt, tactuque percipient, quomodo musculus inter pollicem & indicem valde intumescat, atque durescat, sic, ut, licet plura hic exempla non adducamus, nemo de intumescencia musculi, quando se contrahit, iure amplius dubitare possit. a) In multis musculis *utraq; extremitas mobilis est*, & tales proprie nullum habent punctum fixum; quo vero in casu illa pars, quæ altera immobilior, pro puncto fixo, sive origine; mobilior, pro fine, seu puncto mobili, ut plurimum est reputanda. Nam dantur casus, variis talibus in musculis, *ut id, quod modo fuit punctum mobile, iam fiat punctum fixum; & contra, quod fixum fuit, iam fiat mobile*: exemplo *scalenorum, serratorum anticorum, musculorum quorundam abdominis, aliorumque*.

307. Qui-

a) De actione musculorum præ ceteris prolixius videantur *Bo-rellus*, de motu animalium; *Bernouillius*, de Motu musculorum; *Bergerus* in Physiolog. cap. XXII. *Boerhavius* Instit. med. articulo de Musculorum actione; & *Mead*. Introductio in Myotomiam novam ac splendidam *Comperi*.

307. Quidam *musculi in unam conspirant actionem*, sive socii sunt unius actionis: ut flexores sive extensores brachii &c. & hinc musculi, in unam actionem conspirantes, *congeneres*, sive *socii*, vocari possunt. Quando vero respectus habetur ad actionem contrariam musculorum, dum scilicet extensores alicuius partis, contrariam flexoribus actionem perficiunt, tunc tales musculi *Antagonistæ* appellantur. Ambo vero simul agentes, membrum rigidum efficiunt, ac immotum servant; quæ musculorum actio, *Motus tonicus* dicitur. Præterea notandum hic esse existimamus, *multos musculos, seorsim consideratos, alios adhuc usus perficere, quam qui toti pari adscribuntur*, aut a toto pari simul agente perficiuntur. Sic musculus mastoideus, rectus maior capitis, &c. quando utrinque simul agunt, caput recta antrorsum flectunt; quando vero in uno tantum latere, caput oblique deorsum, & ad latus alterutrum ducunt. Hinc a diversitate musculorum, qui vel soli agunt, vel coniunctim cum suo socio, vel cum aliis, multi adhuc mediis motus, & a primariis motibus diversi, hucusque vero non satis observati, oriuntur. Id quod non solum in capitis musculis, tam flexoribus, quam extensoribus; verum etiam in multis aliis, præsertim vero in oculorum, labrorum, maxillæ inferioris, linguæ, colli, abdominis, brachii & carpi musculis, &c. observandum, alias tam varios & mirabiles partium motus intelligere non possemus. Conferri hic merentur elegantissimæ observationes *Winslovvi* de actione musculorum *a)*, ubi in primis etiam demonstrat, plures motus non fieri contractione, sed relaxatione eorundem in latere opposito.

musculi socii & antagonista.

de motibus quorundam musculorum.

308. Fi-

a) in Histor. Acad. Reg. An. 1720.

*fibrarum
diversitas.*

308. *Fibræ musculosæ*, pro actionis, cui dicatæ, diversitate, vel rectæ, sunt, vel obliquæ, transversæ, annulares, vel spirales, &c.

*musculi sim-
plices &
compositi.*

309. Nonnulli musculorum ex simplici five uniformi fibrarum tractu constant: & hi *simplices* dicuntur. Alii vero ex vario fibrarum, eoque sæpe contrario tractu, imo ex diversis quasi parvis musculis componuntur, & *compositi* vocari possunt: prout STENO, BORELLVS, & LOWERVS egregie demonstrant. Quo plures autem tales in unum musculus coeunt, eo musculus fit crassior & robustior.

*quid motus
animalis,
naturalis
& mixtus.*

310. *Motus* plerorumque musculorum est *voluntarius* five *animalis*; aliorum *involuntarius* five *naturalis* dictus; & quorundam motus mixtus est, ex naturali & animali, five ex voluntario & involuntario: & hinc *motus mixtus* appellari solet. Ii muscoli, qui motum obtinent voluntarium, a cerebro aut spinali medulla nervos accipiunt; qui naturalem five involuntarium, a cerebello; qui utrumque, a cerebro & cerebello simul. Sicuti vero musculus, *nervo eius vel dissecto vel ligato*, agere amplius nequit: ita eum quoque agere non posse, *ligata vel dissecta ipsius arteria*, STENONIS, aliorumque in canibus experimentis & industria compertum est.

*unde nomi-
na.*

311. *Nomina* recipiunt muscoli, ut plurimum vel a puncto fixo & mobili eius simul; vel a puncto fixo, aut puncto mobili solum; vel ab usu, quem præcipue præstant; vel a figura aut similitudine; vel a loco aut situ; vel a magnitudine, aliisve eorum qualitatibus: sicut ex speciali musculorum consideratione uberius patebit: quorum optimæ delineationes reperiuntur apud *Vesalium*, *Eustachium*, *Casserium*, *Dra- kium*, & imprimis *Cowperum* in splendida sua *Myotomia* in folio.

*ordo myo-
logiæ.*

312. Incipiemus vero specialem eorum historiam a capite, progrediendo usque ad calcem: sic postea apparebit, de eorum numero, in quo Autores & Cadavera tantopere variant, & qui facile 500 superat, nihil certum aut perpetuum hic statui posse.

DE MUSCULIS SPECIATIM.

313. MUSCULI CUTIS CRANII sunt quatuor:

[*Frontales*, duo: valde tenues, siti sub cutē fron-^{musculi cu-}
tis, & utrumque extremum habent mobile, ^{tis cranii.}
paucis fibris exceptis, quæ ex inferiori mar-
gine ossis frontis proveniunt. Extenduntur
utrinque sub superciliis ab orbiculari palpebra-
rum prope canthum oculi maiorem, ultra di-
midium orbitæ versus canthum minorem, &
ascendunt paululum oblique extrorsum, super
os frontis; deinde tendines suos super cranii
partem superiorem expandunt, & cum apo-
nevrosi occipitalium, qui fixi, coniungi viden-
tur: sic iis cutis cranii, præsertim frontis, mo-
veri, & simul supercilia attoli possunt. Horum
antagonistæ sunt orbiculares palpebrarum,
quibus innascuntur.

[*Occipitales*, duo, plerumque etiam valde tenues:
oriuntur utrinque ex osse occipitis, ubi ossi-
bus temporalibus adhæret: ascendunt sur-
sum, supra ossa bregmatis, aponevrosin cum
frontalibus (quorum quasi punctum fixum
sunt) adunant, cranium veluti *galea* tegunt,
eorumque actioni succurrunt. a) Hos occi-
pitales quandoque deficere notavit *Mor-*
gagnus, & quandoque adeo tenues sunt,
ut difficillime conspiciantur; quandoque
vero solito ampliores, & quasi in duo divisi,
hinc utrinque *duplices occipitales* statuit *San-*
torinus. b.)

314. SVPE-

* *Cowperus* hos & frontales musculos pro uno quasi digastri-
co haberi posse censet *Myotom.* in fol. pag. 16. b) pag. 2.
& 9. c) observat. anatom. pag. 8. & 9. De horum aliorum-
que musculorum faciei varietate legi meretur *Waltheri Te-*
nerior. musculor. Anatom. 1731. Lipsiæ edita,

supercilio-
rum.

314. *Superciliorum Corrugator*, five *Depressor* unus: oritur utrinque a radice nasi, & in utrumque supercilium oblique inferitur, quæ ad se invicem adducit, & simul deorsum movet: frontales contra ea, atollunt. Videtur mihi pars quasi frontaliū; *Santorino* vero pars orbicularis a)

palpebra-
rum.

315. *Palpebrarum*, Tres:

Orbicularis seu constrictor, unus: oritur ex apophysi superiori ossis maxillaris, iuxta oculi canthum maiorem; fibris orbicularibus utramque palpebram ambit, easque claudit: atque eo ipso supercilia deprimit & adducit b), & palpebram inferiorem elevat. c)

Elevator proprius palpebræ superioris. Oritur in fundo orbitæ, & inferitur palpebræ superioris margini, prope cartilagineum tarfi.

Depressor palpebræ inferioris: est series fibrarum carnearum, modo tenuior, modo crassior, ex cute genarum, quandoque ex osse iugali proveniens, & in orbicularis oram inferiorem oblique introrsum se inferens: quibus palpebra inferior, si rite attendamus, manifesto deorsum trahitur, quando oculum aperimus.

316. *Mvs-*

a) pag. 8. & 9. b) *Morgagn*, *Advers*, II. 28. c) *idem* *Advers*, VI. 44.

316. MUSCULI OCULI sunt septem in bestiis, *musculi oculorum.*
sed sex tantum in homine *a)*, nimirum

{ *Recti*, quatuor : oriundi circa foraminis nervi optici, in fundo orbitæ, ambitum, inferuntur in scleroticam, non procul ab ambitu corneæ *b)* : ut

{ <i>Superior</i> attollens, five superbus.	} a quibus quoque, si duo coniunctim agunt, motus obliqui fiunt.
{ <i>Inferior</i> , deprimens, five humilis.	
{ <i>Exterior</i> , abducens, f. indignatorius.	
{ <i>Interior</i> , adducens, five bibitorius.	

{ *Obliqui*, five rotatores duo : ut

{ *Obliquus maior, superior, five trochlearis* : oritur iuxta præcedentes ; sed transit per singularem trochleam *c)* fere cartilagineam, supra cantum oculi maiorem : inde rursus reflectitur, & superiori oculi parti circa medium inferitur ; hinc oculi pupillam oblique deprimat, & quodammodo educit.

{ *Obliquus minor, five inferior* : oritur ab anteriori & interiori orbitæ parte, fere prope canalem nasalem ; oblique inferiorem bulbi partem ambit, & exteriori eius parti circa medium inferitur. Hinc oculi pupillam oblique sursum movet : aliter ac vulgo putarunt. Ambo vero simul agentes, oculum antrorsum ducunt, atque sic rectorum, (qui retrorsum ducunt) antagonista sunt, oculumque simul quasi in æquilibrio suspensum retinent, ut in omne punctum sit mobilissimus.

Musculus septimus brutorum, in fundo orbitæ, a circumferentia nervi optici undique oritur, scleroticæ partem posteriorem totam amplectitur, & bulbo oculi protrudendo inservire videtur.

317. Mus-

a) ab *Eustachio* optime delineati Tab. 39. *b)* ad palpebras eos quoque esse extensos, præsertim inferiorem ut motui horum succurrant, notat *Morgagn.* Adv. VI 98. *c)* de huius constitutione ibid. De his musculis etiam legi meretur *Winslow* in Hist. Acad. Reg. An. 1721.

317. MUSCULI AVRIS EXTERNAE sæpe tam exigui sunt, ut vix appareant; aut revera subinde defunt: hinc *Schelhammerus* noster, præsertim, quia eorum actio raro percipitur, ipsos ex numero partium consuetarum reiicit. a) Veteres etiam ob hanc causam eos neglexisse videntur; & *Galenus* pro lineamentis potius musculorum, quam musculis habuit. b) *Columbus* c) & cum primis *Fallopianus* d) primi ipsos descripserunt; quos tamen non semper adesse, simul monent. *Fallopianus* speciatim tres aliquando se reperisse ait: quorum primus, ut refert, in anteriori parte collocatus, oritur a fine musculi frontis, unde valde tenuis descendit versus aurem, & in eius anteriorem & superiorem partem inseritur. Secundus supra processum mamillarem, tenui principio oritur, per transversum fertur descendendo, & parum latior factus, veluti si in tres digitos divideretur, posteriori auriculæ implantatur. Tertius est pars illius, qui *platysma myodes* dicitur: a quo aliquando pars ad partem inferiorem auriculæ ascendit, eique inseritur. *Casseri* e) & *Bidloo* f) recensent quinque; *Du Verney* g) tantum duo, superiorem & posteriorem, atque hos cum suis inquisitionibus maxime convenire asseverat *Comperus*. h) Verum *Valsalva* i) tres delineat, & anteriorem his addit. Sed postea *Vieussens* quatuor rursus describit, affirmando, se aurem non descripsisse, antequam millies eam examinaverit, suasque figuras tam accuratas esse, ut nunquam exactiores visæ sint. k) *Santorinus* vero, qui *Vieussensii* tractatum haud vidisse videtur, fere omnes erroris incusat, l) atque aliam rursus exhibet delineationem. Verum ego hanc auctorum diversitatem non erroribus, si *Bidloianas* forte excipias, sed potius varietati subiectorum adscribere malo: nam in quovis fere cadavere aliquam varietatem, sæpissime tamen etiam tantum superiorem & posteriorem, varie in variis constitutum, deprehendere soleo: eosque, si adsunt, potissimum tendendæ & relaxandæ auriculæ, pro soni diversitate, infervire existimo. m)

Muscu-

- a) Tract. de Auditu P. I. C. I. n. 7. & Analect. Anat. disp. XIII. N. 3.
 b) de usu part. L. XVI. C. 6. c) de re anatom. d) observ. anat. e)
 Tract. de auditu. f) Anatom. Tab. 12. fig. 1. g) Tract. de auditu. h)
 in Myotom. nov. p. 29. i) de aure hum. k) *Traité de l'oreille*, in quo
Censor Parisiensis præterea testatur, figuras *Vieussensii* cum archetypo
 convenire. l) observ. anatom. m) conf. *Waltheri* teneriorum musculorum
 Anatomie repetita.

Musculi, quos *Valsalva* trago & antitrago, & *Santorinus* cum *Douglassio* a) helici, conchæ atque meatui auditorio adscribit, mea sententia quoque pro lineamentis magis muscutorum, aut membranarum tantum muscularibus, quam pro veris musculis habendi: quia raro satis manifestæ fibræ carneæ eis in locis deprehenduntur, neque motus ibi observatur.

318. *MUSCULI AURIS INTERNÆ*, sunt vel mallei vel stapedis, omnes valde exigui.

MALLEI, cum *Compero*, *Douglas*. & *Valsalva* tres numeram^{b)} externus oritur ventre brevi a superiori margine meatus auditorii, & tendine tenui pergit supra membranæ tympani partem superiorem in tympani cavum, & in crassiorem mallei processum inferitur, cuius manubrium foris trahendo tympani membranam laxat.

obliquus five semicircularis, situs est in externa & ossea parte ductus *Eustachii*: unde per canalē paulo sursum & retrorsum progrediēdo, inferitur mallei processui longissimo, tympanique membranā tēdere varieque laxare potest. internus, ex parte cartilaginea, ubi pars ossea ductus *Eustachii* terminatur, oritur, & pergit in canali osseo partis superioris huius ductus fere ad fenestram ovalem in tympanum, ubi tendo eius, quasi super trochleam, ad malleum reflectitur, & parti posteriori manubrii, mox sub capitulo inferitur, tympanumque tendit.

STAPEDIS, oritur in canali ossis petrosi fere in fundo tympani, corpore satis crasso, quod mox tendinem emittit tenuem, qui in caput stapedis & os, orbiculare dictum, inferitur, stapedemque elevat.

M

319. *Mvs-*

a) *Myograph.* p. 29. b) *Myotom. nov.* in fol. p. 33. & *Tab. XXVI.* *Du Verney* duos numerat, aliisque nominibus eos describit; sed *Leussens traité de l'oreille*, unicum tantum esse muscolum mallei contendit, quem *monogastricum* appellat, duplici principio, duplicique fine instructum, p. 40. eumque delineat *Tab. 2. fig. 3.* *Valsalva Tr. de aure*, his musculis non solum alia nomina tribuit, verum etiam aliter describit: neque in usibus cum *Compero* convenit: *Boerhavius* in *Instit.* rursus differt ab his: ex quibus difficultatibus propter partium subtilitatem & eadaverum forte etiam in his varietatem, me adhuc, ut verum fatear, extricare satis non potui.

MUSCULI LABRORVM mihi sunt quatuordecim *a)*:

vario labrorum motui, animique affectibus servientes,

Constrictor, unus, *orbicularis* dictus, ipsa labra constituens: cuius fibræ tamen sæpe quasi arciformes. *b)*

Abductores, qui *Risores* dici possunt, duo paria:

Zygomaticus: cuius origo, os zygomatis; finis angulus labrorum. Hic quandoque duplex, quandoque caput habet duplex, quandoque finem tantum bifidum, vicinis variis implexum.

Buccinator: cuius origo, partim a parte anteriori & infima processus coronoidis maxillæ inferioris *c)*; partim ad radices postremorum dentium molarium utriusque maxillæ; *progressus*, capite erecto fere horizontalis; & *finis*, ut prioris. Cibos dentibus submittit, buccinatores iuvat, & ductus salivalis Stenonianus eius medium perforat.

Elevatores sunt vel

communes, duo, five unum par, *caninus* dictus, qui oritur ex cavea sub osse iugali, in osse maxillari; & inferitur in angulum labrorum.

proprii, duo paria,

labro superiori, *Incisorius* dictus: cuius origo, os maxillare, mox sub orbita, transit proxime alam nasi, cui fibras impertit, & inferitur orbiculari ad dentes incisores.

labro inferiori, *Elevator labii inferioris Cowperi*: oritur infra incisores maxillæ inferioris sub gingivis, & descendit in cutem menti. Hic, *incisorius inferior*; ille, *incisorius superior* dicit posset.

Depressores, tres, variis præcedentium mire sæpe innexi,

Triangulares, duo: quorum quilibet oritur ex parte laterali & infima maxillæ inferioris circa medium, unde ascendit oblique ad angulum orbicularis.

Quadratus, unicus, fibris reticulatis constans, oritur ex parte anteriori eiusdem maxillæ lato principio, & definit in totam partem inferiorem orbicularis.

320, Mvs-

a) Santorinus longe plures numerat, qua de re vid. pag. seq. *b)* v. Cant. Tab. I. & Santorin. Tab. I. *c)* negat hoc Santorin^o: sed non solum nuperrime hoc ita observavi; verum & Cowperus, Douglas, Cantius mecum consentiunt.

320. MUSCULI NASI, tria paria numerari possunt : a)

[*Dilatatores*, (qui & simul elevant) magnopere variant, ut plurimum tamen utrinque duo sunt, quamvis saepe valde sint tenues ; ut

[*Pyramidalis*, qui oritur a radice nasi, & continuus plerumque est frontali : in latere nasi paululum sensim in tenuem membranam expansus descendit, & inseritur alæ nasi, fibrasque subinde usque in labrum superius demittit. b)

[*Myrtiformis* five *Dilatator* stricte sic dictus, oritur prope incisivum labii superioris, cuius sæpissime pars est, & inseritur partim alæ nasi, partim labro superiori.

[*Constrictor orbicularis*, ut in bestiis variis, in homine non adest : sed exiguus a *Cowpero* primum descriptus c), & ab *Eustachio* quoque delineatus d), oritur supra dentes incisores maxillæ superioris, & definit in alas nasi. Hunc duplicem esse vult *Santorinus* e), quod quandoque etiam observavi, eiusque actioni multum succurrit orbicularis labrorum. Confer. hic laudata *Waltheri* tenerior. musculor. Anatome.

M 2

321. Mus-

a) *Santorinus* naso, labris aliisque faciei partibus, longe plures, eosque novos, a se primum descriptos musculos, ac speciatim *naso octo paria* tribuit, eaque omnia Tab. sua I. delineat. Horum vero & labrorum plerosque, si non omnes, quos præter hos, a nobis descriptos, indicat, vel prorsus non observare potui, vel quandoque & raro tantum unum alterumve adesse vidi ; vel vix membranulas aut fibras musculares referunt : musculi enim faciei tantopere variant, testibus *Cowpero*, *Morgagno*, *Cantio* & quotidiana experientia, ut, si centum secabis facies, semper aliquam differentiam inveneris : idque in causa esse puto, quod optimorum auctorum de his musculis figuræ, ut *Cowperi* in utraque *Myotomiæ* editione, *Eustachii*, *Cbeseldenii*, *Cantii*, *Santorini* &c. valde discrepent ; quam vero discrepantiam non tam errori, quam diversitati obiectorum adseribo ; qua fit, ut de iis, a me non descriptis, nihil certi aut perpetui affirmari possit ; atque ab hac varietate ingenti musculorum faciei *Morgagnus* Adv. II. 28. & *Cowperus* facierum quoque varietatem rectissime deducunt. Inprimis vero nonnullos auris, nasi & faciei novos musculos tam tenues & exiguos esse ipse fatetur *Santorinus*, ut vix nisi in robustissimis videri possint, fateorque, me plerosque, summo licet studio indagatos, ut veros musculos deprehendere non potuisse.

b) vid *Drak.* Tab. XVII. & *Cowperi* *Myotom.* in fol. Tab. XXV.

c) in *Myotomia* in 8. d) Tab. XLI. fig. 1. e) observ. anat. p. 21.

321. MUSCVLI MAXILLAE INFERIORIS, sunt sex paria,
Depressorum, duo paria, ut

Platysma myoides: quod oritur circa claviculam; a musculo pectorali ac deltoide, imo etiam, ut *Galenus* & *Cowperus* notarunt, a vertebriis colli: & inseritur maxillae inferiori: ita tamen, ut fibras plerumque ad labras & genas, imo ad aures saepius emittat, & sic horum motui succurrat.

Biventer sive *Digastricus*: origo, incisura sub processu mastoideo: tendo vero saepe transit musculum stylo-hyoideum, & annulum membranaeum, ossi hyoidi iunctum, tanquam trochleam, atque inseritur internae synchondrosi menti: huius vero trochleae beneficio mirabili artificio os aperitur. a)

Elevatorum quatuor paria:

Crotaphites, sive *Temporalis*: origo, tota regio temporum: ac speciatim os frontis, sincipitis, temporum & sphenoides; transit sub iugo, & inseritur processui acuto maxillae.

Masseter: origo, pars inferior & interior iugi; finis, anguli maxillae superficies externa. Super hunc musculum transit ductus Stenonianus.

Pterygoides internus: origo, cavitas processus pterygoidei; finis, superficies interior & inferior anguli maxillae.

Pterygoides externus: origo, lamina exterior dicti processus & pars vicina ossis sphenoidis; finis, mox supra prioris insertionem. b)

322. Os-

a) vid. Differtat. nostra de Masticatione. b) a pterygoideis & masseteribus musculis maxilla etiam ad latera, itemque antrorsum & retrorsum movetur, eisque stridor dentium excitatur; qui motus in manducando valde utiles sunt. Conf. *Cowper*, *Myot. nov.* Tab. 31.

322. OSSIS HYOIDIS quinque sunt musculorum paria,

Mylo-hyoides: oritur amplo, sed tenui principio a basi maxillæ inferioris; finis, basis ossis hyoidis.

Coraco-hyoides: oritur iuxta processum coracoideum, e costa superiori scapulæ *a*); atque inseritur basi & cornu ossis hyoidis.

Genio-hyoides: oritur in medio menti, supra mylo-hyoideum, iuxta synchondrosin maxillæ; finis, in basi hyoidis.

Sterno-hyoides: oritur modo a sterno & clavicula, modo a solo sterno, modo a sola clavicula *b*); & inseritur basi hyoidis: estque præcedentis antagonista.

Stylo-hyoides: origo, processus styloides; finis, cornu & basis: perforaturque sæpe a digastrico maxillæ.

Horum usus, ex situs consideratione, facile patent.

Conf. figuræ *Cowperi* Tab. XXVII.

323. MUSCULI LINGVÆ quatuor sunt paria *c*): quorum

1. *Genio-glossus*: oritur supra genio-hyoideum a mento, ingreditur medium linguæ, eamque movet antrorsum.

2. *Stylo-glossus*: a processus styloidei apice proveniens, descendit oblique in radicem & latus linguæ, eamque ad latera & retrorsum, ac sursum movet.

3. *Cerato-glossus*: oritur a cornu ossis hyoidis, & inseritur radici linguæ.

4. *Basio-glossus*, a basi ossis hyoidis, per medium linguæ versus apicem excurrit, & una cum præcedenti linguam retrahit ac breviorē facit.

Mylo-glossus quorundam, est pars *Mylo-hyoidei*; hinc non opus est peculiarem inde formare muscolum. Sæpius, ut observavi, quoque non linguæ, sed tantum musculo genio-hyoideo inferebatur.

M 3

324. LA-

a) *Cowper*. Myotom. & *Morgagn*. Advers. I. Tab. I. T. *b*) *Cowperus* e sola clavicula eum oriri contendit; *Santorinus* vero e solo sterno: Ego triplicem illam diversitatem vidi. *c*) optima eorum delineatio ap. *Cowper*. Myotom. Nova Tab. XXVIII, fig. 1.

324. LARYNGIS Musculi, septem vulgo numerantur paria, ab origine & fine nomina recipientia: qui omnes glottidis & vocis variationi maxime inserviunt. a)

- { Communia, II: extra laryngem ortum habentia,
 - { Sterno-thyroides, deorsum trahit laryngem, & glottidem simul dilatat. b)
 - { Hyo-thyroides, elevat laryngem, & glottidem arctat. c)
- { Propria, V: in larynge originem & finem habentia:
 - { Crico-thyroides, & dilatare & constringere videtur. d)
 - { Crico-arytænoides posticum, { glottidem dilatant.
 - { Crico-arytænoides laterale, {
 - { Thyro-arytænoides, una cum sequenti constringit.
 - { Ary-arytænoides: oritur sæpe ab una arytænoide cartilagine, & inseritur in alteram: se invicem interfecant & glottidem stringunt e); sæpe unicus tantum est musculus f); sæpe alio modo se habet. g)

EPIGLOTTIDI hucusque tantum in brutis concedebantur musculi b): licet a *Iac. Sylvio* duo attollentes totidemque deprimentes indicati erant. i) Iam vero ab aliquo tempore homini restituantur, & primum, quantum memini, a *I. G. Paulik*), qui eos se vidisse testatur, rursus describuntur.

- { attollentes, duo: satis longi, a basi ossis hyoidis ad posticam epiglottidis radicem protensi, quos *hyo-epiglottæos* vocat.
- { deprimentes, duo, minores, ab arytænoidearum cartilaginum apicibus oblique & anteriùs ad epiglottidis latera delati, *ary-epiglottæi* dicendi. l)

325. PHA-

a) *Santorinus* plures adhuc describit Cap. VI. & Tab. III. fig. 1 & 2 delineat: eos vero non nisi in aptis observari scribit cadaveribus. Sed hos invenire nondum potui. b) *Cowper*. Myot. nov. p. 45. c) *Santorin*. p. 103. d) ibid. 102. e) vid. delineati in *Morgagn*. Advers. I. Tab. II. fig. 1. k. f) ibid. p. 38. & *Cowper*. p. 46. g) *Morgagn*. ibid. & *Santorin*. p. 104. h) vid. *Fabric*. ab *Aquap.* & *Casseri* de vocis organ. i) in *Isag. anat.* cap. VII. de musc. k) in *Præf. ad Horn.* opusc. l) *Littrius* in *Hist. Acad. Reg. A.* 1718. epiglottidi tres musculos adscribit, duos deprimentes, & unum attollentem; sed eos non describit. *Santorinus* vero non solum unum attollentem, (cuius haud leve vestigium nuper quoque observavi, & Tab. VIII, fig. 34. k. adumbravi) verum quatuor quoque depressores, ut duos *ary-epiglottidaos*, & duos *thyro-epiglottidaos maiores*; duosque *thyro-epiglottidaos minores*, pro media, ut existimat, epiglottidis parte inclinanda, describit: qui vero, ut ipse affirmat, tam tenues sunt, præsertim ultimi, ut vix, nisi in robustissimis cadaveribus, videri queant: & propterea etiam eorum loco hucusque nil, nisi membranulas, observare potui: eos tamen interea pro ulteriori inquisitione hic indicare volui. Conf. eius Cap. VI. & figuræ antea citatæ, itemque quæ *Morgagnius* de his habet *Advers. l. N.* 28.

325. PHARYNGIS musculi a) eum vel

{ Dilatant, quorum sex numeramus paria : ut

{ *Stylopharyngeum*, quod a principio processus styloidis oritur, & in eius thyroidisque latus utrinque inferitur. (Hoc & sequens par etiam attollunt.)

{ *Cephalo-pharyngeum*, prodit ab apophysi anteriori ossis occipitis, & definit in partem illius posteriorem. b)

{ *Pterygo-pharyngeum*, a processibus pterygoideis. c)

{ *Salpingo-pharyngeum*, a tuba *Eustachii*. d)

{ *Mylo-pharyngeum*, a maxilla inferiori, pone ultimum dentem molarem, tonsillas maxime complectens. e)

{ *Glosso-pharyngeum*, a lingua; qui omnes in partem posteriorem, ubi linea tendinea sæpe conspicitur, f) terminantur.

{ *Constringant*, unum, *œsophageus*, sive *sphincter gulæ*, vulgo dictum: quod utrinque oritur ab osse hyoide, cartilagine thyroidea & cricoidea laryngis, atque gulæ partem posteriorem ambit. Ob multiplicem vero hanc originem illud in tria paria dividit *Valsalva* g); *Douglas* vero, *Cantius* & *Santorinus* h) adhuc in plura; quibus ab origine & fine nomina imponunt; ut *Hyo-pharyngeum*, *Thyro-pharyngeum*, *Crico-pharyngeum* &c. Quoniam vero fibræ earum intime ut plurimum connexæ sunt, ut sine difficultate dividi nequeant, & raro tales divisiones, quales *Valsalva* pingit, quæ eas distinguerent, clare perspiciuntur, entia præter necessitatem, ut etiam *Cowperus* hic sentit i), multiplicare nolui, sed has partes sub unius *sphincteris* sive *œsophagæi* nomine comprehendere malui.

Vaginalis gulæ Cowperi k) iam nomine tunicæ musculosæ œsophagi (§. 250.) descriptus est.

M 4

326. Mvs-

a) vid. figuras in *Cantii* Tab. 3. & *Cowper* Myotom. nova Tab. 28. & 29.

b) ibid. & *Douglas* Myograph. 41. Hoc par *azygos* appellat *Santorin.* p. 121. Negat hanc originem *Valsalva*: verum hi omnes & ego eam observavimus. c) *Morgagn.* Adv. I. p. 4. II. p. 43. & modo citati.

d) *Douglas*, p. 42. *Cant.* p. 12. & *Santor.* p. 122. e) *Douglas* & *Cant.* ibid. *Santorinus* putat, præcedens & hoc a nullo nunquam indicatum esse; delineatum tamen etiam reperitur in *Cowperi* figuris laudatis. f) Hanc lineam negat *Santorinus* p. 128. verum *Morgagnus* Adv. II. 44. & *Cant.* p. 12. eam modo adesse modo abesse recte observant, ipseque pharyngem asservo, in quo adest. g) de aure hum. h) locis cit. i) l. c. p. 145. k) Tab. 28. 29.

326. MUSCULI VVAE five VVVLAE, (quæ cum velo palatino pars est pharyngis) sex sunt paria & unum sine pari.
1. *Glossio-staphilinum a)* five *glossio-palatino*, oritur utrinque e radice linguæ, ascendit versus palatum & definit in velû.
 2. *Pharyngo-staphilinum*, utrinque e lateribus pharyngis provenit, & finitur in eodem palati velo. *b)*
 3. *Thyro-staphilinum*, emergit ex laterali parte cartilaginis thyroididis, ascendendo versus uvam latius fit, & lateri veli palatini, arcus in modum, inseritur.
 4. *Spheno-staphilinum* vulgo *Cowpero*, *Cantio* aliisque, sed rectius *Salpingo-staphilinum c)*: quia ultimis inquisitionibus inveni, illud non, aut vix ab osse sphenoide, sed potissimum a tubæ parte posteriori, & quidem partim ex parte eius membranacea, partim ex ossea oriri *d)*; oblique inde ad uvam descendit, eiusque parti posteriori inseritur, hinc eam, si ambo agunt, retrahunt.
 5. *Pterygo-staphilinum f)*, oritur a parte suprema processus pterygoidei, & anteriori tubæ, huic vicina: descendit inter utramque illius lamellam, tendinemque super apophysi tenui lamellæ interioris, quasi per trochleam, ad anteriorem membranæ palatinæ, cui inseritur *g)*, partem reflectit: unde ab hoc pari deorsum & antrorsum movetur. A *Valsalva* musculus *novus tube* (quamvis diu iam fuerit cognitus) vocatur, qui tubam ab eo dilatari existimat. *b)* Vid. plura de hoc infra in explicatione figuræ 38.
 6. *Palato-staphilinum*, oritur utrinque ad iuncturam ossium palati, principio latiori, & coniunctum cum socio sensim fit angustius, ac triangulum repræsentat, qui descendendo uvæ parti superiori inseritur: eamque sursum & antrorsum trahere videtur. *i)*
 7. *Azygos Morgagni k)* a tergo paris præcedentis collocatus, oriri videtur tendineus ex iunctura ossium palati, & carneus, sed tenuis & teres, per medium uvulæ extenditur *l)*, quod cum glandulis & membrana oris ipsam uvulam constituit. *m)*

327. CA-

a) *Valsalv.* de aure Cap. II. *b)* *ibid.* *c)* cum *Valsalva* *ibid.* *d)* forte tamen hoc principium, ut in multis aliis, quandoque variat. *e)* *vid.* *Cowper.* Tab. 28. fig. 4. & Tab. nostra. VIII. fig. 38. *f)* *ibid.* *g)* *Cant.* Tab. 3. fig. 2. & Tab. nostra VIII. fig. 38. *h)* *Tr. de aure.* *i)* huius & *thyro-staphilini* inventionem *Douglas Myogr.* pag. xxxv. sibi adscribit; cum tamen iam antea publicati erant a *Morgagn.* Adv. l. n. 8: nomina tamen *Douglasius* primus ipsis imposuit. *k)* *ibid.* *l)* *Cant.* l. c. & Tab. nostr. VIII. fig. 38. *m)* *Conf.* de his & pharyngis *Santorini* Cap. VII, & Nota (72*)

327. CAPITIS musculi, sunt decem paria :

Flexorum, tria paria, utrinque unus. a)

Mastoidens : oritur a sternone atque clavicula : & finitur in processus mastoidei facie externa.

Rectus maior anticus : oritur a 5 inferiorum colli vertebrarum apophysibus transversis, & inseritur ossi occipitis, ante eius processum condyloideum.

Rectus minor anticus, s. *annuens Cowperi* b) : origo, facies anterior primæ vertebræ s. atlantis, latet sub præcedenti, & mox post eum inseritur ossi occipitis.

Extensorum, præter communes colli, quinque paria :

Splenius : oritur a vertebra tribus inferioribus colli, & quinque superioribus dorsi apophysibus imprimis spinosis, inseriturque supra processum mastoideum.

Complexus : origo, apophyses transversæ trium vertebrarum superiorum dorsi, & 6 inferiorum colli : priori subiectus, inseritur ossi occipitis iuxta præcedentem.

Rectus maior posticus : origo, apophysis spinosa epistrophæi ; finis, os occipitis.

Rectus minor posticus : origo pars posterior atlantis ; finis, sub præcedenti.

Obliquus minor : origo, apophysis transversa atlantis ; finis, supra rectum maiorem.

Rotatorum, *Obliquus maior* : origo, apophysis spinosa epistrophæi, sive vertebræ secundæ ; oblique ascendens inseritur apophysi transversæ atlantis. c)

Ad latus flectentium, *Rectus lateralis* d) : origo, facies superior apophysis transversæ atlantis ; ascendit recta, corpore brevi, sed crasso, & inseritur partim ossi occipitis, partim ossi temporum, iuxta incisuram processus mastoidei.

M 5

328. COL-

a) Flexionem capitis multum iuvat, imo sæpe solum efficit pondus capitis. huiusque singularis cum prima vertebra articulatio, quando erecti sumus, musculis fere quiescentibus. *Winslow Hist. A. R. 1720.* b) *Cowper. Myotom fig. Ill. lit. i. & Myot. nov. Tab. 24.* c) Hic musculus proprie non est musculus capitis, quia caput non attingit ; sed musculus atlantis : oritur enim ex secunda, & inseritur primæ vertebræ. d) *Cowper. l. c. k.*

328. COLLI musculorum sunt

Flexorum, duo paria: ut

Scalenus: qui oritur a prima, secunda, & quandoque tertia costa, & inseritur in apophyses transversas vertebrarum colli. A *Fallopio*, aliisque, ad thoracis quoque elevatores refertur, nec sine ratione: nam utrique usui inservire potest. Angli ex hoc tres scalenos conficiunt, sub nomine *Scaleni primi, secundi & tertii*; quia sæpe in tres partes dividi potest.

Longus: oritur a corpore superiorum quinque vertebrarum dorsi, & inseritur omnibus vertebrae colli.

Extensorum, duo quoque paria vulgo numerantur,

Transversale & Spinale dictum a), quæ vero immerito ab extensore communi dorsi & lumborum, *Longissimo dorsi* dicto, cuius revera pars sunt, distinguuntur: de quo vero mox infra. His autem addit *Cowperus* b)

Interspinales colli, inter apophyses spinosas siti, paria quinque: qui oriuntur a parte superiori apophysis spinosæ vertebrarum quinque inferiorum colli, & quodlibet inseritur in inferiorem partem apophysis spinosæ vertebræ vicinæ superioris.

Ad latus flectentium,

Intertransversales, qui inter apophyses transversas siti, oriuntur ex inferiori, & inseruntur vicinæ superiori vertebræ. c)

Intervertebrales Douglassii d), valde exigui, & incerti numeri, oriuntur ex corporis vertebræ parte laterali, & oblique ascendunt ad partem posteriorem vicinæ superioris.

329. SCA-

a) *Cowper*. Myotom. fig. VIII, i. & k. b) *ibid.* LL. & Myotom. nova Tab. 44. c) *Transact. Anglic.* vol. 21. p. 132. & *Cowper*. Myotom. Tab. 44. d) *Myograph.* p. 85.

329. SCAPULAE muscoli, nobis sunt quinque paria:

Elevator, five *musculus patientiæ*: oritur ab apophysibus transversis 1, 2, 3. & 4 vertebræ colli, & finitur in angulo superiori scapulæ.

Trapezius, five *cucullaris*: origo, os occipitis, apophyses spinosæ colli, & 7 vel 8 dorsi a); finis, spina scapulæ, acromion & clavicula. Ob diversum vero fibrarum cursum, pro diversa earum actione, scapulam attollere, deprimere & retrorsum movere potest. b)

Rhomboides: origo, apophyses spinosæ inferiores 5 colli, & superiores 3 dorsi, sub musculo præcedenti: sub quo deinde oblique pergit, & inseritur toti basi scapulæ: quam retrorsum & fursum movet.

Serratus, five *dentatus minor anticus*, five *pectoralis minor*: oritur sub pectorali maiore, principiis dentatis, a 2, 3 & 4. costa vera; ascendit sub eodem oblique versus scapulam, & inseritur processui coracoideo scapulæ.

Serratus, five *dentatus maior anticus*: oritur quoque dentatis principiis, ab inferioribus sex costis veris, & una vel quandoque duabus superioribus spuriis c); oblique ascendit, ac definit in basi scapulæ. Hi duo scapulam movent antrosum & deorsum: & quia a multis ad elevatores quoque costarum referuntur, hi principium vocant, quod nos finem. d) Hunc vero usum præstare possunt, quando scapula ab elevatore, trapezio & rhomboide musculo firmatur, & immobilis retinetur.

330. RE-

a) Douglas originem ad vertebam usque decimam extendit, Myograph. p. 69.

b) Cheselden. negat diversas has actiones, nullumque musculum in una parte, quiescente reliqua, agere posse, contendit, eumque tantum scapulis retrahendis, five ad se invicem adducendis, inservire iudicat. contra Winslous eum potissimum scapulam elevare censet, Hist. Acad. Reg. A. 1719. ubi & serratum maiorem curatius exponit.

c) Principia dentata inferiora duo vel tria cum musculis obliquis externis abdominis coeunt.

d) Douglas Myographia p. 73. & 74.

330. RESPIRATIONIS musculi, thoracem vel dilatant, vel constringunt.

Dilatatores, coniunctim agunt, suntque

Diaphragma, de quo iam actum §. 257.

Intercostales, quadraginta quatuor, in quovis interstitio costarum duplex, externus & internus: quorum origo est margo inferior costæ superioris; finis vero, margo superior costæ sequentis. Fibrae externorum, antrorsum; internorum, oblique retrorsum excurrunt, costasque elevant. Conf. Not. 73.*).

Levator costarum Stenonis. *Supercostales* Verheyeno, a)

Breves, utrinque duodecim: origo, processus transversi vertebrarum undecim dorfi, & unius, inferioris scilicet, colli: inferuntur oblique in partem posteriorem costarum.

Longi, tres vel quatuor: origo, eadem, a vertebra 7, 8, 9 & 10; finis, in costa 9, 10, 11 & 12. b)

Subclavius: oritur ab inferiori parte claviculae, iuxta acromion, & finitur in costæ superioris parte anteriori & sterno.

Serratus posticus superior: oritur tenui, at lato tendine, a vertebris duabus inferioribus colli, & duabus superioribus dorfi; finitur in costa 2, 3 & 4. c)

Serratus maior anticus, (pag. præced.) a plerisque etiam huc refertur: sed quia scapula costis mobilior, me iudice rectius ad scapulam pertinet. Interea tamen, elevando costas, præsertim in difficili respiratione, eum quoque inservire posse, non negamus.

Scalenus colli, de quo iam supra, p. 173.

Constrictores, sive depressores, præter musculos abdominis, hunc scopo inservientes, sunt

Serratus posticus inferior: oritur lato tendine a vertebris tribus inferioribus dorfi, & duabus superioribus lumborum; finitur in costis quatuor inferioribus spuriis: ambitque extensores dorfi, ut vagina, ne fibrae earum in magnis motibus a se invicem facile recedant,

Triangularis sterni: oritur ab inferiore & interiori sterni parte, & inferitur utrinque in cartilagine costæ 4, 5, 6 & 7. veræ. Verheyenus hunc in plures dividit, eosque *Sterno-costales* appellat. d) A quibusdam immerito negatur: quia plerumque facile reperitur.

Intracostales Verheyeni, pleura detracta conspicui, 6, 7, 8 vel 9 utrinque; oriuntur haud procul a capitulis costarum, ascendunt oblique, ac desinunt in costa superiori, nunc proxima, nunc altera. e) Hos musculos ab Eustachio iam delineatos fuisse, Morgagnius indicat. f)

Extensor lumborum & dorfi communis, §. 331. quoque concurrit ad costas deprimendas: quia ab osse sacro originem trahit, & multiplici tendine posteriori costarum parti inferitur. g) Morgagnus etiam tendines huius musculi indicat, quibus munus costas elevandi adscribit. b)

331. DOR-

a) Anatom. Tab. XXXV. fig. 1. ee, ff. Hos musculos iam Casserio & Stenoni notos fuisse ostendit Morgagn. Adv. II. 36. b) Verheyen. ibid. fig. 1. ff. c) forte hic musculus etiam collum extendit, musculisque colli & dorfi locoligamenti inservit. d) l. c. fig. 2. abcde. e) ibid. fig. 3. dd, ee. f) Advers. Anat. II. p. 36. Vid. Mangetti Theatr. anat. Tab. Eustach. XVI. fig. 2. g) Verheyen. fig. 1. bb. h) Adv. II. p. 38.

331. DORSI & LUMBORVM musculi maximam partem sunt communes: iique vel

Extensores, quorum vulgo tres utrinque numerantur: ut

Sacrolumbaris: cuius origo, os sacrum & spina posterior ilei; finis, in costarum parte posteriore.

Longissimus dorsi: origo, ibidem; finis, partim in omnibus vertebrae spinæ dorsi, & nominatim in apophysibus earum transversis; partim in costis. a)

Semispinosus: origo, os sacrum & lumborum vertebræ; finis, in superioribus vertebrae thoracis, apophysibus præsertim spinosis. Sed quia hi tres ita inter se cohærent, ut sine laceratione toti separari aut dividi raro vel nunquam possint, atque in eandem actionem conspirant, rectius pro uno *Extensore communi lumborum, dorsi & colli* habentur. b)
Si in uno latere tantum agunt, dorsum oblique ad latus trahunt.

Flexores, præter musculos abdominis, flexioni tam antrosum, quam ad latus inservientes,

Quadratus lumborum, cuius origo in anteriori & superiori parte posterioris ossis ilei processus; finis in apophysibus transversis vertebrarum lumborum, ultima thoracis vertebra, & costa ultima.

Psoas parvus, qui oritur tendine tenui ex osse pubis, ubi ileo iungitur, & inseritur lateri vertebræ supremæ lumborum. c)

Intertransversales lumborum exigui a Douglas describuntur, qui inter transversas lumborum apophyses siti, oriuntur ex ora unius, & inseruntur in vicinam, moventque ad latus. d)

332. BRA-

a) Morgagn. Adv. II. p. 38. b) Hos musculos alternatim quoque agere, dum incedimus, elevando ossa innominata, percipi posse applicatione manuum ad lumbos, indicat Cheselden Anat. p. 73. c) Hic musculus sæpe deficit; quando vero adest, cum quadrato etiam ad elevanda ossa innominata, præsertim, quando decumbimus, inservit, eiusque inventionem Riolano adscribit Douglas Myograph. p. 90. d) ibid. p. 91.

332. BRACHII vel HUMERI musculi sunt novem.

[Elevatores, tres: a)

{ *Deltoides* : oritur a clavicula, acromio & spina scapulæ; finitur ad latitudinem quatuor digitorum sub collo humeri.

{ *Supraspinatus* : origo, cavitas supra spinam scapulæ; finis, collum humeri.

{ *Coraco-brachialis* : origo, processus coracoides scapulæ; finis, pars media brachii.

Depressores, tres: (quos pondus brachii iuvat)

{ *Infrascapularis* : origo, tota facies interna scapulæ; finis, pars interior capitis humeri.

{ *Rotundus*, sive *Teres maior* : origo angulus inferior scapulæ; finis, tres digitos infra caput humeri.

{ *Latissimus dorsi*, *Aniscalpter* quoque dictus; origo, pars posterior spinæ ilei, spinæ superiores ossis sacri, omnes apophyses spinosæ lumborum, & septem inferiores dorsi, iungit tendinem cum priori, & eodem loco inseritur.

Adductor, unus, *Pectoralis maior* : origo, clavicula, sternum, & omnes costæ veræ; finis, ad latitudinem 4 digitorum infra caput humeri. Huius actionem a coraco-brachiali musculo, & deltoidis actionem, a parte suprema huius pectoralis, (quæ plerumque distinctus quasi musculus est) iuvari existimamus.

[**Abductores**, duo:

{ *Infraspinatus* : origo, cavitas infra spinam scapulæ.

{ *Rotundus*, sive *Teres minor* : origo, costa inferior scapulæ. Hi duo proprie unicum constituunt musculum: atque etiam tantum unum conficiunt tendinem, qui inseritur pari posteriori.

333. Cvr

a) His succurrunt adductores & abductores, ut demonstravit Winslow Hist, Acad. Reg. A. 1720.

333. CUBITI musculi sunt VI.

[Flexores, duo :

[*Biceps* : qui oritur tendineus, altero capite, eoq; latiori, a processu coracoideo ; altero, tereti & longo, a parte superiori acetabuli scapulæ. Hoc in sulco humeri sub ligamento articuli descendit, fit carneum, iungitur cum priori, pergit iuxta insertionem deltoidis, in anteriori brachii parte, & desinit partim tendine tereti in radii tuberculo, mox infra capitulum eius superius ; partim, tendine lato, in membranam communem, musculos in cubito sitos cingentem : qui tendo in venæ sectione læsus, gravia sæpe symptomata inducit. a)

[*Brachialis internus* : oritur, mox infra finem deltoidis, & inseritur ulnæ tuberculo, mox infra capitulum eius superius.

[Extensores, quatuor :

[*Longus* : oritur a costa inferiore scapulæ.

[*Brevis* : oritur a spina externa humeri.

[*Brachialis externus* : oritur iuxta præcedentem a spina interiori humeri. Hi tres musculi tendines adunant, & quasi unum tricipitem conficiunt, qui parti posteriori olecrani inseritur, & *Triceps brachialis* commode vocari posset.

[*Anconeus* : parvus est musculus ; cuius origo, exterior est condylus humeri ; finis, mox infra præcedentes.

334. RADII, sunt quatuor :

[Pronatores, duo : { *Rotundus* : qui oritur a condylo interno humeri ; & finitur in parte fere media radii.

[{ *Quadratus* : origo, pars inferior ulnæ ; finis, e regione, in radii parte inferiori.

[Supinatores, duo : { *Longus* : principium, spina exterior humeri ; finis, capitulum inferius radii. b)

[{ *Brevis* : oritur partim a condylo externo brachii partim a parte superiori & exteriori ulnæ, & inseritur in partem superiorem radii quam totam amplectitur.

335. MA-

a) delineantur hæc eleganter a *Cowpero Myotom. nov. Tab. L.* & ab eodem describuntur p. 74. conf. & *Winslow Hist. A. R. 1720.* qui hunc musculum etiam *supinatore radii & elevatore brachii* esse ostendit.

b) Hic musculus etiam ad cubitum flectendum facere potest,

335. MANVS sive CARPI musculi sunt sex.

Flexores, tres: oriundi a condylo humeri interno: ut
Radiæus internus, qui iuxta radium pergit versus pollicem; ubi sub abductore eius transit, & abit in capitulum superius ossis metatarsi indicis.

Ulnaris internus: finitur in ossiculo carpi interno ordinis 1.
Palmaris: tendine lato, expanso, inseritur palmæ manus, quam quoque aliquo modo constringere videtur.

Extensores, quoque tres: qui omnes oriuntur a condylo humeri externo, suntque

Radiæus externus, *Longus* & *Brevis*, alias quoque *Bicornis* dictus a): quorum alter, parti exteriori ossis metacarpi primi; alter, ossis metacarpi secundi inseritur.

Ulnaris vel Cubitalis externus: definit in osse metacarpi, digitum auricularem sustinente.

Si musculi radiæi omnes simul agunt, quiescentibus ulnaribus, manus extrorsum movetur; & contra, quando duo ulnares, quiescentibus radiæis, simul agunt, trahitur manus introrsum. Coercentur quoque hi musculi prope carpum a ligamento, vulgo *annulari* dicto; quod vero ligamentum non *annulare* in sectionibus reperitur, sicut vulgo pingi solet; sed est potius membranæ communis, omnes musculos, in cubito & carpo collocatos, ob meliorem ipsorum actionem includentis pars, cui in præparationibus figura annuli datur. b) In dorso carpi robustius est, & fibræ annulares in eo deprehenduntur.

336. PALMAE manus alias duo constrictores adscribuntur, quorum primus est *Palmaris*, iam inter flexores manus, cui magis, quam palmæ, inservit, descriptus. Alter *caro quadrata*, sive *palmaris brevis*, vulgo appellatur; qui, ut parva massa carnea, variis sæpe tendinibus distincta, aponeurosi palmaris longi, super musculo abductore auricularis, inhæret, volamque eo constringi volunt. Vtrumque hunc palmarem & ego & alii sæpius deficere observavimus.

337. DIGI-

a) quandoque *tricornem* reperi. b) vid. *Vesalii Musculor.* Tab. 1. & 2.

337. DIGITORVM MANVS musculi sunt vel *communes*, vel *proprii*:

Communes sunt ut plurimum tredecim: ut

Flexores phalangæ

primæ, Lumbricales IV: qui oriuntur a tendinibus profundis, unico plerumque principio, & inferuntur lateribus, pollicem respicientibus, phalangæ primæ, IV. digitorum. N. (74*)

secundæ, sublimis seu Perforatus: provenit a condylo humeri interno, & radio; dividitur in IV. tendines, qui inferuntur phalangæ secundæ quatuor digitorum. (74*)

tertiæ, Profundus sive Perforans: cuius origo, pars superior & media ulnæ, in quatuor quoque tendines divisus, perforat tendines præcedentis, & definit in initium phalangæ tertię, quatuor digitorum. a)

Extensor omnium trium phalangerum, Extensor communis dicitur: cuius origo est condylus externus humeri, ac pars posterior radii & ulnæ; dividitur deinde in quatuor tendines, sub ligamento annulari & transverso carpi transeuntes: quorum finis est, facies posterior sive gibba omnium trium phalangerum.

Interossei sex sunt, tres externi, tres interni: Conf. Tab. IX.

Externi tria interstitia inter ossa metacarpi in dorso manus occupant, (attamen & in vola videndi) & quilibet utrinque a vicinis ossibus metacarpi oritur: quorum vero primus inferitur in externum latus digiti medii; alter, in eiusdem latus internum; tertius, in latus externum auricularis.

Interni, in vola manus solum conspicui, ossibus metacarpi non interponuntur, ut externi, sed superponuntur: omnes vero oriuntur a parte ossis metacarpi, cui incumbunt, carpo vicina, & primus lateri interno indicis, alter lateri externo annularis, tertius lateri externo auricularis committitur. b)

N

338. POL-

a) Hi duo musculi sub ligamento transverso carpi transeunt, eorumque tendines, vagina forti membranacea inclusi, firmiter iunguntur ossibus digitorum, ne flexionis tempore recedant.

b) Plura de his vid. N. (75*).

338. POLLICIS proprii V:

Flexor: origo, pars media radii; progreditur sub ligamento carpi, & definit in tertia phalanga.

Extensor, Bicornis vel Tricornis dictus: oritur in parte posteriore & media ulnæ ac radii, & definit, duobus vel tribus tendinibus, in 1, 2. & 3. phalanga.

Thenar sive *Abductor*: cuius origo est ligamentum transversum, ossa carpi coniungens & os carpi pollicem sustinens; finis vero, phalanga 1. & 2. In tendine huius & sequentium duorum musculorum hære solent *duo ossa sesamoidea* pollicis, & speciatim in huius, externum. a)

Hypothenar: oritur iuxta præcedentem, ab eodem ligamento & osse, magis volam versus, & definit in os sesamoideum externum & capitulum inferius phalangæ primæ, quam flectit. A multis omittitur, quia pars præcedentis haberi solet.

Antithenar, sive Abductor: oritur ab osse metacarpi digiti indicis ac medii, & inseritur phalangæ 1. & 2. continetque os sesamoideum internum. b)

339. INDI-

a) Quandoque tendinem dat extensori pollicis. b) Notandum, quod in musculis pollicis æque ac aliorum digitorum sæpe variationes occurrant, ita, ut nulla eorum descriptio dari possit, quæ cum omnibus subiectis conveniat: *Extensor* enim pollicis modo *bicornis*, modo *tricornis* est: subinde *Flexores* duo reperiuntur, ut *Covvperus* in *Myotom.* notavit pag. 216. atque sic etiam variationes in aliis digitis observantur. conf. *Morgagn.* Adv. II. 40.

339. INDICIS tres sunt proprii.

- 1. *Extensor*, seu *Indicator*: cuius principium est media ulna, & finis idem cum extensore communi.
- 2. *Adductor*: origo, phalanga prima pollicis, & os primum metacarpi; finis, phalangæ primæ indicis latus externum a)
- 3. *Abductor* proprius, revera est interosseus internus primus, Tab. IX. fig. 11. D. qui, ut §. 337. dictum est, oritur ab osse metacarpi indicem sustentante, & definit in externum indicis latus.

340. DIGITI MEDII proprii, duo sunt, adductor & abductor:

- 1. *Adductor*: est interosseus externus primus A;
- 2. *Abductor*, interosseus externus secundus B, fig. 1. & 11. quorum descriptio vid. §. 337.

DIGITI ANNULARIS proprii itidem duo:

- 1. *Adductor*: qui est interosseus internus E. fig. 11.
- 2. *Abductor*, interosseus externus C. fig. 1. & 11. quorum origo & insertio quoque vid. §. 337.

DIGITI AURICULARIS proprii tres sunt:

- 1. *Extensor* proprius, videtur pars extensoris communis, cum quo etiam origine & fine fere convenit.
- 2. *Abductor*: cuius origo, os interius metacarpi & carpi; finis, latus internum phalangæ primæ b)
- 3. *Adductor*: oritur a ligamento carpi transverso & ossiculi interioris carpi acuto processu, atque toti interiori ac concavæ parti ossis metacarpi digiti auricularis se inserit, hocque adducendo simul digitum auricularem adducit: adeoque huc referri potest. c)

N 2

341. Rever-

a) In tendine huius Musculi, ubi transit capitulum ossis metacarpi, digitum hunc sustentantis, aliquando ossiculum sesamoideum observavi. b) In hoc musculo frequenter reperitur ossiculum sesamoideum, Tab. I. fig. 5. lit. c. a nobis delineatum. c) confer. Winslow Hist. Acad. Reg. A. 1720.

341. Revertimur iam *a brachiis ad abdomen*, ut musculos ad hoc pertinentes adhuc describamus, & deinde ab his ad *pedes* progrediemur.

342. De ABDOMINIS MUSCULIS iam §. 205, & de Clitoridis, §. 234 actum est; sed restant adhuc muscoli *testicularum*, *penis*, *urethrae*, *ani*, *vesicae* & *vaginae uteri* describendi.

343. MUSCULVS TESTICVLI, *Cremaster*, sive *Elevator* dictus, est tenuis series fibrarum muscularium, quæ oriuntur modo a musculo oblique ascendente abdominis, iuxta locum illum, ubi a vasis spermaticis perforatur; modo a transverso *a*), modo ex ipsa spina ilei. *b*) Inde cum processu peritonæi, cui firmiter iunguntur, in scrotum descendunt, atque super tunicam vaginalem, quæ testem includit, expanduntur. Quando hæc constringuntur, testem elevant. In emaciatis corporibus sæpe adeo tenues sunt, ut difficulter in conspectum prodeant.

344. PENIS MUSCULI, proprie tantum sunt duo, *ERECTORES* scilicet, qui utrinque oriuntur ab ossibus ischii, inter huius tuberculum, ac initium corporis cavernosi, & quilibet lato tendine in corpus cavernosum sui lateris inferitur. *c*) Qui, dum simul agunt, premunt venas dorsii penis contra ossa pubis, refluxum sanguinis ex pene impediunt, atque sic, quando sanguis fervidus, & quasi ebulliens, in affectu venereo per arterias copiose influit, eius erectionem efficiunt. *d*) *Acceleratores* vero musculi atque *Transversales* dicti, quia proprie non ad penem, sed ad urethram pertinent: eos iam sub urethræ musculis describemus.

345. VRE-

a) Santorin. obs. cap. IX. 1. *b*) vid. huius delineatio in in Cowperi Myotomia nova Tab. XVII. *c*) ibidem Tab. XVII. & XIX. *d*) Schelhamerus negat hunc effectum, in Analect. Anat. diss. XII. Cheselden vero de eo solum dubitat, in Anatom. edit. tertia & Waltherus quoque aliter sentit. Tener. musculor. Anatom. p. 17.

345. VRETHRÆ VIRILIS MUSCULI sunt vel Dilatores, ut

[*Transversi* sive *Transversales a*) : oriuntur plerumque (si adsunt) utrinque ex ossium ischii tuberculo, & inferuntur ut plurimum in bulbi urethræ partem posteriorem : quam, dum agunt, distendunt. *b*)

[*Dilatator posticus* sive *triangularis*, sæpe perquam exiguus, quandoque duplex *c*), oritur e parte antica sphincteris ani, & inferitur in partem posticam & inferiorem acceleratorum, aut bulbi urethræ. Hic musculus alias pro sphincteris ani parte a *Riolano d*) fuit habitus, ad bulbum urethræ extensa ; sed *Littrius* eum pro peculiari musculo primus agnovit atque descripsit. *e*) Videtur hic musculus *antagonista* cū *acceleratorum*, tum *erectorum penis*, dum penem ab osse pubis, post eiectionem seminis, retrahit, & sic sanguini liberum re-

Constrictores, sunt illi, ita dicti, (fluxum restituit.

ACCELERATORES urinæ : qui oriuntur partim a musculo præcedente ; partim, & præcipue utrinq; a corporibus penis nervosis : oblique pergentes ambiunt totum bulbum & inferiorem spongiosam partem urethræ ; atque in lineam, quæ ex horum concursu sæpe efficitur, bulboque adhæret, inferuntur. Hinc agendo, constringunt urethræ partem posteriorem, quo urinam ex urethra, at, præcipue in coitu, semen expellunt.

Santorinus adhuc novos urethræ proectores & elevatores ut & prostaticorum musculos describit *f*) : ubi vero præter ani levatores nil nisi membranas vidi.

N 3

346. Mus-

a) *Bartholin.* Anat. L. I. Cap. 24. *Bidloo* Anat. Tab. 47. fig. 5. I. *Comper* Myot. reform. fig. X. & XII. lit. EE. *Drak.* Anthropol. Tab VI. & VII. EE. b) Hos musculos quandoque deesse, eorumque ortum, positum, numerum & insertionem sæpe variare observavi, sicut & notarunt *Morgagn.* Adv. IV. Anim. 20. *Comper.* Myot. nov. Tab. XVII. & XIX. *Santorin.* p. 182. c) *Morgagn.* ibid. d) Cap. de musc. ani. e) *Hist. A. R.* 1700. Hunc tamen cum *Vesalio* rursus sphincteris ani partem esse contendit *Santorin.* p. 179. f) ibid. p. 181. & seq. conf. *Walther.* Tener, muscul. anat. p. 18.

346. MUSCULORVM ANI tres vulgo numerantur, unus
sphincter & duo levatores. a)

Sphincter ani, extremum intestini recti claudens, ortum trahit ex ima parte ossis coccygis & cute huic subiecta; eiusque fibræ, a se invicem discedentes, & anum utrinque ambientes, ascendunt, atque in viris in partem infimam bulbi urethræ, sive in musculos acceleratores, bulbum hunc investientes; in feminis vero in imam vaginæ uteri partem inferuntur. Multæ tamen etiam fibræ ab ossis pubis parte interiori & inferiori, prope synchondrosin utrinque descendunt, & figura quasi ovata, latitudine circiter pollicis extremum intestini recti ambiunt, illudque constringunt sive claudunt. Meræ vero circulares aut annulares fibræ, ut vulgo sphincteri adscribuntur, vix aut paucæ observantur.

Levatores utrinque oriuntur amplo principio, ab interna parte ossis pubis, tunica obturatoris interni, interna parte ossis ilei, & acuto processu ischii: unde fibræ instar radiorum a circumferentia ad centrum quasi pergunt versus sphincterem, atque in parte intestini posteriori, quod cingunt, coeunt, includendo simul colum vesicæ, prostates & vesiculas seminales in viris; in feminis vero vaginam uteri: & inferuntur partim in supremam & posteriorem sphincteris partem, partim confundunt fibras cum sphincteris ovatis & annularibus, atque sic non tantum sustentando levandoque ano; verum etiam exprimendis vesiculis feminalibus & prostaticis in coitu inservire possunt.

Præter

a) In nullis fere musculis auctores magis dissentiunt, quam in musculorum ani descriptione: quemadmodum ex præstantissimis & accuratissimis anatomicis, nominatim *Riolano*, *Anthropogr.* lib. 5. cap. 40. *Covv-pere Myotom.* sua nova pag. 13. *Douglas Myographia* pag. 66. *Morgagn.* *Advers. anat.* III. p. 89. & sq. *Santorin.* *observ.* p. 164. seq. videri potest: nam non solum in numero; sed quam maxime in origine, progressu, cursu, figura & insertione describenda tantopere variant, ut inter se conciliari vix possint: quod subiectorum diversitati, an aliis causis sit adscribendum, uberius inquirendum erit. Ego nunc eam descriptionem dabo, sicut in ultimis sectionibus eos observavi.

Præter hos levatores, quos maiores appellat Douglas a), levatores minores quoque cum Riolano describit : qui oriuntur partim tendinei, partim carnei, a protuberantia ischii : transversim inde feruntur versus anum, atque inferuntur in sphincterem eius, haud procul a bulbo urethræ. b)

Ossis coccygis muscoli duo quoque observati sunt, c) utrinque unus, coccygæus dictus, qui ano inservire videntur : ortum ducunt ab apophysi acuta & posteriori ischii, & utrinque lateribus ossis coccygis implantantur. Hi attrahendo os coccygis levatoribus ani succurrunt, illudque nimis retrorsum pressum, in statum naturalem ad anteriora reducunt, impediuntque, ne facile luxari aut nimis retrorsum cedere queat.

347. MUSCULI VESICÆ duo numerari solent :

{ Sphincter vesicæ, §. 222. descriptus, &
{ Detrusor urinæ, ibidem iam descriptus d) : nihil aliud est, quam tunica muscularis vesicæ, sphincteris antagonista, qua urina e vesica expellitur. e)

348. VAGINÆ UTERI SPHINCTER five constrictor est series fibrarum muscularium, quæ oriuntur a sphinctere ani, orificium vaginæ utrinque complectuntur, & in crura clitoridis inferuntur : quibus os vaginæ angustatur, & penis in coitu blande afficitur.

Santorinus plures musculos vaginæ & urethræ muliebris describit, quos vero invenire adhuc non licuit. f)

N 4

349. FE-

a) Myograph. p. 68. b) quomodo in muliere hic se habeat, Douglassius tacet. Ego tamen etiam aliquando in muliere tales vidi, e superiori parte protuberantiæ ischii, prope exortum erectorum clitoridis, oriuntur, & in sphincteris partem superiorem, ubi vaginæ uteri iungitur, inferebantur. Santorinus p. 206. mulieribus musculos transversales tribuit, quos cum transversis penis virilis comparat, eosque tab. 2. lit. gg. delineat, cum quibus mei valde conveniebant, vel iidem erant. An hi muscoli semper adsint, ignoro, itemque, utrum cum Douglassio ad ani, an cum Santorino ad vaginæ sint referendi, hæreo, aliisque diiudicandum relinquo. e) Douglas Myograph. p. 143. Cheselden Anat. Morgagn. Adv. III. pag. 94. d) vid. figur. in Cheselden. Tr. de Lithot. & Coupper. Myot. nova. e) Bianchus in Manget. Theatr. anatom. p. 414. novos vesicæ musculos elevatores & depressores describit, eosque duabus tabulis delineat. Verum a Morgagn. Adv. III. p. 75, sq. itemq; a Santorino obs. cap. X. N. 10. impugnantur. f) l. c. p. 207. sq.

349. FEMORIS musculi sunt XIV.

Flexores sive *Elevatores* proprii, tres: a) ut

Psoas magnus: qui oritur a prima, secunda, tertia & quarta lumborum vertebra.

Iliacus: cuius origo, tota cavitas interna ilei; finis vero utriusque, trochanter minor femoris.

Pectineus s. *Lividus*: cuius origo, pars superior ossis pubis; finis vero, 4 digitos infra priores.

Extensores, sunt *Glutæi* tres: *maximus*, *medius* & *minimus*: qui omnes oriuntur in superficie externa ilei & ischii; *maximus* vero etiam ex ossis sacri & coccygis: sed *maximi*, est ad 4 digitorum distantiam infra trochanterem maiorem; *medii* & *minimi* vero, in ipso hoc trochantere.

Abductores, quinque:

Fascia lata, sive *Membranofus*, vid. pag. seq.

Quadratus: origo, tuberculum ischii; finis, eminentia inter utrumque trochanterem.

Pyriformis: prodit crassus ab illa parte ossis sacri, ubi ossi ileo iungitur.

Geminini duo: *superior*, a spina posteriore & inferiore ilei.

inferior: a tuberculo ischii: b) atque hi tres inferuntur finui trochanteris maioris.

Adductor, *Triceps*: cuius caput primum & secundum oritur iuxta synchondrosin pubis; tertium, a tuberculo ischii, & inseritur toti spinæ femoris.

Rotatores, (qui & *Obturatores* dicuntur) duo:

internus: oritur a circumferentia interna magni foraminis ossis pubis, transit ischii incisuram posteriorem, & inseritur foveæ iuxta trochanterem maiorem.

externus: a circumferentia externa prædicti foraminis oritur, & eidem fere loco, ut præcedens, inseritur.

Hi musculi etiam abductoribus succurrere possunt.

350. TI-

a) His vero varii alii succurrunt: ut *adductor triceps*, *glutæi*, *fascia lata*, &, ut *Winslous* notat, *rectus* quoque tibiæ. Hist. Acad. Reg. A. 1720.

b) Duo *Gemini* firmiter concreti plerumque reperiuntur cum obturatore interno: hinc a quibusdam non ut distincti describuntur, sed ad hunc muscolum obturatorem referuntur,

50. TIBIAE, undecim musculi numerantur:

Abductor, *Fascia lata* sive *Membranofus* dictus, oritur carneusa spina anteriori & superiori ilei exterius: mox vero infra trochanterem maiorem totus fit membranaceus, includit arcte musculos in femore locatos, partique superiori tibiae, iuxta capitulum fibulae, inferitur, unde & per totam tibiam aponevrosin suam emittere videtur, a)

Adductor & Elevator, *Sartorius*, intus a spina ilei anteriori & superiori prodit, atque oblique descendens, interiori ac superiori tibiae parti implantatur: quam una cum femore, super alterum femur, ut sartores sedere solent, movet.

Extensores, quatuor, in anteriori femoris parte siti:

Rectus: ortum habet a spina anteriori & inferiori ilei. b)

Cruralis, sub priori situs: a tota anteriori parte femoris.

Vastus internus: a tota parte postica & interna femoris.

Vastus externus: a tota parte postica & externa eiusdem.

Hi quatuor robustum tendinem communem mox supra genu conficiunt, cui posterius patella inhaeret; qui deinde infra genu tuberculo tibiae infigitur.

Flexores, quinque, ut

Gracilis: prope synchondrosin pubis oriundus.

Semimembranosus: a tuberculo ischii, superius.

Seminervosus: ab eodem tuberculo, posterius.

Hi tres inferuntur parti interiori & superiori tibiae.

Biceps: origo capitis primi, tuber ischii; secundi, pars femoris media: finis, pars fibulae superior.

Popliteus: parvus est, & oritur tendine tereti a condylo exteriori femoris, tendineusque transit sub poplite introrsum: ubi carneus fit, atque in superiori & interiori tibiae parte finitur.

N 5

351. PE.

) Inservit simul ad femur, cui valido tendine nequitur, abducendum, itemque ad hoc & tibiam elevandam: hinc musculus hic alique horum nonnulli ossi utrique communes sunt. b) Elevatoribus femoris ac sartorio quoque succurrit, sessionemque una cum pectinæo, psoa, iliaco & glutæis, notante *Winslow* loc. cit. perficit. c) Omnes fere tibiae musculi vario modo se invicem, & femoris quoque musculos adiuvant, atque vix ullus est eorum, qui præter usum primum, ad alias actiones non concurrat.

351. PEDIS EXTREMI, five TARSI, sunt octo musculi: a)

Flexores, tres: ut

{ *Tibialis anticus*: cuius principium, facies tibiæ superior & exterior; finis, os cuneiforme internum, & metatarsi internum.

{ *Peronæus anticus minor*: origo, pars quasi media & anterior fibulæ; finis, os metatarsi exterius.

{ *Peronæus anticus maior*: origine & fine cum præcedenti fere convenit. vid. (76*)

Extensores, tres:

{ *Gastrocnemius*: cuius origo sunt duo condyli femoris. b)

{ *Plantaris*: principium, pars interior condyli externi. c)

{ *Solaris*: provenit a parte superiore & posteriore tibiæ ac fibulæ. Horum trium musculorum corpora coniuncta, *suram*; sed tendines iuncti, robustissimum *tendinem*, *chordam Achillis* dictum, constituent, qui inseritur calcanei parti posteriori. d)

Adductor, *Tibialis posticus*: cuius origo, superior pars ligamenti interossei & tibiæ; finis, os naviculare. e)

Abductor, *Peronæus posticus*: initium, pars superior fibulæ: sed tendo eius reflectitur sub osse cuboide, infra tarsum pedis, & inseritur ossi metatarsi, quod pollicem sustentat. Huius tendini in annosioribus, ubi sub osse cuboide transit, *os sesamoideum* inhæret.

352. Di-

a) Hi tarsi & nonnulli digitorum musculi robustis, inprimis circa malleolos, coercentur ligamentis, specie annuli, ne actionis tempore impertune exsiliant, & ut actiones musculorum dirigant: vid. *Vesalii* musculor. fig. I. & II, atque illa, quam capiti de ligamentis addidit.

b) in duobus his principiis cum *Vesalio*, *Riolano* & *Drakio* duo illa ossa sesamoidea, Tab. nostra I. fig. 2, DE delineata, observavi, & quandoque cum *Fallopio* & *Covvpero* tantum unum, in externo horum musculorum. conf. *Morgagn.* Advers. II. pag. 64.

c) In origine huius musculi se os sesamoideum reperisse affirmat *Cbeselden.* Anatom. pag. 34. eum vero museulum quandoque deficere notavit *Covvperus* & *Morgagn.* Advers. II. 45.

d) de tendinis huius ruptura controversia cum *Petito* vid. *Andry* Examen p. 34. sq.

e) Hic musculus sæpe duplicem tendinem habet: unde *bicornis* est, & quandoque omnino in duos musculos dividi potest: hinc quidam duos *tibiales posticos* numerant, *longum* & *brevem*.

§2. DIGITORVM PEDIS musculi sunt vel communes, vel proprii:

Communes, si interossei huc referuntur, sunt XV: ut

Extensores duo: nimirum

{ *Longus*: origo, pars superior tibiæ, & ligamenti inter tibiā & fibulā pars anterior; divisus in quinque tendines: quorum quatuor superius in quatuor digitorum phalangas; quintus, in os metatarsi extimum inferitur. a)

{ *Brevis*: ortus, calcanei pars superior & anterior; dividitur nunc in quatuor, nunc in tres tantum b) tendines, qui tribus, vel quatuor pollicis proximis, digitis inferuntur.

Flexores, (robusta aponeurosi obducti c) phalangarum

{ primarum, *Lumbricales* IV: quorum origo, tendo musculi perforantis, & pars calcanei interior; finis, in digitorum facie interiori.

{ secundarum, *Perforatus*: prodit a facie calcanei inferiori & interiori; dividitur in quatuor tendines perforatos, & finitur in ossium phalangæ secundæ capitulis posterioribus.

{ tertiarum, *Perforans*: origo, pars tibiæ posterior, superior, & media; divisus quoque in quatuor tendines, priorem perforantes, qui desinunt in phalanga tertia.

Adductores: *Interossei interni* IV. } de quibus mox

Abductores: *Interossei externi* III. } §. 54. plura. d)

353. PRO-

a) Hæc pars quinta proprie flexorem tarfi constituit, & sæpe distinctum musculum efficit, hinc eum num. præcedenti ad musculos flexores pedis, nomine *Peronei antici maioris* retuli. conf. N. (76*) Quandoque tamen etiam usque ad minimum digitum excurrit.

b) Hoc *Douglas* alique varii non notarunt.

c) Quam *Douglas* egregie descripsit *Myograph.* p. 155. 156.

d) Omnes hos interosseos unicum tantum esse musculum vult *Gouey Chirurgie veritable* p. 211.

353. PROPRII sunt vel pollicis, vel reliquorum digitorum

POLLICIS musculi proprii, sunt septem.

Extensor longus: cuius origo, antèrius a ligamenti interossei & fibulae parte fere media; finis, phalangæ primæ & secundæ facies gibba sive superior.

Extensor brevis: cuius origo, pars superior & anterior calcanei prope astragalum; finis, ibidem, ut prioris. Videtur hic musculus sæpe pars extensoris communis brevis digitorum, præsertim quando hic tantum tendines mittit ad tres priores digitos ut aliquoties vidi. a)

Flexor longus: origo, pars fibulae posterior; finis, phalangæ ultimæ pars inferior.

Flexor brevis: origo, os cuneiforme medium; finis, ossa duo sesamoidea pollicis: quæ huius primæ phalangæ per ligamenta iunguntur.

Abductor, sive Thenar: origo, latus internum calcanei & ossis navicularis; finis, latus internum pollicis, in osse sesamoideo interno. b)

Adductores, (scilicet ad reliquos digitos)

Antithenar: origo, os cuneiforme tertium & calcanei pars anterior; finis vero os sesamoideum externum. b)

Transversalis: origo, os quartum metatarsi; finis, iuxta præcedentem. Hic musculus etiam digitos ad pollicem, aut ad se invicem adducere videtur.

354. Mus-

a) idem notatum inveni a Cowpero Myograph. p. 215. b) Latus internum, ubi pollex situs est; sed externum hic vocamus, quod reliquos digitos respicit, quod a Cowpero aliisque invertitur. e) Cowperus eum pro adductore minimi digiti habet, Myograph. p. 214. & Caserio inventionem tribuit: attamen eum inferi scribit, non in minimum digitum, sed in os metatarsi, minimo digito proximum, p. 223. Igitur pro musculo minimi digiti proprie haberi nequit, attamen digitum minimum una cum quarto ad pollicem adducere potest, præsertim cum viderim in eodem cadavere ipsum in altero pede ex osse quarto, in altero ex interstitio inter quartum & quintum os, quasi ex musculo interosseo prodire.

354. Musculi proprii reliquorum digitorum :

DIGITI PRIMI, sive pollicis proximi duo sunt :

1. *Adductor* : inter pollicis & primi digiti ossa metatarsi situs, totum spatium interosseum occupat, tam in superiori, quam inferiori pedis parte conspicuus. Oritur ab ossis metatarsi secundi capitulo posteriori, & latere pollicem respiciente, partim superius, partim inferius, & in latus internum, pollicem respiciens, primi digiti inseritur. Vocatur vulgo *interosseus externus primus*.
2. *Abductor* : situs inter os metatarsi secundum & tertium, oriundus utrinque ex secundo & tertio osse metatarsi, replens superne totum hoc interstitium, & inseritur in latus externum digiti primi, ac *secundus est interosseus externus s. superior. a)*

DIGITI SECUNDI sive MEDII, musculi proprii sunt duo :

1. *Adductor* : inferne in eodem interstitio tantum videndus, provenit ex tota concava sive inferiore parte ossis metatarsi tertii, & in medii digiti latus internum abit. Estque *interosseus inferior s. internus primus*.
2. *Abductor* : oritur utrinque ex tertio & quarto osse metatarsi, & in digiti medii latus externum immittitur, estque *interosseus externus tertius*.

DIGITI TERTII musculi proprii duo sunt :

1. *Adductor* : cuius origo, concava superficies ossis metatarsi quarti; finis in digiti tertii latere interno. Est *interosseus internus secundus*.
2. *Abductor* : superne inter quartum & quintum os metatarsi situs, utrinque ex ossibus vicinis ortum trahens, finitur in latere externo digiti tertii, seu minimo proximi, estque sic *interosseus externus s. superior quartus*.


DIGITI MINIMI musculi proprii tres sunt :

1. *Adductor* : ex concava sive inferiori ossis metatarsi quinti facie prodit, & in digiti minimi latus internum definit; estque vulgo *interosseus internus tertius*.
2. *Abductor* : oritur partim ex parte inferiori & anteriori calcanei, partim ab osse metatarsi quinto, inseriturque lateri exteriori primæ phalangæ.
3. *Flexor proprius* : cuius origo, partim capitulum posterius ossis metatarsi quinti, partim calcaneus; finis vero, pars inferior primæ phalangæ.

D. LAV-

a) Interossei pedis *externi rectius superiores*; interni vero, melius *inferiores* dici possunt.





D. LAVRENTII HEISTERI
COMPENDIUM
ANATOMICVM

*EDITIO QVARTA
PRIORIBVS LONGE AVCTIOR
ATQVE EMENDATIOR.*

TOMVS II.

ADENOLOGIA.

55. **A**DENOLOGIA, est doctrina de glandulis, quas Græci *αδένες* vocant; Latini vero *glandulās*, a glandibus forte quercinis, quarum figuram nonnullæ æmulantur.

356. Partes, quibus veteres glandulæ nomen dederunt, quamvis tam varia figura, magnitudine & colore se offerant, a vulgo tamen, quod mirandum, facile cognoscuntur: definitionem vero, sive descriptionem earum dare, quæ omnes veras glandulas comprehendat, & nullis aliis partibus sit communis, quas veteres, tam nomine, quam re, a glandulis distinctas esse voluerunt, aliudque nomen indiderunt, res est adeo difficilis, ut præstantissimi, acutissimique viri id hucusque præstare non potuerint.

357. Multi enim doctissimi Anatomici, & inter hos tales nonnulli, qui ex instituto, vel, ut aiunt, *ex professo* de glandulis scripserunt, earumque naturam curatius extricare, illustrareque studuerunt, sine dubio, ob rei difficultatem, nullam definitionem, aut perspicuam descriptionem, dederunt, aut dare potuerunt: quo vero ipso effecerunt, ut multæ in glandularum doctrina ortæ fuerint confusiones atque errores.

358. Alii vero, qui audaciores fuerunt, atque definitionem aliquam dare conati sunt, tan- opere discrepant, atque tam imperfectas & erroneas sæpe protulerunt, ut vel cum glandulis, quas omnes tamen pro talibus agnoscunt,

non conveniant; vel alias partes cum glandulis confundant, quæ tales tamen non sunt: sicuti hoc prolixius in Dissertatione, de *Glandula vera appellatione*, nostro sub ductu & præsidio, Altorfii quondam habita, ostensum est.

probatio. 359. Quidam enim glandulam *per partem globosam* &c. definiri volunt; verum illi hac definitione excludunt *pancreas*, glandularum maximam, atque præcipuam: quippe quod cum nulla figura minus convenit, quam cum globosa, & tamen semper pro glandula habitum fuit. Ita etiam *capsula atrabilaria*, *parotides*, aliæque, quæ globosæ non sunt, ex numero glandularum proscriberentur: quæ tamen quoque ab omni tempore glandulæ fuerunt, & appellatæ sunt.

probatio II. 360. Alii dixerunt, glandulam esse *partem mollem, laxam, spongiosam*, &c. verum habemus primo glandulas, quæ molles, laxæ & spongiosæ non sunt; sed quæ duriusculæ, firmæ & compactæ deprehenduntur. Deinde aliæ existunt partes, quoque molles, laxæ & spongiosæ, ut, pulmones, pinguedo, aliæque, quæ tamen, omnium consensu, glandulæ non sunt; & idcirco cum glandulis confunderentur.

probatio III. 361. Nonnulli glandulam vocarunt *parenchyma*, sive *carnem mollem, laxam & fungosam*. An vero hi glandulam melius clariusve definiverint, quam præcedentes, ex modo dictis facile iudicari potest: iisdem enim, quos modo indicavimus, defectibus hæ definitiones laborant.

probatio IIII. 362. Non pauci, qui glandulam *congeriem vasculorum omnis generis*, vel *partem ex congerie vasculorum*

orum compositam esse dixerunt, putarunt, se optime glandulæ naturam & definitionem exhausisse. Verum enim vero, an non membranæ, muscoli, aliæque omnes partes corporis humani, si accuratius earum examen instituitur, congeries sunt vasorum omnis generis? Igitur hæc definitio glandularum naturam minime exhaustit, eisque minime competere vel tribui iure potest.

363. Alii distinctionem glandularum ab aliis *probatio* partibus in eo quæsierunt, ut eas *V.* *congeriem vasculorum, propria membrana inclusorum*, esse affirmaverint. Sed quæro, an non idem in pulmonibus, corde, ventriculo, musculis, aliisque partibus, a glandulis distinctissimis adsit & reperiatur? tota enim horum substantia congeries est vasculorum, quæ peculiari membrana includuntur. Quod cum ita sit, profecto ad veram glandulæ definitionem sufficere nequit.

364. Quidam, imo multi, voluerunt: quod *probatio* *VI.* *ubicunque secretio, ibi glandula*: ideoque non a fabrica, aut a priori; sed *ab usu*, sive functione, & a posteriori, ut aiunt, glandulæ definitionem petere allaborarunt. At, primo videmus multas fieri secretiones, earumque etiam maximas, quæ in corpore contingunt, sine ope vel interventione glandularum. Quis enim est, qui nesciat, *chylum* in intestinis a fecibus fecerni, sine ope glandularum, solis osculis vasorum lacteorum absorbentibus, in papillis tunicæ villosæ? Sic in testibus, genitura; in sinibus pituitariis cranii, pituita separatur, ubi tamen nullæ sunt glandulæ. Ita etiam *pinguedo* in folliculis sive cellulis membranæ adiposæ

adiposæ tenuissimis, ubi nullæ glandulæ videri aut demonstrari possunt, secernitur. a) E. contrario habemus glandulas, ab omnibus pro talibus receptas, de quibus tamen incertum est, an aliquid secernant. Quis enim probare certe potest, glandulam *pinealem*, *pituitariam*, *capsulas atrabilarias*, *thymum*, *glandulam thyroideam*, *bronchiales* &c. aliquid secernere: & tamen pro glandulis ab unoquoque habentur. Imo quia veteres certas partes vocarunt glandulas, etiam si ignoraverint eas aliquid secernere, (sicuti id de omnibus, usque ad præcedens seculum, ignorarunt,) hinc aperte sequitur, *veteres glandulas non ob usum, sed ob alias rationes aut qualitates, ita vocasse.* Accedit, quod vulgus adhuc hodie ex sola externa facie, sive *ex solo habitu* dignoscat glandulas, etiam si eorum usum ignoret. Igitur ex aliis signis poterunt cognosci.

probatio
VII.

365. Alii, (inter quos dux est *Malpighius*) quando in statu præternaturali in cadaveribus, hydrope, phthisi, hæctica, aliisque gravioribus morbis, defunctis, *corpuscula spheroidæa*, sive rectius, *morbosa tubercula*, *atheromata*, *steatomata*, *grandines*, *congestionē terrestres aut tartareas*, in formam globulorum compacta, invenerunt, in hepate, liene, cerebro, peritonæo, peri-

a) Iam dudum etiam *Schelhammerus* noster hanc sententiam impugnavit, docuitque, non omnes separationes liquorum in corpore animalium per glandulas fieri: in *Anal. Anatom. Diss. III. N. XXXVII.* *Meryus* quoque in *Hist. Acad. Reg.* variis in locis se opinioni huic opposuit: præsertim cum ex eius collegis fuerint, qui ipsorum mensium in mulieribus excretionem non nisi per glandulas (quæ tamen in utero non deprehenduntur,) fieri posse existimaverint; cui sententiæ *Littrius* potissimum addictus erat.

pericardio, &c. mox inde concluderunt, hæc tubercula, five corpuscula, quia sphæroidea apparuerunt, veras glandulas fuisse: ideoque hæc viscera in statu naturali ex talibus corpusculis, five ex meris & infinitis glandulis componi.

356. Ad quæ vero respondeo: primo, hæc corpuscula sphærica in corporibus sanis eis in locis non deprehendi, saltem consueta & ordinaria non esse: ideoque illa effectus potius existere causæ morbosæ, stagnationes terrestrium, aut crassarum & viscidarum particularum in minimis vasculis, sphærulas tales postea mentientes. Quod enim naturale & ordinarium esse statuitur, illud etiam semper vel saltem plerumque, in statu naturali, non tantum in morbofo, patere debet: alias enim fallimur vehementer. Quoties enim arteriæ & membranæ variæ, hinc inde in corpore cartilagineæ, imo osseæ deprehensæ fuerunt! An vero recte inde infertur, *arteriarum & membranarum naturalem constitutionem esse cartilagineam vel osseam?* Profecto minime. Præterea corpuscula eiusmodi sphæroidea, five rectius tubercula, non solum in porcorum hepate & liene; verum, quod probe notandum, sæpius etiam *in pulmonibus* unius eiusdemque animalis observavi: quæ tuberculis, cum in superficie, tum in *tota interna pulmonum substantia*, scatebant. Similia etiam corpuscula aliquoties, ut *Malpighium a)* & alios taceam, ipse in iuvenibus hæctica defunctis, in pulmonibus

a) vid. eius Epist. de Glandul, pag. 5. edit. Londinens.

offendi. Nemo tamen hanc ob causam, opinor, *pulmonem viscus glandulosum* appellabit: neque etiam *uterum*; quamvis in ipsa uteri substantia eiusmodi corpuscula rotunda quoque observata sint. a) Cur igitur alia viscera, in quibus tubercula in statu morbofo deprehenduntur, glandulosa vocabimus? cur speciatim lienem? in quo tamen nulla secretio cognita, & nulla actio glandulosa contingit. Neque unquam satis probarunt *Malpighiani*, sphæroidea talia corpuscula glandulas potius esse, quam tubercula, ex morbofa quadam causâ producta: quia etiam in superficie membranarum viscerum, teste ipso *Malpighio*, b) & quidem etiam in ipsius cordis membrana visa sunt, ubi nemo facile glandulas ostendet.

probatio
VIII.

367. Rursus alii in *cerebro, hepate & renibus vesiculas invenerunt*: & hinc has partes vere glandulosas esse, evincere volunt. c) Verum primo, status hi rursus fuerunt prorsus morbofi & extraordinarii: qui propterea, quia in sanis idem non reperitur, ad statum naturalem & ordinarium probandum non sufficiunt: in quo longe aliter hæ partes apparent: nam ipso *Malpighio* notante d), *non semel ingens vesica cerebri vices supplevit*; quod sane statum naturalem (cuius causâ tamen adducitur) docere nullo modo potest. Deinde, *veteres nunquam vesiculas appellarunt glandulas*, aut tales esse

a) vid. *Peyeri Parerg. anatom. p. 132. Ruysch. Thes. anat. IX. p. 70. & Tab. III. fig. 1. lit. D.*

b) loco modo citato.

c) conf. *Malpigh. loc. citat.*

d) *Epist. de Glandul. pag. 6.*

368. Regerunt hic quidam patroni glandula-
rum, primo, *vasculosum & glandulosum non dif-*
ferre: omne enim *glandulosum*, esse *vasculosum*
& e converso, *vasculosum quoque glandulosum ap-*
pellandum esse. b) Cui obiectioni vero respon-

b) Ita tamen post alios adhuc ratiocinatur doctiff. *Micbe-*
lottas in libr. de *Separatione fluidorum.*

lute distinguendæ: quia alias hac ratione statuendum esset, totum corpus, dum omnes eius partes vasculosæ, ex meris glandulis componi: id quod absolum est; adeoque hæc sententia ab illis, qui accurate loqui, & distincte de partibus iudicare volunt, non probari potest: quia summam in anatome confusionem pareret.

oblectio II.
de folliculis
glandularum.

369. Deinde quidam cum MALPIGHIO affirmant, *in quavis glandula minima, simplici*, atque sic etiam in omnibus, quas in visceribus statuunt glandulas, necessarium *esse folliculum, sive vesiculam*, inter extrema arteriarum, venarum & ductuum excretoriorum interiectum, quibus secretic fieret, iisque a causa quadam morbofa dilatatis, folliculos, adeoque & glandulas conspicuas reddi. Sed præterquam, quod multi celeberrimorum anatomicorum huic sententiæ, tanquam non probatæ, & mente solum conceptæ, contrariantur, (dum in statu naturali in his visceribus ne quidem glandulæ videri possunt, multo minus earum folliculi) experientia convictus affirmo, *æque facile, aut forte adhuc facilius, vascula minima in vesiculas mutari posse*, sicuti tales in placenta uterina, teste Ruyschio, Rauboltio *a)* aliisque mere vasculosa, in pulmonibus, superficie cutis, oculis, aliisque partibus, ubi glandulæ non adsunt, nec demonstrari possunt, sæpius observatæ sunt. *b)* Ergo & idem in renibus, hepate, cerebro, &c, contingere poterit.

a) Hist. Acad. Reg. 1714, 1715, 1718.

b) de vesiculis & tuberculis in partibus non glandulosis, ut placenta &c. repertis vid. Dekkeri & Bidloi exercit. Ruysch. Adversar. II. p. 24. Vallisner. de generat. Diar. Erudit. Paris. An. 1722. mense octobri.

terit. Cum vero anatomici sit, non dicere aut suspicari, sed demonstrare: hinc utique pro veris ea accipienda non sunt, quæ in sanis nunquam apparent. In statu enim præter naturam tot fiunt monstra & aberrationes naturæ, ut illi, qui ex eiusmodi constitutione naturalem deducere volunt, facillime a vero aberrare queant. Præterea notandum, *veras glandulas, ut salivales, mesenterii, thymum, pancreas, &c. raro, si unquam in vesiculas mutatas reperiri*: unde patet, *glandulas veras vix vel nunquam; partes vero vasculosas sæpissime vesicularum speciem induere*, atque sic multis, quasi glandulæ hæ essent, illudere. a) Sed demus Malpighianis, esse in quibusdam glandulis aliquam vesiculam sive folliculum; tamen inde non sequitur, eos in omnibus iis partibus adesse, quas ex glandulis constare contendunt: quia effector nostri corporis ad potentiam suam demonstrandam partes variis modis componere voluit, ut diversis usibus tanto sint aptiores. Multi quoque cum *Malpighio* folliculi significationem, ut hypothesein suam tanto melius tueantur, laxissimam faciunt, & vascula seminalia testium longissima, imo totum etiam longissimum intestinorum tractum pro folliculo glanduloso habeant. Ita & ventriculum, pericardium,

-
- a) Doctissimus quidam vir obiecit, vasculosas partes in vesiculas mutari vix posse; folliculos vero glandularum facillime. Sed hæc si vera essent, vesiculæ in glandulis nominatis longe frequentiores essent quam in visceribus reliquis. Experientia vero contrarium docet. Adeoque vel folliculi non sunt in istis glandulis, vel saltem vascula facilius in vesiculas transmutantur folliculis; licet modus, quo hoc fiat, non adeo manifestus sit,

dium, tunicam testis vaginalem, peritonæum, pleuram, & nescio quas non partes, pro folliculis adeoque & glandulis sumunt, atque sic necessario omnes fere partes glandulas faciunt. Quam apta vero vel inepta hæc folliculi glandulosi sit significatio, aliis a præiudiciis liberis iudicandum relinquo.

*secretiones
sine follicu-
lis fieri pos-
sunt.*

370. Abunde præterea cognoscimus, *secretiones sine folliculis talibus interiectis & fieri posse, & revera etiam plerisque in partibus ita fieri.*

a) Vt enim taceam chyli atque pinguedinis secretionem b), & fingamus folliculum in glandula quadam simplici, per quam arteriæ & venæ ultimæ disseminatæ sint, & in quo, uti volunt, ductus excretorius incipiat: tunc folliculus tamen ad secretionis negotium nil præstaret; sed receptaculi tantum officio fungeretur. Quando enim perpendimus, illud liquidum, quod in folliculo vel ductu excretorio iam hærrere concipitur, cognoscimus quoque illud iam esse secretum, & non ibi demum secerni. E venis vero, (nisi in hepate, ubi vena portæ vicem arteriæ præstat) secretio non contingit: quia sanguinem revehunt, e quo iam secretio facta est: ergo in arteriis, & præcipue in lateralibus canaliculis, perfici necesse est, quos e lateralibus minimarum arteriolarum provenire, eodem forte modo, ut vasa chyliфера ex intestinorum lateribus egredi conspiciamus, existimo.

a) In hoc *Michelottus* omnino mecum consentit, loco citato, licet in aliis dissentiat.

b) *Malpighius* etiam lympham ab arteriis emanare iudicat. Epist. de glandul.

timo. a) Atque hoc modo secretiones in cerebro, renibus, hepate, testibus, cute, aliisque membranis, imo in ipsis glandulis fieri concipimus. Quoniam vero natura simplex esse solet in suis actionibus, & folliculi vel non conspiciuntur, vel, si adsint, potius receptaculi, quam organi secretorii munus perficiunt: hinc certiore hunc secretionis modum, a manifesta chyli secretionem desumptum, dubio incertoque modo præferendum merito esse censeo.

371. Igitur, qui æquivocationes, cum inde provenientibus erroribus atque confusionibus evitare, & quantum fieri potest, remove-<sup>vasculosum & glandu-
losum di-
stinguen-
dum.</sup>re volunt: illi *vasculosum & glandulosum non pro una eademque re habere*; sed, ut partes ipsæ figura, facie, habitu, atque aspectu se distinguunt, ita nomine quoque eas distinguere debent. Adeoque viscera, quæ oculis, injectionibus, aut microscopiis, vasculosa deprehenduntur, & in quibus in statu naturali nulla distincta corpuscula spherica, peculiari membrana inclusa, conspiciuntur, illa haud incongruo aut alieno nomine insignire fas est; sed *vasculosum*, suo nomine, *vasculosum*; & glandulosum, *glandulosum* appellandum: ita enim æquivocatio & confusio harum partium, quæ in libris multorum neotericorum regnant, optime evitantur. b)

372. Sed si iam quærat *quid glandulosum, quidve*

a) Consentit etiam in hoc cum Bellino & me, Michelottus l. c.

b) In hoc Michelottus dissentit, & *vasculosum* atque *glandulosum* pro una eademque re habendum esse vult: iure an immerito, aliis iudicandum relinquo. Interea tamen infra adhuc nonnulla hac de re differemus.

quid veteres vocaverint glandulas.

quidve glandula dici debeat? Respondeo, quia recentiores, ut ex hactenus dictis patet, in eo non conveniunt, hinc primo considerandum esse existimo, *quid veteres glandulas vocaverint*; & deinde, quare illud ita vocaverint: ne veterum nomina, quod *Morgagnus* aliquae prudentiores sæpe meritoque inculcant, præter necessitatem immutemus. Prius perpendendo, invenimus eos glandulas vocasse *glandulam pinealem, pituitariam, parotides, maxillares, iugulares, thyroideam, thymum, pancreas, glandulas mesentericas, axillares, inguinales, &c.* a) ideoque hæ, aliæque his similes partes, quæ forte ipsis non innotuerunt, & in posterum glandulæ vocandæ sunt: sic enim ex notis & datis ad ignota & dubia noscenda ducimur.

quare certas partes glandulas vocaverint.

373. Quod vero ad posterius attinet, *quare has partes (372) glandulas nuncupaverint*: certum est, veteres eas *non ob globosam aut sphericam figuram* ita appellasse; alias pancreas, thymum, aliasque his non annumerassent. Neque ob *mollem, laxam & spongiosam substantiam*: alias enim duriores & compactiores glandulas e numero earum exemissent, & pinguedinem ac pulmones, mollem, laxam, spongiosamque substantiam habentes, in numerum earum retulissent. Neque tertio, certas partes *ob usum sive secretionem* glandulas vocarunt; quia maximam partem ignorarunt glandulas aliquid discernere: dum hic usus demum superiori potissimum seculo de quibusdam innotuit. Ex adverso vero viscera, de quibus certo sciebant, ea aliquid

a) conf. *Hippocrates lib. de glandulis*, aliique veteres,

quid fecernere, ut hepar, renes, ac testes, pro glandulis non habuerunt. Præterea, neque liem glandulam vocarunt; licet putaverint eum illem atram e sanguine fecernere. Ideoque illi, qui ab officio secretionis partes appellandas se censent glandulas, graviter hallucinari videntur, & a priscis præter necessitatem nimis recedunt: dum sic partes, contra mentem & consuetudinem veterum glandulæ appellandæ sent, quæ tales non sunt, & iam alia nomina ab ipsis receperunt: ut intestina, uterus, pulmō, cutis, membranæ, &c. & contra, partes quædam, quas illi glandulas vocarunt, hominibus non amplius essent glandulæ; quia ignoramus, utrum aliquid fecernant, an alii usui, nobis adhuc incognito, a conditore destinatæ sint: ut glandula thyroidea, bronchiales, pituitaria, pinealis, aliæque.

374. Clarum igitur est, veteres quasdam partes nostri corporis non ob aliam causam, *ob certum habitum seu faciem.* quam *ob peculiarem carnem*, id est, *ob peculiarem habitum, sive ob singularem faciem externam*, nullo habito respectu, sive ad structuram internam, sive ad figuram sphæricam, sive ad usum, (quicquid nonnulli contradicant) glandulas dixisse: ideoque, cum nobis neque licet, neque, ob confusionis metum, opportunitum sit, nomina vetera præter necessitatem mutare, aut glandularum nomen talibus partibus imponere, quæ nimis diversæ sunt ab illis, quas ita vocarunt: hinc nomen glandulæ nulli parti, (licet similem fabricam internam, similemve usum habeat, quam quædam glandulæ

dulæ obtinent) recte competere potest, nisi talibus, quæ *similem simul faciem externam*, si-
ve *peculiarem illum habitum* exhibeant, ob quem olim & primum ita dictæ fuerunt, & adhuc hodie a vulgo ita dicuntur. a)

quid glandula sit.

375. Quid igitur glandula sit, aut quomodo optime definiatur, hic non repetemus, quia iam pag. 12. §. 33. definitionem earum ex hoc fundamento dedimus: ita, ut melius iam, quam olim, si sine præiudicio res perpendatur, ab aliis partibus distingui queant.

quare ad habitum hic confugiendum.

376. At mirabuntur forte non pauci, *quare ad peculiarem habitum glandularum*, ad eas dignoscendas, confugerim. Sed mirari, opinor, desinent, si considerabunt, alia certa signa, aut differentiam specificam, hucusque ab autoribus data non esse, nec dari potuisse: & propterea me hunc habitum graves ob causas in auxilium vocare, necessum habuisse. Nam quia summi Botanici, sicut ex quamplurimis exemplis apud RAIVM, TOVRNEFORTIVM, BOERHAVIVM &c. Botanicos ævi nostri principes, constat, ad proprium certarum plantarum habitum subinde confugere coacti sunt, quando genus notasque earum características aliter definire aut describere non possunt; hinc quia hoc ipsis licitum est: cur Anatomicis in tali casu, ubi ob rei difficultatem perfecta definitio aut descriptio aut nota característica dari nequit, idem non erit licitum? Nemini vero hanc sententiam obtrudimus; sed simulac quis talem

a) Sententiæ huic nostræ solus, quantum novi, Michelottus se opposuit: cui vero mox infra respondebimus.

talem definitionem aut notam dabit, qua glandulæ, sine peculiari suo habitu, ab aliis partibus rite distingui queant, & quæ omnibus glandulis competat, (quod tamen adhuc nemo fecit) tunc sententiam meliorem accipere non detrectabimus.

377. Si vero quærat, *quid sit ille peculiaris habitus in glandulis*. Respondemus, illa singularis vasorum complicatio & compositio, unde talis emergit forma, qua primo intuitu a musculis, pinguedine, ossibus, membranis, vasis, & visceribus reliquis corporis animalis agnoscitur: qui quidem habitus vel forma verbis describi nequit; simili modo, ut Botanici *habitum musci*, vulgatissimæ licet herbæ, verbis describere non possunt, teste Celeb. AIO a), & tamen, tam a doctis quam ab indoctis, *ex peculiari habitu* & facie facile cognoscitur, atque ab aliis plantis, eodem modo, ut glandulæ ab aliis partibus, distinguitur.

378. *Quæcunque igitur pars a veteribus glandula appellata est*, aut *faciem* sive habitum illum obtinet, quem illæ partes habent, quas veteres glandulas appellarunt, talem pro vera glandula agnoscimus, & pro tali habendam esse censemus. Quæcunque vero ea facie, sive habitu constituitur, illam e numero glandularum excludendam esse iudicamus. Notandum autem hic est, veteres non solum glandulas magnas pro talibus agnovisse; sed etiam glandulas parvas, speciatim mesenterii, inter quas multæ valde exiguæ: quas tamen quivis ferè
b e vul-

e vulgo, in vitulis verbi causa, adhuc glandulas appellat, & pro glandulis agnoscit. Hinc ubique vel maiores vel minores partes occurrunt, facie, sive *habitu* illo præditæ, quem partes, a veteribus & vulgo glandulæ appellatæ, obtinent, illæ pro glandulis merito agnoscendæ sunt.

quid expungendum.

379. Ex iisdem vero rationibus expungenda veniunt e numero glandularum i. *corticalis cerebri substantia*: quia nihil in ea, neque nudis, neque armatis oculis, naturaliter conspicitur, quod glandularum figuræ, aut faciei, sive habitui simile sit: e contrario autem iniectiones docuerunt, eam ex meris vasculis constare, *Hippocrates* etiam notanter scribit a), *cerebrum glandula simile esse*; illud vero glandulam non vocavit; quia simile non est idem. Hoc ipsum sentiendum de *hepate, liene & testibus*; in quibus *Ruyschius, Leeuwenhæck, Vieussenius, Bergerus*, ego & multi alii præstantissimi anatomici nihil, quod *glandularum habitum* obtineat, vel quod glandulam referat, in statu naturali reperire potuimus; at, vascula copiosissima ubique in eis deprehenduntur. Hinc igitur rectius *vasculosa* appellantur hæc viscera, quam *glandulosa*, quia revera vasculosa sunt, atque sic competens nomen ipsis tribuitur. Omnium vero maxime miror, quod ob tubercula in cadaveribus morbofis quandoque *in liene reperta*, multi lienem quoque glandulosum esse perhibeant. b): cum tamen lien

nihil,

a) Libr. de Glandul.

b) quod tamen *Douglas* adhuc fecit in Actis Anglican.

nihil, quod notum sit, secernat, verum alio longe officio fungatur; (vid. Not. (21^{*}) adeoque ne quidem glandulis indigeat. Si veteres hoc egissent, qui secretionem bilis atræ ipsi, licet falso, tribuerunt, condonandum hoc ipsis esset facilius. Cum vero hoc hodie adhuc contingat, ubi doctiores conveniunt, nullam secretionem hic fieri, atque insuper ductu quoque excretorio destituatur: non concipio, in quem usum glandulæ in eo adesse debeant: præsertim cum omne id, quod lien præstat, aut his glandulis tribuitur, per vasculosam folliculam vel æque bene, vel adhuc facilius & melius intelligi atque explicari queat. Si *Rezes* ex homine, porco, bove, vitulo, cane &c. vel recentes vel cocti discerpuntur, rota corticalis eorum substantia, æque ac interior, vasculosa sive tubulosa apparet; rotunda vero corpuscula, ex quibus eos constare perhibent, offendere potui nunquam. Aut si forte quandoque nonnulla deprehendantur, ut *Ruychius* aliquando quædam vidit, ea cum ipso vel morbosa esse existimo; vel tam pauca & exigua sunt, ut largissimæ urinæ secretioni minime sufficere queant. Ita & *testiculi*, omnium fere consensu, prorsus sunt vasculosi. a) Item in *pleura*, *pericardio*, *peritoneo*, *tunica vaginali*, naturaliter nullæ sunt glandulæ; sed subinde tantum tubercula morbida.

380. DIFFERENTIAS *glandularum* autores quamplurimas excogitarunt: ex quibus hic paucas, quas vero sufficere existimamus, pro-

b 2

fere-

a) vid. figur. nostr. 24. Tab. VI.

feremus. Dividemus eas primum in *simplices*, quas alii *conglobatas* vocant, ex unico corpusculo sphaeroides, distincto, suaque membrana incluso, constantes; & in *compositas*, quas vulgo appellant *conglomeratas*, quæ ex pluribus minoribus, unica communi tunica inclusis, componuntur. a) Differunt 2. *Consistentia*: dum quædam duriusculæ, quædam mollissimæ, præsertim illæ, quæ in iuncturis ossium hærent. 3. *Colore* pleræque quidem pallidi sive carnei sunt coloris, aliæ longe magis rubentes; quædam flavescentes, aut fuscæ; nonnullæ prorsus nigricantes. 4. *Figura*: plurimæ quidem sunt globosæ, sive sphaeroides, & quædam glandiformes; multæ vero ab his figuris quam alienissimæ: ut pancreas, thymus, thyroidea &c. Quædam etiam a figura nomen acceperant, ut glandula *pinealis*, *miliares*, & tonsillæ, barbaris *amygdala* dictæ. 5. *Vsu* differunt: unde quædam salivales, mucosæ, lymphaticæ; aliæ, *mucilaginosæ*, sebaceæ, ceruminosæ, lacrymales, pituitaria &c. dici consueverunt. 6. *Situ*: ob cuius diversitatem, parotides, maxillares, thyroideæ, linguales, palatinæ, labiales, iugulares, cervicales, bronchiales, axillares, inguinales, lumbares, intestinales, mesentericæ, renales, vocantur. Ita etiam a situ vel *solitaria*, vel *congregata*, præsertim in intestinis, vocari solent. 7. *Magnitudine* glandulas quoque differre, tam notum est omnibus

a) Divisionem glandularum in *conglobatas* & *conglomeratas* valde ineptam esse iudicat Schelhammerus, Anale&. anat. Dissert. III. N. 39.; cum *globus* & *glomer* idem significant.

tribus, ut non opus esse existimem, verbis id indicare prolixius.

DE GLANDVLIS SPECIATIM

381. Videamus vero iam speciatim, quænam partes in numero glandularum merito retine-^{glandula intra cra-}
 ri queant: & quidem primo IN CAPITE. Hic^{nium.}
 si quis velit totum *cerebrum* pro glandula magna habere, quia HIPPOCRATES illud, ob qualem-
 cunque similitudinem, ut supra iam monui-
 mus, *corpus glandulis simile*, vocavit *a*), non val-
 le repugnabo: licet ceteri veteres idem non
 gerint. At corticalem eius substantiam na-
 turaliter ex innumeris parvis glandulis five cor-
 pusculis globosis, ut BIDLOVS delineavit *b*), con-
 stare, a sententia HIPPOCRATIS & avtopsia, ut su-
 pra evici, quam alienissimum est. Attamen
 in duræ matris finibus, & extra eosdem ad la-
 tera, glandulæ exiguæ reperiuntur a PACCHIO-
 no descriptæ. *c*) Aliæ in foveis ossis frontis &
 circa divisionem vasorum quandoque occur-
 rentes, inter duram matrem & arachnoideam
Santorino indicantur. *d*) Ita ego aliquoties
 cervos quasi similibus glandularum in foveis
 ossis incipitis, quæ haud procul a sinu longi-
 tudinali

a) Lib. de Glandulis.

b) Anatom. Tab. X. fig. 2,

c) de Gland. conglob. duræ matris.

d) Observ. anat. p. 52. Sed cum in tunica arachnoidea nulla sint vasa conspicua, haud intelligo, quomodo *glandula hæ nova*, ut ab ipso appellantur, *circa truncos vasorum*, inter duram matrem & arachnoideam, quemadmodum in margine scribit, hæere potuerint. Ego haud raro nonnullas circa divisiones ramorum notabiliorum piæ matris hinc inde observavi: quæ igitur aliæ forte erunt, quam quas *Santorinus* hic notavit.

tudinali sæpe his ossibus insculptæ sunt, vidi, quæ quoque dura matre, ut *Santorinus* de suis in foveis ossis frontis scribit, tectæ non erant, verum dura mater ibi deficiebat, & quasi perforata erat. Videntur hæ glandulæ humectandæ duræ matri inservire. Præterea in cerebro pro glandula habenda est *glandula pinealis*, pag. 135 : & sub cerebro *glandula laret pituitaria* in sella equina, de qua vid. pag. 139. quarum vero glandularum omnium usus valde incertus est. In plexu choroideo nullas naturaliter esse glandulas, iniectiones *RVYSCHII* & *AVTOPSIA* nos docuerunt.

*glandula
extus in
capite.*

382 Extus in capite habemus *Parotides*, *Maxillares*, *Sublinguales*, *Linguales*, *Labiales*, *Palatinas*, & *buccales* hinc inde per membranam oris dispersas, p. 145. descriptas. *Glandulam* item *lacrymalem*, olim *innominata* dictam, in orbita, pag. 142. Sub palpebris, *ceraceas* five *sebaceas Meibomii*, ibidem indicatas. Intus vero in *uvea oculi*, ubi quidam tales adesse statuunt, ob eam solum hypothesein, *nullam secretionem fieri sine glandulis*, fervendam, nullæ reperiuntur. Præterea hic occurrunt *Tonsillæ* in faucibus, de quibus pag. 148. Glandulæ in *membrana pituitaria narium*, *mucosæ*, pag. 152 ; & *ceruminosæ*, in meatu auditorio. p. 153.

*de glandula
thyroidea.*

383. In COLLO occurrit potissimum *Glandula Thyroidea*, tanquam colli maxima : (vid. pag. 122.) quam quia a *VERHEYENO* & male descripta, & male delineata est, in *Ephemeridum Cent. VII* & *VIII*, pag. 365, accuratius descripsi, & ex cadavere humano, una cum *bronchialibus glandulis*,

dulis, magnitudine naturali delineari curavi: ubi simul delineationem thyroideæ ex infante addidi. Est vero hæc glandula plerumque unica in homine, non duplex, lunæ cornutæ ut plurimum similitudinem referens, cornubus ex utroque latere non deorsum, ut *Verheyenus* pingit, sed sursum exporrectis, eisque tam cartilagini thyroideæ & cricoideæ, quam œsophago utrinque adhærens. Pars vero media quam *isthmum* appellant, superioribus asperæ arteriæ cartilaginibus iungitur. a)

384. Prolixius etiam in prædictis Ephemeridibus, de usu novo, quem VERCELLONIUS b) huic glandulæ adscribit, differui: dum eam *nidum ovulorum verminosorum* constituit, e quo per subtilissimos ductulos, quorum meatus tamen in conspectum non venirent, *ovula verminosa*, in hac glandula generata, in œsophagum, & inde ad ventriculum, pro charactere vitali, chylo in ventriculo impertiendo, atque digestionem promovenda, transmitterentur: quæ vero ovula in statu præter naturam sæpe in vermes abirent.

385. Sæpius in hanc rem in cadaveribus humanis inquisivi: fibras quoque satis manifestas, quibus œsophago adhæret, deprehendi; glandulam semper duriusculam, firmamque offendi; verum neque ovula in ea observare, neque ductulos cavos deprehendere potui.

b 4

Anno

a) conf. *Morgagn.* Advers. I. Tab. I. *Cantius* figura cordis Tab. 4. eam delineat; quam vero semper aliter deprehendi.

b) in Dissert. de glandulis conglomeratis œsophagi.

Anno autem 1719 Altorfii, in cadavere feminino, quod publice dissecai, glandulam hanc liquido valde turgidam reperi: propterea speravi, me hic aliquid circa usum eius deprehendere atque manifestare posse. Quam ob rem a parte posteriori tam tracheam quam œsophagum aperui, ut in horum cavum recte inspicere possem: deinde glandulam hanc manibus primo leniter, postea fortius pressi, ea spe, fore, ut vel in tracheam vel in œsophagum, vel in utrumque aliquid liquidi ingrederetur; verum ne guttula neque in tracheam, neque in œsophagum impelli potuit: ita ut mihi semper adhuc dubium sit, cui usui notabilis hæcce glandula inserviat, aut in quam partem aliquid infundat. Cum vero hanc turgidam glandulam, ad interiora lustranda, dissecalem, liquidum limpidum copiosum effluebat, quod repletissimum erat sphaerulis flavescenscentibus: quæ, ut guttulae olei minutissimæ, aquæ innatabant. Vtrum vero hæc corpuscula *ovula* fuerint VERCELLONII, an aliud quid, determinare non audeo. Interea tamen hanc observationem hic notare volui: fortasse enim experimentis in posterum instituendis, aliquid lucis dare poterit; nihil tamen ab eo tempore notatu dignum in ea observare potui: manetque igitur eius usus mihi adhuc incertus.

386. Præter hanc glandulam in collo hinc inde diversæ glandulae in interstitiis muscutorum & pinguedine, magnitudinis & figuræ variæ, situsque & numeri incerti, deprehenduntur, *glandulae iugulares laryngis, tracheæ, œsophagi. iugulares* in parte anteriori, *occipitales & cervicales*

ales in posteriori appellatæ: quarum usus quoque non adeo certus est. Vulgo vasis lymphaticis fervire creduntur: quem vero in finem operis inserviant, non perspicio. In *epiglottide* VYSCHIVS atque MORGAGNIUS glandulas exhibuerunt ac delineaverunt, sicuti pag. 121. indicavimus. In reliquis laryngis partibus, & præsertim iuxta cartilagineas arytenoideas, ut & in *trachea*, glandula a MORGAGNIO delineantur, *a*) quæ vero sæpius non adeo magnæ sunt, ut in illo cadavere fuerunt, unde suas delineavit: in ærea tamen semper satis conspicuas eas offendi. In *œsophago*, præsertim eius parte superiori, multæ sæpe glandulae reperiuntur, quæ a VALALVA *b*) delineatæ sunt. Reperi vero eas aliquando adhuc maiores, & in singularum medio foraminulum, tanquam osculum sive ductus excretorius, conspiciebatur, quas adhuc delineatas asservo.

387. IN THORACE glandulae quædam sunt externæ, quædam internæ. Externe mammarum *de thymo.* præcipuam substantiam glandulosam esse, supra, ubi de mammis actum, docuimus. Quid vero de areolarum glandulis sentiamus, §. 397. videri potest. Interne vero occurrit primo *Glandula* THYMVS, cuius descriptionem pag. 118. dedimus, duas vero diversas eius figuras, Tab. IV. fig. 14. & 15. exhibuimus. Anno 1706. controversiæ de hac glandula ortæ sunt, inter BIDLOVM & VERHEYENVUM; dum BIDLOVS in *dissertatione quadam de Thymo*, Lugduni Batavor. habita,
b 5

a) Advers. anat. I. Tab II.

b) De aure humana Tab. V, fig. 2.

habita, acriter aggressus erat VERHEYENI descriptionem & delineationem huius glandulæ: cui vero VERHEYENVS eodem quoque modo responderat. Huic deinde BIDLOVS alteram dissertationem opposuit: quam ille altera quoque responsione refutavit. Quoniam vero BIDLOVS statum controversiæ reliquerat, & latinitatem *Verheyeni* potissimum carpere annisus erat, hinc nihil utilitatis ex illa controversia natum est.

glandulæ
bronchia-
les.

388. In thorace præterea occurrunt considerandæ GLANDULÆ BRONCHIALES: (de quibus iam N. 259) quæ sunt satis notabiles glandulæ, extus in tracheæ & bronchiorum maioribus divisionibus sitæ *a)*, coloris nigricantis, sed usus quoque adhuc dubii. Creditum vulgo hucusque fuit, has glandulas separare liquidum quoddam, quod in bronchia demitterent, pro horum humectatione atque lubricatione. Verum VERCELLONIVS *b)* vult, eas potius liquidum, digestionis inserviens, per tenuissimos ductus, ad œsophagum (cui maxime quoque adhærent) & ventriculum mittere, Inquisivi quoque iam sæpius in hos ductus, & reperi etiam fibras satis notabiles, ab his glandulis ad œsophagum exporrectas: quæ vero nunquam tam magnæ erant, ut cavitas se in eis manifestaverit, vel setam admiserint, & propterea uberiori inquisitione indigent. Aliquan-

a) Harum in situ & magnitudine naturali delineationem accuratam dedi in *Ephemerid. Cent. VII. & VIII, Tab. VI, pag. 361*; verum chalcographi incuria variæ tam male sculptæ sunt, ut a bronchiis distingui nequeant.

b) in supra citata dissertatione.

quando in cadavere virili in maxima harum glandularum calculum reperi, extremum articulum digiti auricularis adæquantem; postea vero etiam in muliere, a me dissecta, paulo minorem in eadem glandula vidi: quod deinde etiam ab aliis notatum inveni. Anno 1723. in cadavere viri multas eiusmodi glandulas nigras in tota tracheæ parte posteriori, iuxta hanc & œsophagum, phaseoli parvi & feminis tritici figura ac magnitudine, offendi, atque nonnullæ etiam anteriori tracheæ parte laxè adhærebant.

389. Circa quintam circiter dorſi vertebram ^{glandula} in thorace ſubinde notabilis reperitur ^{dorſalis.} glandula, œſophagi poſteriori parti adhærens, a VESALIO aliisque veteribus iam delineata atque deſcripta, quam DORSALEM appellare ſolent. Hæc glandula diverſæ obſervatur magnitudinis: ſæpe tamen phaseoli vel amygdalæ magnitudinem obtinet, & ſubinde maior, ſubinde quoque minor reperitur. Imo non raro vel prorsus deficit, vel ſaltem adeo exigua eſt, ut, omni licet induſtria adhibita, eam invenire non potuerim. Quandoque etiam duæ hic reperiuntur glandulæ: id quod quidam frequentius eſſe volunt una. Ante plures annos virum ſecui, qui nihil cibi aut potus amplius deglutire poterat, propter obſtaculum quoddam, quod non in faucibus, ſed in thorace percipiebat. In hoc hanc glandulam ad ovi gallinacei magnitudinem auctam reperi, unde œſophagus ita comprimebatur, ut nihil amplius tranſire potuerit. Paucis etiam abhinc annis a celebri Germa-

Germaniæ Medico consultus fui ob similem morbum, quo filius eius, qui non nisi difficillime propter obstaculum in œsophago deglutire poterat, laborabat. Susplicatus sum, idem vitium hic adesse: æger etiam mortuus est. An vero cadaver incisum, & quid repertum sit, non comperi. VERHEYENVS œsophagum ex eadem causâ penitus coalitum reperit. *a)*

eius usus.

390. VERCELLONIVS *b)* hanc glandulam quoque dicatam esse statuit separationi liquidi digestionis inservientis: id quod per ductus tenues in œsophagum transfundi affirmat: quos vero ductus etiam neque alii, neque ego hucusque reperire potuimus. Cl. FANTONVS *c)* aliique iam ante VERCELLONIVM suspicati sunt, has glandulas in cavitatem œsophagi mucosum liquidum secernere, seque *eorum meatus* in cane, in quo hæ glandulæ excreverant, non solum vidisse, sed etiam *vermiculos* in iis invenisse scribit. Ita etiam celeb. MORGAGNIUS *d)* refert, has glandulas in canibus sæpe turgere, & a vermiculis quibusdam rubentibus, oblongis & tenuibus incoli: id quod & REDIVS *e)* atque CLERICVS *f)* confirmant. Atque talibus in casibus, MORGAGNIUS scribit, canaliculos in œsophagum apertos reperiri: verum glandulis his secundum naturam se habentibus, nullos evidentes meatus in cane, multo minus

a) Anatom. Cap. de œsophago.

b) in eadem dissertatione.

c) Anatom. Corp. hum. dissert. III. pag. 55.

d) Adversar. anatom. III. pag. 5.

e) de Animal. vivent. in viventib. repertis.

f) de lumbrico lato, cap. 13.

us in homine videri. Quare vero tam frequenter his in glandulis vermiculi oriantur: & an forte hic talis vermiculorum nidus sive ovarium, quale VERCELLONIVS in thyroidea statuit, res est ulterioris indaginis.

391. In ABDOMINE reperiuntur multæ glandulæ: quarum maxima est *Pancreas*, pag. 87. *glandula in abdomine.* Deinde *Glandula renales*, sive *Capsula atrabilia*, pag. 81; postea *Mesaraica* pag. 72; *Intestinales*, tam BRVNNERI, quam PEYERI, in intestinis, pag. 80 & 82 notatæ; *Ventriculi glandulæ* in canibus & porcis facile apparent, in homine vero perquam difficulter: atque quam maxime de iis in homine dubitarem, nisi CL. MORGAGNIUS me suis observationibus de illis certiores reddidisset: Postea tamen Helmtadii eas in ventriculo cadaveris virilis admodum insignes deprehendi. Præterea circa *vertebras lumborum*, ubi chyli receptaculum situm est, circa *os sacrum*, & *divisionem vasorum iliacorum* variæ glandulæ, sed diversæ figuræ & magnitudinis, reperiuntur, *lumbares*, *Sacræ* & *iliacæ* vulgo dictæ, in quas vasa lymphatica copiosa ingrediuntur: quæ inde in receptaculum chyli se exonerant. Vidi lumbares glandulas in muliere ultra pugni magnitudinem excretas: id quod etiam in pueris atrophis defunctis sæpius observavi. In hepatis parte concava circa ingressum venæ portæ, & *collum vesiculæ felleæ*, at & *prope lienem*, iuxta ingressum vasorum, sæpe glandulæ conglobatæ, phaseoli quasi magnitudine reperiuntur, quæ a nonnullis *Glandula hepatica*, *cystica*, *venæ portæ*, *lienares* sive *spleni-*

splenica appellantur, vasisque lymphaticis inservire videntur. In hepate bubulo modo indicatæ glandulæ in concava parte plures ut plurimum conspiciuntur, quam in homine: quarum nonnullæ amygdalæ, aliæ nucis, aliæ parvi ovi magnitudinem quandoque adæquant. *Circa sinistrum ventriculi orificium* extus ei adhærere glandulam, phaseoli magnitudine, affirmat VERCELLONIVS: e qua quoque ductum excretorium, in ventriculum desinere affirmat. *a)* Talem quidem glandulam sæpe in porcis inveni, ductum vero detegere non potui. At in homine, nescio quam ob causam, ne quidem adhuc glandulam notabilem videre potui, licet in variis cadaveribus in eam magno studio inquisiverim. In *omento* nonnulli ubique, ubi pinguedo continetur, glandulas statuunt, pinguedinem secernentes *b)*: verum paucissimæ tantum, præsertim ubi pyloro iungitur, subinde reperiuntur, *omentales* dictæ, & pinguedo hæc ex arteriolis, sicuti aliis in partibus, secernitur. In *vesicula felle* *bovum* sæpius parvas glandulas flavas, ceruminosis in meatu auditorio haud absimiles, vidi. In humana vero quandoque tantum eas videre potui. *c)* *Vesica & ureteres* interdum parvas glandulas ostendunt, & quidem in his hinc inde, nullo certo in loco, apparent; in illa vero maxime

a) loco citato.

b) Hippocrates lib. de Glandul. multa loquitur de glandulis epiploï sive omenti: sed voce epiploï mesenterium intellexisse mihi videtur.

c) vid. Ephem. Nat. Curios. Cent. V & VI. pag. 343. Tab. VI. fig. I. & II.

me prope collum, attamen raro conspicuæ
nt.

392. In partibus genitalibus virorum occur-^{in partibus}
unt 1. *Glandula Cowperi*, de quibus pag. 99,^{genitalibus}
infra Nota (29^{*}). 2. *Glandula Littrii*, itidem
pag. 99 descripta. 3. *Glandula odorifera Tysonis*,
præputio & corona penis, pag. 97. & 98:
uarum tamen illæ, quæ in præputii parte in-
teriori existunt, frequentius se mihi obtule-
runt, quam eæ in corona penis: ubi valde dif-
cile est eas a papillis nerveis, ibidem occur-
rentibus, distinguere. 4. *Prostata*, quæ pag. 96
descriptæ sunt. 5. *Glandula vesicularum semi-*
alium raro quidem occurrunt: aliquando ta-
men eas feminis sinapi magnitudine conspexi.
HARDEVS a) vero scribit, se eas, una cum fo-
raminulo excretorio, tantas vidisse, ut fetam
in eas immittere potuisset; ideoque maximas
intestinorum crassorum æquaverint. 6. *Glan-*
ulas parvas in urethra virili describit TERRA-
EVUS b), quas hinc inde in ipsa cavernosa ure-
thræ parte hæere perhibet, urethram multis
foraminulis perforantes, & liquidum lubricum
in eam excernentes. Harum vero nullam ad-
huc offendere potui. Hoc vero vidi, quod
MORGAGNIUS scripsit c), *foraminula* scilicet illa,
retento intus liquore, turgidula non raro, specie
tubrotundorum, albescentiumque corpusculorum im-
ponere. Testes vero cum epididymidibus a glan-
dulis propterea distinguo, quia manifesto vas-
culosi sunt, *habitu glandula* destituuntur, &
veteres

a) in prodrom. physiologico.

b) in Tract. de Glandulis, pag. 32.

c) Adversar. anat. prim. §. 12.

veteres & plerique ex recentioribus eos quoque a glandulis distinxerunt.

393. *In partibus mulierum naturalibus* ad glandulas referri possunt, 1. eæ, quas MORGAGNIUS in nymphis detexit atque descripsit *a)*, magnam cum odoriferis præputii penis similitudinem habentes. Hæ glandulæ quidem non in omnibus feminis æque magnæ & conspicuæ sunt, ut ab ipso delineantur: quod inde fieri existimo, quia ipsæ nymphæ in diversis subiectis figura & magnitudine multum diversæ sunt: & ubi nymphæ valde exiguæ, ibi hæ glandulæ vix in conspectum veniunt: contra vero, ubi illæ magnæ, glandulæ hæ quoque manifestius se ostendere solent, eæque utplurimum tanto maiores, quanto nymphæ maiores existunt. Ita enim in muliere, nymphas valde amplas & simul crassas habente, nonnullas eadem magnitudine offendi, quali a MORGAGNIO delineantur. In aliis autem eas vix, aut prorsus non conspiciere potui. 2. *Glandulæ in urethra muliebri* æque ac in virili statuuntur. *b)* Meis quidem observationibus ductulos in urethra vidi, at nullas glandulas videre potui. 3. Circa *urethræ vero ostium in vagina uteri*, ubi lacunæ se manifestant, fetas admittentes, in cadaveribus quandoque glandulas subiacentes offendi, qualem valde insignem MORGAGNIUS *c)* delineat. Has vero & nympharum glandulas sæpius valde turgere obser-

vavi

a) Advers. anat. I. Tab. III. cc.

b) Bidloo Anatom. Tab. 51. fig. 3. *Terraneus* de glandulapag. 44. & alibi.

c) loc. cit. H.

vavi partus tempore, quando mulieribus in partu difficili, vertendo atque extrahendo fœtum, adstiti: quia tunc partibus his a sanguine, copiosius influente, turgescunt, omnia melius in conspectum prodeunt, quam in cadaveribus: ubi non raro, neque ductus, neque glandulæ apparent. 4. *Vesicula circa uteri orificium internum* sæpe occurrentes, p. 104.) in gravidis & puerperis optime apparentes, pro *ovario novo* a quibusdam reputatæ, non pro glandulis haberi posse censeo: partim quia faciem sive *habitum* glandulæ non obtinent, partim quia confusio inde oriretur vesiculosi & glandulosi: quippe quæ partes a veteribus semper pro distinctis partibus habitæ fuerunt, ideoque & hodie non confundendæ, sed pro diversis habendæ sunt; alias enim *ovarium* quoque aliæque partes vesiculosæ in glandulas transmutarentur. 5. In utero nonnulli glandulas statuunt, pro sanguinis menstrui secretionem perficienda: quod præter alios *Littrius* præsertim sæpe fecit in Historia Academia Regiæ. Non quod eas viderit; aut figuram, magnitudinem, vel habitum earum descripserit; (nam non entis nullæ sunt affectiones) (verum solum, quia falsa illa hypothesi imbutus erat, *nullam fieri secretionem sine glandulis*).

394. In *placenta uteri* ob eandem forte *glandulam* hypothesein varii glandulas statuerunt, & *placenta*. nonnulli adhuc statuunt: licet nullus, quomodo se habeant, descripserit aut demonstraverit. E contrario frequentes *Ruysschii* observationes variis in scriptis eius iteratæ, diligentes placen-

tæ pervestigationes *Ranholti a)* itemque nostra aliorumque in hac parte adhibita diligentia, glandulas nullas hic detegere valuerunt; verum eam ex meris vasis sanguiferis coagmentatam esse, satis evicisse opinor.

glandula
artuum.

395. *Glandula ad artus sive extremitates* pertinentes, sunt 1. *Axillares*, sub alis, pinguedini involutæ, vasis axillaribus adsitæ; & 2. *Inguinales*, utrinque in inguinibus ad vasa cruralia collocatæ; quæ variis in morbis sæpe intumescunt, inflammantur & in abscessus vel quandoque scirrhus insanabiles tendunt. Harum vero usus haud manifestus est. 3. In artubus occurrunt quoque *Glandulae Haverianæ b)*, ab usu *mucosæ* dictæ: quæ in articulationibus ossium, præcipue femoris, tam ubi cum acetabulo ossis innominati, quam ubi cum Tibia iungitur, quam maxime observantur. In aliis quidem iuncturis quoque tales reperiuntur, verum longe minores. Hæ glandulæ omnium mollissimæ sunt, & *liquidum mucosum* fecernunt, quod in iuncturis ossium deprehenditur, pro extremis eorum lubricandis, ut motus libere atque expedite fieri queant; & ne invicem concrecant. Hæ glandulæ multum ad pinguedinis quandam subtilem speciem accedunt, qualis etiam *in interstitiis quorundam muscutorum*, itemque *in canali vertebrarum, circa spinalem medullam* deprehenditur; ita ut ambiguum sæpe sit, utrum vera glandula, an pinguedo quædam laxior, cui *Ruy-schio* & mihi similior videtur, adsit. Ceterum

a) in Histor. Acad. Reg. A. 1714, 1715. & 1718.

b) in Osteologia Haveri descriptæ.

rum etiam *circa scapulam, flexuram cubiti, manus, genu, pedis*, aliisque in locis *inter musculos* variæ hinc inde parvæ glandulæ reperiuntur: quas vero omnes figillatim hic recensere, cum earum incertus numerus, situs, figura, & magnitudo, tum compendii brevitās prohibent.

396. Restat, ut pauca adhuc de *glandulis cutaneis* dicamus. VERHEYENVS a) inquit STENONEM observasse, singulis poris cutis suam glandulam subiacere, ex qua vasculum sudoriferum, in exteriorē cutis superficie desinens, exurgeret: & inde VERHEYENVS, licet ipse se tales vidisse non affirmet, eas *glandulas subcutaneas* appellat. Sed, quot, quæso, tales glandulæ adessent, si omnibus poris (quorum infinitus est numerus,) glandula subesset? tantus certe numerus visum effugere non posset. Attamen, si cutis a subiecta pinguedine exacte separatur, nullæ glandulæ, neque in superficie pinguedinis, neque in inferiori cutis facie conspiciuntur. Pinguedinis quidem exiguæ particulæ foveolis cutis hinc inde adhærere semper deprehenduntur, quæ multis imposuisse videntur, & quæ mihi quoque in iuventute, ab uno præceptorum meorum, pro glandulis demonstratæ sunt; quæ vero a glandulis ab accurato spectatore nullo negotio distinguuntur. Hinc certum esse puto, *glandulas subcutaneas*, id est, tales, quæ cuti sub quovis poro subiacerent, quasque miliares vulgo appellant, non dari. Videtur potius hypothesin hanc a falso illo

a) Anatom. cap. de cute, cap. 35.

axiomate ortam esse, *ubique secretio, ibi glandula* : dum enim STENO aliique cognoverunt, e singulo *poro* fieri excretionem; hinc ex illo axiomate iudicasse videntur, etiam cuivis *poro* glandulam subiacere; quod vero falsum esse iam supra N. 364 probavimus. In ipsa vero cute, aut superficie eius exteriori, sub epidermide, variis in locis *corpuscula sphaeroidæa*, una cum ductulo excretorio sæpe conspiciuntur, præsertim in *palpebris, naso, auribus, areolis mamillarum, sub alis, in cute penis & scroti, circa anum & pudenda mulierum &c.* quæ si tanquam peculiaris corpuscula adfunt, pro *glandulis cutaneis*, sed non pro *subcutaneis* haberi possunt : quia non sub cute, deprehenduntur.

opificis de
illis.

397. Circa quas vero adhuc notamus, 1. *eas non aequè copiosas, nec aequè magnas, in omnibus occurrere* : nam in quibusdam *nasus & palpebra* corpusculis talibus miliari magnitudine scatent, eisque totæ exasperatæ sunt, ita, ut notabilis faciei deformitas inde inducatur; in quibusdam vero paucissimæ, eæque exiguae; in aliis vero prorsus nullæ conspiciuntur. Sic *cutis penis & scroti* quorundam talibus corpusculis valde luxuriat; in aliis contra vix ulla, vel nulla prorsus reperiuntur, Ita in *areolis mammarum* rarius tam magna deprehenduntur, quam a MORGAGNIO delineata sunt a) Unde patet, *eas & numero & loco & magnitudine multum variare.* 2. Mihi aliisque variis adhuc dubium superesse, *utrum hæc tubercula ve-*

ra

a) Advers. anat. prim. Tab. IV. fig. 2.

ra sint glandula : & an non potius ductuli excretorii, ex arteriolis cutis provenientes, qui vel a densitate cuticulæ, vel a crassitudine materiæ contentæ obstruuntur, & deinde in tubercula expanduntur. Ita etiam sentiunt RUYSCHIVS & BOERHAVIVS ; a) qui eas propterea *folliculos, cryptas, sive receptacula cutanea*, appellant. Ita quoque sentit VERCELLONIVS : dum affirmat b), *glandulas sebaceas* (ita enim recentiores hæc tubercula appellant) *meras esse extremitates arteriolarum in folliculos expansas* : ut & BIANCHVS, dum glandulas cutaneas nec esse, nec necessarias esse ad secretionem in cute iudicat. c) *Ratio etiam suadere videtur, has particulas globosas non esse veras glandulas* : 1. quia in tam multis hominibus sanis prorsus defunt, vel saltem variis in locis non in conspectum prodeunt. 2. Quia, postquam digitis contenta sive stagnans materia viscida aut sebacea exprimitur, totum tuberculum disparet, & pars concidit : id quod non fieret, si tuberculum vera glandula, hoc est, peculiare quoddam corpusculum, ex vasculorum congerie, peculiari membrana inclusum fuisset, licet aliquid inde fuisset expressum. Igitur hanc rem, & multa alia circa glandulas momenta, uberiori eruditorum disquisitioni commendo, antequam aliquid certi de iis affirmetur : ut sic veritas indies augeatur, atque promoveatur.

398. Hancce meam de glandulis sententiam, *Michelotti* tanquam claram, perspicuam, cum natura glandulæ obiectio-
bus respon-
dula- detur.

c 3

a) Ruysschii Advers. anat. Dec. I. pag. 9.

b) Dissert. de Glandul. conglomer. ætrophagi, pag. 150.

c) in Hepatis Historia.

dularum, & cum mente veterum, imo & cum vulgi de glandulis idea optime convenientem, multis hucusque eruditis haud displicuisse intellexi: imo a Medico Gallo tanti fuit habita, ut totam meam Adenologiam præcedentis editionis verbatim Gallice verterit & in suam Anatomem transtulerit. a) Neque ullum novi, qui hanc meam sententiam adhuc impugnaverit, nisi Clariss. *Michelottum*, Medicum & Mathematicum Venetum nobilissimum, in tractatu *de separatione fluidorum in corpore animali*: qui fingit, se ignorare, quid per *peculiarem glandularum habitum* velim, dum scribit: „Neque vero eos de sententia (scilicet Malpighiana) deducunt, quæ Heisterus per *peculiarem habitum*, nescio quem, definire conatus, nuperrime opposuit, pag. 234. „Sed præterquam quod vulgus & mulieres glandulas ex solo & noto eorum *habitu*, non ex libris, non aliunde, non ex definitione aut descriptione vel doctissima cognoscunt, ipse *Michelottus* satis indicat, se hunc *glandularum habitum* haud ignorare, atque sic meam glandulæ descriptionem non adeo obscuram esse, quando pag. 235. ita habet: „Facile concederem, de glandularum maiorum, & quarundam minorum *structura exteriori* per faciem quandam, seu habitum exterioriorem *iudicari posse* &c. „Consentit præterea mecum, non omnes secretiones sive separationes fluidorum interventu vesiculæ aut folliculi fieri, sicut *Malpighii* rigidiores asseclæ voluerunt, dum ait: „Ceterum convenit mihi cum

a) Noguez Anatomie du corps de l'homme. 12. Paris 1723.

cum Heistero, separationes fluidorum in animalibus sine folliculis, sive vesiculis interiectis, & fieri posse, & re vera etiam plerisque in partibus ita fieri. Verum sustinet, abditam & penitissimam glandularum, & praecipue minimarum, constitutionem, non in singulari exteriori facie sive habitu; sed potissimum in earum structura vasculosa, fluidorum separationi maxime opportuna, consistere: atque inde concludit pag. 236. cerebri partem corticalem, hepatis, renum atque testiculorum partes vasculosas penitissimas in glandularum numerum referendas esse. Verum hæc sententia iam supra n. 368. & seqq. satis, ut opinor, refutata est: dum demonstravi, confusionem partium inde oriri, quando inter partes vasculosas & glandulosas, ab antiquissimis temporibus distinctas, distinctionem iam tollere velimus, ita enim quælibet fere pars corporis fieret glandula: quod profecto valde incongruum esset: dum scapha, scapha, & quælibet res suo proprio nomine, si distincte, clare & accurate loqui atque iudicare velimus, appellanda sit. Præterea Auctor doctissimus ex sua de glandula idea, quam in sola structura vasculosa consistere indicat, non male eos sentire existimat, qui, ubicunque secretiones, sive liquorum separationes, ibidem glandulas esse pronuntiant. Sed & hanc sententiam confusiones & errores parere, quoque iam supra n. 364. 393- & 395. indicavi: quia chylus sine glandulis in intestinis, pinguedo sine glandulis, mucus in sinibus pituitariis, genitura in testiculorum vasculosa fabrica, sanguis menstruus in

utero sine glandulis &c. fecernuntur, & omnes membranæ, imo omnes fere partes glandulæ in posterum essent vocandæ: quod re vera neque cum sententia veterum, neque cum natura partium convenit, atque ab idea, quam vel vulgus, vel alii sapientes, qui Medici aut Anatomici non sunt, de partibus habent, qui glandulas, musculos, pinguedinem, membranas, intestina, vasa &c. facie satis distinguunt, nimis abhorret. Veniunt mihi occasione huius iam in mentem aliquot disticha, quæ aliquando in honorem cuiusdam Medicinæ Candidati, de glandulis disputantis, Altorfii adhuc confeci: quæ quia non male huc quadrant, apponere lubet.

Dicere difficile est Medicis, quæ *glandula*
pars sit;

Nondum Doctores hoc docuere satis.
Corporis hinc omnes mire confundere partes

Cœperunt, & pars *glandula* quævis erat.
Nunc quivis plexus vasorum *glandula* dictus;
Nunc membrana omnis *glandula* facta
fuit.

Mox cerebrum, splen, pulmo, iecur, renesque
vocati

Glandula; nunc quævis *bullula* talis erat.
Ast qui distinguit partes, quas visus & usus
Distingunt priscus, rectius ille docet.

Quapropter quamvis & ego glandulæ abditam
& penitissimam substantiam vasculosam esse in
definitione mea §. 33. posuerim, tamen quia
quam plurimæ partes vasculosæ existunt, quæ
imme-

immerito & non nisi nimio novaturiendi studio glandulæ vocarentur cum Malpighianis, hac in Adenologia ostendi, vesiculofum & vasculofum esse ad glandulæ definitionem non sufficere: & cum nec secretio, ut modo evici, neque aliud quid, mihi hætenus notum, sufficiat ad glandulas re vera & extra controversiam tales, quasque veteres ita appellarunt, ab aliis partibus distinguendas, *faciem illam peculiarem sive habitum glandulæ proprium*, pro iis ab aliis rite discernendis in auxilium vocandum esse, merito iudicavi & adhuc iudico: atque has forte ob causas egregius Anatomicus Argentoratensis, *Henricus Albert. Nicolai*, hypothesein *Michelotti* de glandulis *precariam esse*, pronunciavit dissert. de directione vasorum, pag. 7.

399. Neque a mea me abducunt sententia, ^{atque etiam Boerhavius} quæ Clariss. *Boerhavius* prolixa epistola ad *Ruyschium* in favorem hypotheseos Malpighianæ in medium produxit. Sciendum enim est, *Ruyschium* atque *Boerhavius*, Medicos in Belgio principes, meosque olim Præceptores æternum venerandos, sæpius amice de glandulis coram disputasse. Cumque *Ruyschius* pro sua, *Boerhavius* pro Malpighiana staret hypothese, convenerunt inter se, ut *Boerhavius* epistola, ea, quæ pro Malpighii sententia facerent, complecteretur; *Ruyschius* contra hæc, si posset, responsione impugnaret, everteret, suamque uberius illustraret atque vindicaret sententiam: idque postquam factum esset, binæ hæ epistolæ titulo opusculi Anatomici *de fabrica glandula-*

dularum in corpore humano, evulgatae sunt. a) In priori harum *Boerhavius* summa, qua pollet, ingenii vi omnia produxit argumenta, quae pro *Malpighiana* moveri possunt hypothese: quamvis, ut ipse fatetur, saepius minus a *Ruyschio* dissentiat, quam ex verbis ipsius colligi possit: quibus deinde in posterioribus literis *Ruyschius* nervose respondit. Attamen, quia nonnulla haud exigui in hac doctrina momenti superesse puto argumenta contra *Malpighium*, quae *Ruyschius*, tunc fere nonagenarius, & negotiis multis, laboribusque Anatomicis continuo distractus, imo obrutus, praetermisit, venia nobilissimorum horum Virorum, inprimis *Boerhavi*, mihi semper amicissimi, non contradicendi, sed veri studio, quaedam adhuc pro *Ruyschiana* meaque firmanda sententia proponam, & responsioni *Ruyschianae* quasi superaddam. *Malpighius*, & qui eum sequuntur, atque adhuc ipse *Michelottus*, glandulam *vesicula*, vel *folliculo* membranaceo construi, sicut iam supra satis exposui, docuerunt. Verum *Boerhavius*, qui tamen *Malpighii* partes, si servari possent, maiori studio & acumine, quam forte unquam alius, defendendas suscepit, in hoc mox ab huius sententia recedere videtur, dum glandulam *simplicissimam* definit *partem*, quae *proprie membrana simplici apparatus format involucrum, cavum, intra quod singularis humor secernitur* &c. pag. 3. & 4. Verum cum *involucrum*, ut notum est, nihil aliud proprie sit, quam integumentum; integumentum

a) Lugduni Batavorum A. 1722. in 4.

tum vero alicuius partis non sit ipsa pars, ut involucrum hepatis, non est ipsum hepar: atque sic involucrum glandulæ, (venia tanti viri) non est ipsa glandula: idcirco *involucrum* pro glandula ipsa recte ac citra confusionem sumi aut haberi non potest. Quod si vero Clariss. Auctor *involucri* voce, novo eoque inusitato & improprio utatur sensu, pro folliculo aut vesicula, cum Malpighianis reliquis, præter ea, quæ supra iam hac de re disputata sunt, hoc solum adhuc hic monebo, atque æquis arbitris iudicandum relinquam, annon, si *vesiculam*, *folliculum* aut *involucrum* pro glandula habere velint, vesiculæ & glandulæ voci novam prorsus atque veteribus inusitatam, imo incognitam prorsus significationem affingant, atque utramque confundant? Velim enim, ut demonstrent, quis auctorum veterum, Græcorum aut Latinorum, aut quis ante Malpighium, *vesiculam*, *folliculum* aut *involucrum* pro glandula habuerit, aut glandulam vocaverit? Manifestum enim est, novas eiusmodi significationes vocabulorum hodie sine confusione rerum introduci non posse: nam est re vera nova prorsus ac veteribus incognita vocis glandulæ & vesiculæ notio, quæ præterquam quod nova, &, me iudice, incongrua sit, non modo præter necessitatem excogitata est; sed etiam ad confusiones & errores producendos aperte facit. Concedo quidem summis his Viris, dari in corpore humano, variis in partibus, vesiculas aut folliculos, *intra quos liquida diversa secernuntur, continentur, foveantur, mutantur,*

tantur, & per emissarium denique excernuntur; verum nego has partes glandulas recte aut iure vocari. Nam vesica urinæ, vesicula fells, vesiculæ feminales, vesiculæ in sinubus ossium cranii, partes sunt cavæ, intra quas liquida diversa secernuntur, continentur, foveantur, mutantur, & per certa emissaria denique emittuntur, habentque sic omnia requisita, quæ a Clariss. Boerhavio glandulæ adscribuntur: nemo tamen veterum, nemo recentiorum, has partes glandulas vocavit, aut glandulas esse voluit; verum suo genuino eas nomine vesicas, aut vesiculas, omni ævo appellarunt. Quare si etiam clare demonstrantur vesiculæ, variis in corporis partibus, in quibus vel re vera adsunt, ut in cute, vel in quibus eæ adhuc in statu secundum naturam sunt dubiæ, in quas liquidum quoddam secernatur, contineatur, foveatur, mutantur, & per emissarium emittatur: tamen inde non evincitur, glandulas esse in illa parte; sed vesiculas: eamque ob causam eæ etiam partes non glandulosæ, sed vesiculosæ appellandæ erunt: quia ut vesicæ vel vesiculæ maiores, quas antea nominavimus, se habent, adeoque & idem nomen ipsis dandum est; nisi data opera æquivocationes, logomachias & confusiones in rem anatomicam & medicam magno eius damno invehere velimus: nam iuxta tritum illud:

Errorum genitrix est æquivocatio semper. Vbi igitur non nisi vascula deprehenduntur, illæ partes *vasculosæ*; ubi vesicæ, illæ *vesiculosæ*; ubi vero glandulæ, illæ etiam *glandulosæ* vel
gland.

glandula appellandæ sunt. Itaque in cutis variis partibus, ut in naso, auriculis aliisque partibus folliculi aut vesiculæ deprehenduntur, in quibus liquidum unctuosum: illudque sæpe tenax & sebaceum reperitur. Hæ vesiculæ sive folliculi, quia sunt vesiculæ, & nullam, me iudice, faciem glandulæ obtinent, ob rationes expositas, immerito glandulæ appellantur; verum rectius *folliculi*, *receptacula*, *cryptæ*, omnium vero optime *vesicula cutanea* dicerentur: quia ea habent requisita, quæ vesicæ reliquæ supra nominatæ, & ab iis vix nisi magnitudine differunt. Cur itaque his vesiculis nomen vesiculæ denegent Malpighiani, aliudque haud congruum, novum, confusiones pariens & cum earum natura ac ratione non conveniens imponunt, causam gravem aut urgentem video nullam: supraque iam (§. 367) monui, quod si etiam in hepate, renibus, cerebro &c. in naturali ac sano statu vesiculas re vera adesse demonstrent, viscera tamen hæc immerito *glandulosa*, sed *VESICULOSA*, ob causas modo & supra allatas, dicenda sint. Vbi vero vesiculæ eiusmodi glandulosa carne, id est, tali substantia cinctæ sunt, quæ glandulis, sive partibus, quas nemo glandulas esse negat, propria est, vel quæ *faciem & habitum glandulæ* omnibus notum obtinet, uti videmus adesse in glandulis abrorum *a*), asperæ arteriæ *b*), palati, pharyngis & intestinorum, præsertim duodeni & recti,

a) vid. Tab. nostra VIII. fig. 36. d d.

b) *Morgagn. Advers. anat.* I. Tab. II. 00.

Et, tunc hæ partes glandulæ iure & recte nominantur ; verum non *ob vesiculam*, ut Malpighiani volunt, multo minus ob *involutrum* membranaceum ; sed propter peculiarem earum faciem & carnem glandulosam, qua vesiculæ hæ cinguntur ; quippe ob solam hanc faciem, aut ut clarius loquar, ob hanc carnem propriam (non ob alias causas) ut supra evici, veteres certas corporis partes glandulosas appellarunt, (quorum nomina præter necessitatem non mutanda) adeoque & nobis non nisi tales partes glandulæ appellandæ sunt : alias, ut abunde demonstravi, æquivocationes, rerum & partium confusiones, atque errores necessario sequuntur ; quæ omnia evitantur, si a veteribus in glandularum appellatione non recedamus, sed cum ipsis, ut par est, consentiamus.

400. Denique adhuc monemus, tumores illos, quos Clariss. *Boerhavius* cum *Malpighio* in folliculis sive vesiculis cutaneis oriri & existere iudicat, ut atheromata, steatomata, talpas, &c. mea sententia non in cute oriri, sed sub cute : quotiescunque enim tumores eiusmodi, quod sæpe feci, scalpello extirpavi, non solum eos ante curationem sub cute actu percepi ; verum quando eos excidere volui, tota mihi semper cutis prius discindenda erat, antequam ad tumorem eiusque folliculum pervenire potuerim : quod etiam ex iis exemplis, quæ auctor clarissimus ipse vidit, & descripsit pag. 14 & 16, manifestum est. Vnde liquido constat, quam parum tota hæc de tumoribus cysticis recita-

recitatio ad glandularum cutanearum, alique morboſi caſus ad aliarum glandularum probationem faciant ; dum partes nimis a ſtatu naturali recedere poſſunt : præſertim cum veræ glandulæ vix unquam, partes vero vaſculoſæ ſæpiſſime in hydatides aut veſiculas mutantur : ubi quam maxime etiam ille caſus, in hoc libello recensitus, notatu digniſſimus eſt, ubi totum hepar in hydatides fuit mutatum, ut de vena portæ & vena cava nullum ſuperfuerit veſtigi-um : id quod enormem partium in morbis transmutationem docet, unde nihil de verâ partis fabrica diſci poteſt.

SCHOLION

HIPPOCRATEM in glandularum deſcriptione ad habitum earum potiffimum reſpexiſſe, ex eo inteligi poſſe puto, quando ita loquitur: a) *Natura ipſis eſt ſpongioſa : ſunt enim rare & pingues ; neque carnem habent reliquo corpori ſimilem, neque aliud quid corpori ſimile, ſed friabilem, & multis venis (hoc eſt vaſis) refertam.*

NOTAE, SIVE ILLUSTRATIONES
quorundam locorum, quæ tabulis noſtris
anatomicis commode inferi non
potuerunt.

Nota (I*) ad finem pag. 60. Solertiſſimus quon-
dam noſter per quadriennium, & quod excur-
ſit, auditor, Dn. Chriſt. Iac. Trevv, nunc Me-
dicina Doct̃or Norimbergæ celeberr. obſervationem
anatomicam, Ephemeridum Centur. VI, Anno 1717,
per

a) Lib. de Glandulis.

per me inferi curavit, quæ ibidem pag. 245 legitur, de officulis quibusdam sesamoideis, quæ suo Marte, in cadaveribus variis, in Theatro anatomico Altorfino a me dissectis, invenit, & in hac Observatione, tanquam nova, descripsit, atque delineavit. Hac vero observatio, licet sub TREVVII nomine a me transmissa fuerit; certas tamen ob causas ab illustribus harum Ephemeridum directoribus, paucis mutatis, sub meo nomine, me tamen inscio & inconsulto, impressa est; quod propterea hic indicare volui, ne vel ipse D. TREVVIVS, vel alii, quibus illud notum fuit, existiment, me honori ipsius aliquid detrahere, aut mihi quid, quod tamen meum non est, tribuere voluisse: Ideoque totam illam observationem ad laudatum TREVVIVM pertinere, publice hic profiteor. Ceterum illa ab ipso descripta officula, præsertim ea, quæ in ossibus femorum locantur, antequam ea TREVVIVS nobis monstravit, ut verum fatear, ignoravi, & tunc tanquam nova consideravi: cum primis quia Cl. RAVIVS, meus olim in anatome, & præsertim in Osteologia, præceptor, (cui graves ob rationes fidem adhibueram) ea in demonstrationibus suis osteologicis non solum non demonstravit; sed etiam in Osteologia sua scripta, quam tunc temporis cum auditoribus suis communicavit, atque describendam dedit, aperte negavit, dum ita de ossibus sesamoideis locutus est: Notandum, inquit, me ossium numero non plura ossa sesamoidea adscribere, quam decem: duo scilicet, ad secundum articulum utriusque pollicis manus & pedis; unum in utroque tendine musculi tibialis

tibialis postici a) innatum: Ceteri digitorum articuli NVNQVAM hæc habent, rarissime prædictus tendo, &c. *Atque sic RAVIVS illa in femore & auriculari digito sita non tantum silet; verum etiam reliqua omnia sesamoidea, præter decem illa enarrata, negat. Deinde cum viderem HORNIVM in microcosmo suo, hujusque commentatores, (qui tamen viri fuerunt doctissimi) aliosque multos anatomicos, hæc ossicula quoque prætermisisse; itemque VERHEYENVUM b) illa in femore locata non sua observatione, sed tantum secundum BARTHOLINI assertionem commemorasse; imo MARCHETTVM, celebrem quoque anatomicum, asseverasse c), se nunquam hæc ossicula in femore a quibusdam descripta reperire potuisse, quamvis multis in cadaveribus ea investigaverit: hinc sententia RAVII, quem in ossibus & musculis egregie versatum sciebam, eo fortius adhærebam; præsertim cum ea etiam aliquoties, sed frustra, inquisiverim. Ast TREVVII demonstrationibus revera convincebar, dari omnino interdum ossa sesamoidea adhuc alia, quam quæ a RAVIO mihi indicata erant. Cum vero postea horum ossiculorum causa plures anatomicos pervolverem, atque ex variis cognoscerem, non unum, sed duo ossicula sesamoidea in ea femoris parte, ubi musculus gastrocnemii originem habent, in senibus non raro reperiri, & no-*

d mina-

a) Forte hic Ravius loco tibialis postici, peronei postici scribere voluit: ego enim Vesalius, alique, non in tibiali, sed in peronæo postico ossiculum sesamoideum invenimus.

b) in Anatom. Cap. de ossibus sesamoideis.

c) Anatom. Cap. XIX. ubi de musculis gastrocnemiis agit.

minatim ex VESALIO a) RIOLANO b) (qui primam inventionem eorum VESALIO adscribit) BARTHO-LINO c) MVNNICKIO d) DRACKIO e) &c. Ex FAL-LOPIO vero f) & COVVERO g) eos tantum unum ibi reperire potuisse, quod idem forte erit, quod TREVVIVS descripsit: hinc huius consensu hic mone-re volui, hæc ossicula non esse nova, sicuti pri-ma fronte ipsi, mihi, aliisque multis apparuerunt; attamen quia hoc tempore fere oblivioni data erant, & a nemine antea unquam mihi demonstrata vel indicata, imo a magnis Anatomicis variis frustra quesita, & hinc vel negata, vel saltem silentio præ-termissa, nec usquam delineata fuerunt; qua-propter, licet non nova sint, tamen curiosis anato-micis haud ingratum erit, quod TREVVIVS unum, & deinde ego etiam alterum in femore, oblivioni quasi tradita, non solum resuscitaverimus; sed etiam novis experimentis comprobaverimus, atque figuris naturali magnitudini respondentibus illu-straverimus: (conf. Tab. 1. fig. 2, 3, 4.) multum enim figura partium, nondum satis cognitarum, ad anatomen perficiendam exornandamque faciunt. Ita in vertebræ lumbaris primæ processu late-rali ossiculum sesamoideum lateri eius utrin-que adhærens & peculiari sinui insidens, se vi-disse commemorat Clar. Schulzius in Commmerc. litter. Universal. A. 1731. pag. 33.

(2*) ad

a) Corp. human. Anat. Cap. 28. Lib. I.

b) Antropograph. Lib. V. Cap. 43.

c) Anatom. Cap. de Ossib. sesamoideis.

d) de Re Anatomica §. LXV, ubi de his ossibus agit.

e) Anthropolog. pag. 729.

f) Observat. Anatom. mihi pag. 441.

g) Myetom. Reform. Cap. 34. p. 206.

(2*) ad §. 196, pag. 68. Explicatur generatio
 & regeneratio epidermidis *aliomodo a* CL. MOR- de epider-
 GNIO *in Adversar. Anatom. alteris pag. 13.* midis gene-
viminum, cuticula ipsi nihil aliud esse videtur, ratione,
 si ipsa summa cutis superficies, a compressio- preparatio-
 ne & vasis.
 ne externa indurata, & quasi callescens: unde
 sensilis & quasi emortua esset. Sed ingenio-
 huic coniectura obstare existimo, cuticula iam
 fœtu, utero adhuc incluso, præsentiam: ubi li-
 voris amnii mucilago, fœtum ambiens, non admit-
 tre vel efficere posse videtur, talem cutis com-
 pressionem, qualis ad cuticula productionem, exsic-
 cationem, & quasi callescentiam requireretur.
 præterea, quomodo cuticula & corpus reticulare
 Malpighii optime sint preparanda, egregie Ruy-
 schius docet, in *Advers. anat. Ill. p. 26.* ubi &
 anatomicum Anglum, cui S. Andreæ nomen, for-
 ter impugnat: qui non solum vasa epidermidi ad-
 scripsit; verum etiam affirmasse dicitur, se vasa
 hæc ita ita replere posse, ut rubra materia injecta
 valde turgerent, atque ubique libero oculo copiosissi-
 ma apparerent; quæ vero Ruyschius negavit.

(3*) ad §. 198. pag. 70. Recentiores nonnulli
 describunt glandulas, in cute hinc inde existen- de glandulis
 tes, quas sebaceas appellant, præsertim in auri- sebaceis.
 bus, palpebris, naso, areolis mammarum,
 scroto & penis cute, præputio, in nymphis &
 labris pudendorum muliebrium, circa anum,
 axillas sive alas, &c. ex quibus materia quedam
 crassa, sebo similis, hinc sebacea dicta, sæpe expri-
 mi potest. Has vero partes non nisi extrema-
 tes esse arteriarum, in folliculos expansas, con-

tendit BERGERVS a) & VERCELLONIVS. b) Deinde ea corpuscula potius Receptacula esse humoris oleosi, unctuarii, quam veras glandulas, docet BOERHAVIVS c), quæ subtili foramine, quod emissarium eorum est, epidermidem perforarent: atque hunc humorem ex cutis arterioliis minimis, in hac receptacula cutanea desinentibus, deponi; qui, dum seceratur, tenuis esset. Quando vero ex quacunque causa diutius ibi hareret, exhalante parte tenuissima, reliquum inspissari, cera sive sebi indolem adipisci, & tubercula creare, quæ glandulas referrent, in facie frequentia, imprimis in naso & fronte. Hac fortiter pressa, eructare materiem lentam, albam, sebaceam sive ceraceam, quæ sæpe exquisitè vermiculum repræsenteret, ut multi hac imagine decepti, putent, se vermes cutaneos vidisse. Inde postea pustularum, atheromatum, meliceridum, aliorumque morborum cutaneorum originem, perquam erudite, ut solet, deducere voluit. Hanc de ita dictis glandulis cutaneis opinionem non solum semper fovi, sed etiam, quamdiu Anatomem doceo, docui. Sed de his plura iam dicta sunt in Adenologia; ex quibus vero minimum id evictum esse credo, glandulas veras cutaneas tantæ copia non dari, ut cuiusvis foraminulo cutis insensibili, sive unicuique poro una subiecta sit: sicuti STENO & multi alii post eum, crediderunt atque docuerunt. Cl. Boerhavius, in epistola ad Ruyfchium de glandular. fabrica, hos folliculos pro veris glandulis habere videtur: cui vero & Ruyfchius

a) in Physiologia variis in locis.

b) in Dissert. de glandul. œsophagi pag. 150.

c) in Ruyfch. Advers. Anat. dec. I. p. 10. & seq.

chius in responsione sua contradicit, & nos de hac
 hypothesis N. 399. sententiam nostram exposuimus.
 (4*) ad § 205, pag. 75. Ligamentum, ita
 dictum Poupartii a), perhibetur esse ligamentum ^{de ligamen-}
 bustum a spina anteriori ossis ilei ad supremam ^{to Poupar-}
^{tii.} ^{tii.} pubis partem extensum: quo conniventiam
 musculorum abdominis, ubi processus peritonæi &
 vasa spermatica in viris transeunt, firmari perhi-
 bent, ne tam facile intestina prolabi, aut hernia
 generari queant. Sed recte MORGAGNIUS Advers.
 anat. III, pag. 2, negat hæc ligamenta, eaque ni-
 hil aliud esse sustinet, quam imam oram sive lim-
 bum tendinis musculi oblique descendentis: quæ
 etiam semper mea mens fuit, & propterea, ne en-
 ta præter necessitatem multiplicarentur, silentio
 hæc ligamenta in prima editione mei Compendii
 anatomici, tanquam partes seorsim non existentes,
 prætermisi. Consentit etiam nobiscum COVVE-
 PUS. b) Interea tamen robore suo ligamenti mu-
 sus præstare videtur, ne intestina facile prolabi &
 hernia hic generari queant: id quod Vesalius haud
 ignoravit, sed plane satis indicavit. c)
 (5*) ad §. 205, pag. 75. Celebris Tourne-
 fortius d) aliquando Medicis persuadere voluit, an a muscu-
 litum vomitum a folis musculis abdominis perfici: ve- ^{lis abdomi-}
^{nis vomitus.} ^{nis vomitus.} ^{nis vomitus.} ^{nis vomitus.} ^{nis vomitus.}
 um Schelhammerus iam dudum hanc sententi-
 am reiecit. e) Chiracus autem postea & Du Ver-
 neus vomitum a motu extraordinario diaphrag-
 matis & musculorum abdominis simul fieri susti-
 d 3 nue-

a) in Histor. Acad. Reg. Scient. A. 1705. pag. 64.
 b) in nova sua Myotomia, p. 2. & Tab. XIV. XV.
 c) de Fabrica corp. human. Lib. II. cap. 31. p. 334.
 d) in Catalog. plantar. Parisiens.
 e) in Analect. anatomi. Dissertat. VIII. in fine,

nuerunt, absque concursu ventriculi. a) Verum Littrius & hunc ad hanc actionem concurrere, gravibus rationibus evicit. b)

(6*) ad §. 206, pag. 76. Varii scriptores per-
 de glandulis hibernant, se in in peritonæo, pleura, & pericar-
 peritonæi, dio, corpuscula sphaeroidea (quæ glandulas esse
 pleura & volunt) observasse. Verum quia hæ observationes
 pericardii, omnes ex corporibus agris, sive ex statu morbofo,
 sunt desumptæ, & in sanis nunquam, quantum no-
 vi, adhuc vise; hinc potius existimo, hæc corpu-
 scula, glandulas representantia, nil nisi tubercula
 morbo producta existere, a stagnatione materia ter-
 restris, aut viscidæ, in minimis arteriis harum
 membranarum orta: quæ neglecta consideratio mul-
 tas in mente produxit, atque in anatomen præter
 necessitatem introduxit, glandulas, quæ in corpore
 animali sano re ipsa non existunt, & propterea
 in statu secundum naturam non reperiuntur. CHE-
 SELDENVS, recens scriptor Anglus, scribit, se in
 muliere hydropica peritonæum, tres pollices
 crassum, reperisse, & in hoc glandulas eius nudo
 oculo conspici potuisse. c) At, quis ex ingenti illa
 atque morbofo peritonæi mutatione non suspicabi-
 tur, corpuscula hæc, pro glandulis habita, glandu-
 las veras non esse, sed potius res novas morbo pro-
 ductas? Sicuti enim quandoque in quibusdam par-
 tibus calculi, ossicula, cartilagine, atheromata,
 steatomata, aliaque inusitata corpora producuntur,
 aut partes ipsæ in ossa, imo in lapides mutantur
 d), quas mutationes nemo facile pro statu naturali
 diu-

a) Histor. Acad. Reg. A. 1700. b) ibidem.

c) in anatome sua editionis primæ pag. 96.

d) exempla legi possunt in Histor. Acad. Reg. A. 1700.
 aliisque quamplurimis scriptoribus.

iudicando habebit : ita & hanc mutationem, pro naturali illarum partium statu inde cognoscendo, sumi non posse, credo. Neque video, quomodo arte probabunt, talia corpuscula, in statu præternaturam, eaque quandoque tantum apparentia, velle esse glandulas. Idem iudicandum esse puto de aliis similibus variorum auctorum observationibus, sicuti Adenologia nostra pluribus evicimus rationibus, ad quas varii recentes scriptores, qui post me de hoc argumento egerunt, non satis respexisse videntur.

(7*) ad §. 208. pag. 78. Foramen naturale, seu aperturam peculiarem, aut introitum in cavum omenti, invenit & descripsit Winslous a), celeberrimi Parisiensium Anatomicus, per quem omentum, pro conformatione ipsius naturali rectius demonstranda, flatu pulchre distendi potest. Hæc apertura investiganda sub magno lobo hepatis, inter ligamentum aliquod membranaceum, quod iungit principium duodeni & collum vesiculæ felleæ hepatis, a latere eminentiæ, quæ radix est parvi lobi dicti Spigelii, & ligamentum aliud, quod colon spectat pancreati. Hæc duo ligamenta, dum se uniunt, interstitium sive aperturam relinquunt, quemadmodum auctor scribit, quatuor vel quinque linearum diametri, in infante quatuor vel quinque annos nato, per quam aperturam ante dicta eminentia transit. Si per hanc magnus tubus immittitur, & reliquum aperture digitis constringitur, tota epiploï cavea flatu expandi potest, atque epiploon tunc sacculum, quem bursam Galli vocant, sed inæqualem, repræsentat ; cuius vero cavea, ut idem auctor notat, non solo epiploō conficitur,

d 4

verum

a) Hist. Acad. Reg. A. 1715. pag. 316. edit. Amstel,

verum etiam superficie superiori mesocoli, parte intestini coli & ventriculi, ac denique ea membrana, quæ intervallum occupat quod orificia duo ventriculi intercedit, quam membranam parvum epiploon appellat. Vsum huius aperturae esse existimat, ut humores, qui in cavo omenti forte colligerentur, per eam, homine præsertim dorso incumbente, effluere queant.

de ductibus
adiposis.

(8*) ad §. 208, pag. 78. Ductus adiposos (tanquam distincta vasa) ipse MALPIGHIUS in Oper. posthum. rursus in dubium vocat: neque eos necessarios esse, recte MORGAGNIUS innuit, *Advers. Anat.* III. pag. 3: quia hic, aque ac alibi, secretionem pinguedinis ex arteriis fieri posse censet, in cellulas adiposas, & ex his deinde eam quoque absorberi rursus posse a venis, sine interventu tertii cuiusdam generis vasorum, quale MALPIGHIUS olim adesse suspicatus erat. Negat hos ductus quoque Rivinus, dissertatione de Omento.

de fibris
carneis &
tunica cel-
lulosa ven-
triculi.

(9*) ad §. 209, pag. 79. Bene monet Clar. Morgagnius a), multa Fallopium de ventriculi structura, præsertim quæ ad fibrarum carnearum ordines attinent, docuisse, quæ postea Willisius pro suis descripsit. Helvetius vero longe alium fibrarum muscularium in ventriculo situm, cursum ac divisionem describit & delineat, quam ab aliis factum est. b) An vero semper ita se habeant, dubito: quia aliter eas vidi, atque adhuc ventriculos humanos flatu distentos atque siccatos asservo, in quibus alia ratione se ostendunt. Adeoque potius credo

a) *Adversar. Anatom.* III. p. 6.

b) *Histor. Acad. Reg. A.* 1719. pag. 41. & *Memor.* p. 444.

redo, variam in variis hominibus fibrarum harum
esse constitutionem. Præterea Santorinus vult,
fibras ventriculi carneas non annulares, sed spira-
les esse, hasque maxime in corporibus lacertosis pro-
pe pylorum conspici posse: a) quod vero distingue-
re difficile est. Clarius vero apparet tunica cel-
ulosa ventriculi, quam Morgagnius sub tunica
extima sive communi nuper indicavit, præsertim
ea in parte, quæ utraque eius ostia interiacet. b)

(9**) ad §. 209, pag. 79. Tunicam ventri-
culi villosam Malpighius negat c) quia a nervea ^{de papillis}
separari non posset; atque propterea tres tantum ^{& glandulis}
tunicas ventriculi numerat. Interea tamen villos ^{ventriculi.}
& papillas ventriculi non negat. Alii vero eas
negant, aut saltem in dubium vocant. Attamen
Ruyschius d) & Santorinus e) docuerunt, quo-
modo maceratione in aqua, præsertim tepida, con-
spiciæ reddi possint in homine; cum longe facilius
videri queant in ventriculis ovium, porcorum, ca-
num aliorumque animalium: ita, ut de his
mihi nullum amplius sit dubium. In hac tunica
etiam quandoque glandulas ventriculi, eorumque
oscula excretoria hiantia prope antrum pylori,
Morgagnius in viro notavit f); quo vero in loco
se tantum oscula vidisse Santorinus affirmat, quæ
siphunculos appellat. g)

(10*) ad §. 210, pag. 80. Glandulæ Brunne- ^{de glandulis}
ri quemadmodum ipse docet, in duodeno valde mag- ^{Brunneri.}
næ atque conspicuæ sunt, præsertim in infantibus,
d 5 diarrhoea

a) Observat. Anatom. pag. 165. b) Epist. anatom. l. n.
62. c) Epist. de glandul. p. 9. d) Advers. Anatom.
III. p. 34. e) Observat. Anatom. pag. 91. f) Ad-
vers. Anatom. III. pag. 6. g) Observat. Anatom. p. 164.

diarrhoea vel dysenteria mortuis: quæ vero ut etiam in aliis hominibus melius demonstrari possint, coquendum hoc intestinum in aqua esse scribit, donec fundum petat; postea a facie interiori, ablata tunica interna, investigande, sic optime apparebunt, præsertim in parte ventriculo vicina.

(11*) *ad §. 211, p. 82. Albinus in dissertatione inaugurali, Anno 1722. Lugduni Batavorum edita, novam tenuium intestinorum descriptionem exhibente, docuit, quomodo vertendo intestinum tenue, illudque scite inflando atque siccando, tunica nervea in cellulofam elegantem & novam, a Ruyfchiana diversam, mutari queat: quod facile succedere ipsemet expertus sum, si modo experimentum legitime instituatur. Varia præterea notatu digna & de aliis intestinorum horum partibus, eadem in dissertatione, idem auctor protulit: ut, exempli gratia, quod cellulosa Ruyfchii sit inter externam membranaceam communem ac musculosam, & totum canalem intestinale non cingat, sed deficiat in parte mediastino aversa, sitque mesenterii propago; sua vero nova existat inter villosam & musculosam, constituat ipsam nerveam, cingatque totum intestinorum cavum. a)*
Deinde quod fibræ longitudinales carneæ tantum

a) *Helvetius etiam in Histor. Acad. Reg. Scient. A. 1721. (quæ vero A. 1725. demum in Belgio prodiit) meminit, se duas in intestinis tunicas cellulofas novas invenisse; quarum alteram ponit inter muscularem & nerveam, alteram, inter nerveam & villosam, quæ forte eadem erit ac Albini. Attamen monet, se has membranas nondum satis examinasse.*

um sint in parte mesenterio opposita a), & quod non sint ut fila per totam intestinorum longitudinem extensa; sed interrupta ad similitudinem quasi musculorum rectorum abdominis. Porro quod annulares mesenterio ut tendini, non sint insertæ, sicut Willisius voluit; contractionem tamen earum versus mesenterium fieri. Præterea, quod inflatione nerveæ sive novæ suæ cellulosæ omnes rugæ & valvula horum intestinorum evanescant ilico, & quod hoc artificio simul tunica villosa a nervea (quæ alia methodo non nisi difficillime recedit) separari queat. Denique quod villi in tunica villosa maceratione levi in aqua tepida & crebra eiusdem ablutione egregie spectabiles reddi queant, si detergo lubrico muco intestinum inversum in liquore limpidio suspendatur; qui villi adhuc crassiores fierent, (præsertim illi, qui cum venis communicant) si cera prius probe infarcti sint. Tandem quod venæ intestinorum per arterias, arteriæ vero per venas cera impleri possint, & per utramque cera usque in cavum intestinorum pelli queat: quodque cera tunc instar vermiculorum (si intestinum caute aperiatur) tunica intima villulis adhæreat: id quod multis egregiis meditationibus occasionem præbet.

(12*) ad §. 211, pag. 82. Intima intestinorum tunica vulgo villosa appellatur anatomicis, quia parvi ac tenues villi, quasi in holoserico, in ea observantur b), præser-

a) Helvetius contrarium sustinet, atque longitudinales prope mesenterium fortissimas esse scribit pag. 397. Attamen in ultimis inquisitionibus eas in parte mesenterio opposita quam maxime vidi, ut Albinus.

b) vid. Bartholin. Anatom. quantum renovata pag. 297. fig. 1. Manget. Theatr. anat. Tab. 69, fig. 7. Pecblin. de purgantib. Tab. 11, fig. 3.

praesertim in canibus, porcis, aliisque nonnullis animalibus, si in aqua tepida, saepius mutanda, per unum alteramve diem maceratur, & subinde probe agitur. Sed Ruyschius notavit, papillas quoque in hac tunica existere, eamque ob causam eam villo-papillofam appellavit. a) Helvetius vero villos, quæ pilis similes sint, in hac tunica prorsus negat, eamque ex folis & meris papillis spongiosis, planis (quas quoque, quemadmodum microscopio apparent, delineat) irregularis figuræ, atque foraminulis fere insensibilibus pertusis constare proponit, quibus foraminulis chylum sorberi & ad vasa lactea deduci contendit b): quæ de causa etiam eam novo nomine membranam papillarem appellat. Quoniam vero hæ papillæ non nisi exquisitis microscopiis patent, & oculis nudis, ut villi in holoserico apparent, imo ipsis microscopiis villi simul observantur, nomen usitatum tunicæ villosæ non mutandum, sed retinendum esse censeo. Conf. quæ de hac tunica nota præcedenti dicta sunt, tunc usus eius, de quo & Albinus & Helvetius eleganter differunt, tanto erit manifestior. Helvetius etiam eodem loco fibras carneas, quas anatomici vel annulares vel spirales esse volunt, tales esse negat; sed ut irregulares & tanquam sectiones circulorum in fasciculos collectas proponit atque delineat: quas vero ita videre nondum potui.

(13) ad pag. 84. Præter hic citatos vasorum lacteorum observatores, Rolfincius in dissertat. anatom. Lib. V. cap. 22. pag. 906. adhuc alios adducit*

a) Adversar. Anatom. I. pag. 25.

b) Histor. Academ. Reg. A. 1721, p. 35. & Memor. p. 392.

adducit auctores, quos vasa hæc vidisse existat: & quidem ex veteribus ipsum Hippocratem & Arabes; ex recentioribus vero Vesalium, Fallopium & Varolium, quorum ipsissima verba refert. Conf. etiam Almeloventii *Inventa Nov. antiqua* §. XXIII. Sed hos omnes in animabus tantum ea vidisse verisimile esse, indicat Morgagnus a); verum Cæcilium Folium ea in homine primum observasse.

(14*) ad pag. 84. Anno 1717. juvenis robustus, de vasis lacteisque corporis humani a me observatis. postquam in nundinis Altorfio vicini oppidi bene æstus ac potus, & forte ebrius, vesperi domum reaire vellet, incidit in foveam profundam, aqua repletam, ibidemque suffocatus perit. Altero die ab Illustribus Academiae Altorfinæ Curatoribus ad sectionem publicam mihi transmittebatur: quo die tegumentis communibus, musculisque abdominalibus demonstrandis occupatus eram. Sequenti die, cum ad interiora perlustranda progrederer, in intestinis tenuibus & mesenterio, tertio hoc a morte æte, in magna studiosorum corona, tantam vasorum lacteorum deprehendi copiam, mox sub membrana mesenterii, super pinguedine eius reptantium, ut sane intestina & mesenterium his vasis, liquido candidissimo lacteo plenis, essent refertissima: quæ copiam lacteorum, alias in canibus, optime licet pastis, occurrentium, longe superabant. In his enim plerumque tantum tractum vasorum mesenterii sequuntur; verum in hoc homine promiscue per totum mesenterium, frequentissimis intersectionibus sive anastomosibus se extendebant, & non-

a) Epist. anatom. I. num. 85.

& nonnulla in glandulas, intestinis vicinas, mox ingrediebantur: alia vero partim pinguedini mesenterii immergebantur, ut progressus eorum videri non potuerit; partim ad remotiores glandulas abibant, sicuti ea Tab. 11. fig. 8. delineari curavi, quæ vero & pictor & sculptor satis copiosa & subtilia representare non potuerunt. Deinde Anno 1718. mensis Aprilis, in cadavere iuvenis, phthisi extincti, presentibus aliquot studiosis Medicinæ, vasa lactea, viginti quatuor horis post mortem, copiosissima rursus & eodem modo reptantia observavi: imo in hoc cadavere, & postea adhuc in alio, ea ex ipso intestino duodeno, (quod nonnulli negare audent) provenire, accurate perspeximus: Anno 1719. in duodeno, prope pylorum, iterum vas magnum lacteum vidi: atque ab eo tempore adhuc aliquoties vasa lactea in intestinis tenuibus humanis, sed non adeo turgida, ut in prioribus, conspexi, & spectatoribus demonstravi. Quia vero rarissime in homine, præsertim adeo copiosa se exhibent, atque ea, quæ hucusque Anatomici delinearunt, solum ex brutis desumpta esse videntur; eorum in homine constitutionem, & a brutorum lacteis diversitatem, figura aliquo modo ostendere volumus. Exhibuit quidem NVCKIUS, Adenograph. fig. 1X, vasa lactea (ut scribit) ex homine; verum adeo pauca in tanto frusto intestini sistit, ut cum caninis melius conveniant: nam in ambobus hisce nostris cadaveribus minimum decuplo plura adfuerunt. Valvula, quas hic in iis speciosas & magnas delineat, prorsus non apparuerunt; verum vasa lactea in hominibus ita se habebant, sicuti a nobis delineata sunt; valvula enim & tubercula

ula horum vasorum tunc apparent, quando in
 nimantibus recens mactatis ligantur. In priori
 adavere, quia iuvenis ille, in media quasi dige-
 sione, cibo & potu bene repletus, aqua subito suf-
 focabatur, hinc simul motus chyli in vasis chylife-
 ris, ad satietatem usque repletis, sistebatur: un-
 de factum esse puto, ut in eo tam egregie conspici
 potuerint. Alteri vero iuveni phthisico, ad extre-
 mum fere halitum, gelatina, iuscula, succolata,
 emulsiones, & similia roborantia ingesta fuerant:
 inde quoque mirum non est, haec vasa tam pulchre
 repleta apparuisse. Quae occasiones cum ra-
 ro occurrant, mirum non est, vasa lactea copiosa
 rarissime in hominibus observata fuisse. Interea
 tamen Cl. MORGAGNIUS, uti in *Adversar. Anat.*
 I. pag. 92. refert, ea, eodem quoque fere modo ab-
 solto visa, imo & in duodeno, mox sub pyloro obser-
 vata, *Adv. anat.* III. pag. 31. describit. Quomo-
 do vasa lactea in cane liquido caeruleo, ex solutio-
 ne carulei montani (anglice Stone Blew) in aqua
 facta, sint replenda, Musgravius descripsit in *Act.*
Anglic. N. 275. pag. 996. & in Mottii epitome ho-
 rum actuum Part. II. pag. 76.

(15*) ad pag. 85. Varii fuerunt, qui receptaculum de recepta-
 chyli in homine prorsus negarunt; alii glandulas culo chyli.
 umbraes receptaculi vices gerere tradiderunt. Ve-
 rum illud non solum aliquoties, una cum ductu
 thoracico, argento vivo nitide replevi, ac tanquam
 sacculum tennem membranaceum, nunc simplicem,
 nunc duplicem, demonstravi; sed variis auctores
 illud etiam atque ductum thoracicum ex homine fi-
 guris eleganter representarunt ut Cowperus in
Anatomia sua magna, Bidlous, in *dissert. de Or-
 gano*

gano chyliifero, Drake, in *Anthropol.* Tab. II. fig. 3. Salzmannus & Wium, in *peculiaribus dissertationibus*, Henningerus, in *Ephem. Cent.* III. Append. p. 120 & Cantius, Tab VI. Quare doctiss. Morgagnus *Bianchum* refellit, qui receptaculum hoc in homine adhuc negat, eiusque in locum glandulas lumbares substituit; insimul ostendit, Ol. Rudbekium primum fuisse, qui hoc receptaculum ex homine delineaverit. *Epist. anat.* I. n. 83.

de usu val-
vula ad fi-
nem ductus
thoracici si-
ta, alia-
rumque
valvula-
rum.

(16*) ad pag. 85. Valvulae femilunaris in vena subclavia ad insertionem ductus thoracici usus a plerisque hucusque creditus est, ut claudat ductum thoracicum, ne sanguis vena subclavia in eum intrare possit. Minime vero eam huius gratia fabricatam esse sustinet Vir Clar. Io. Adolph. Wedelius a), atque docte demonstrat, nullum sanguinem in eum intrare posse, si vel maxime hac valvula abesset: quia primo valvula in ductu thoracico, ac deinde etiam liquidum perpetuo in ipso contentum, hoc impedirent, sanguinique ingressum tentanti resisterent: id quod pluribus rationibus evincit. Præterea ostendit, valvulae huius positum talem non esse, ut ingressum sanguinis satis impedire possit, si alias ductus thoracici conditio id admitteret. E contrario vero docet, valvulam hanc, cum adstante simili valvula socia in pariete opposito, idem prestare, quod valvula venarum in aliis locis: nimirum ne sanguis e vena cava, dum cor contrahitur, per hanc viam facile retrocedat, sicut pluribus apud laudatum auctorem

a) in peculiari de hac valvula edito programme A. 1714. lenæ in 4t.

em videri potest. Præterea in universum de
 su valvularum semilunarium in animalibus
 peculiare quoque scriptum edidit, a) quo evin-
 it, has valvulas omnes non agere, sed tantum
 liquido moveri, ita ut humores non pro-
 ellant, sed eorum motum tantum determi-
 ent, rationesque reddit mechanicas, quare
 emper vel unica, vel duæ, vel tres, & non
 lures adsint, aut adesse queant.

(17*) ad §. 215, pag. 89. Vasa lymphatica ^{de vasis}
 auca ex homine habemus delineata; ipsaque ea, ^{lymphati-}
 ua NVCKIVS in Adenographia sua sistit, a mul-^{cis.}
 is pro veris humanis habita, revera, si non omnia,
 eraque tamen, ex brutis vel ingenio sunt desum-
 : id quod eius figurae de renibus, corde &c. sa-
 s testantur: sicuti experti anatomici facile ob-
 rvare possunt. Ea vero, quæ utero addidit hu-
 nano, certe nunquam ita visa, sed non nisi ad a-
 analogiam cum lymphaticis bestiarum ita efficta esse
 redo: quia enim hæc vasa vix nisi in viventibus
 videri possunt, viva vero mulieres non secantur,
 ntet inde sententiæ nostræ veritas. Interea ta-
 en non nego, quandoque nonnulla observari posse,
 ideturque ea cum receptaculo chyli primus
 a homine conspexisse atque delineasse Ol. Rud-
 beckius, Exercit. de Duct. aquos. Tab. X, ut Mor-
 gagn. indicat, Epist. anat. 1. n. 83.

(18*) ad §. 217 pag. 88. In Ephemeridum cen- ^{de ductu bi-}
 teria V & VI descripsi quidem iam duas vesiculas ^{diario cy-}
 stelleas humanas, in quarum ductu cystico pulchræ ^{stico.}
 atque mirabiles valvulae spirales aderant: quas
 e vero

vero hic, dum, quantum novi, ab aliis non descripta
aut delineata sunt, Tab. III. fig. 9. iterum sisto
addito simul novo & tertio schemate eiusdem
ductus, cadaveris feminini, postea a me dissecti
in quo etiam multa valvula sive membrana aderant
transversa & obliqua, ductum hunc quasi in cel-
lulas dividentes: quae vero ductum non omnino
claudebant; verum ut valvula conniventes in im-
testino ieiuno aut colo fere se habebant: sicuti ex
figuris melius cognoscere licet. GLISSONIUS a) qui-
dem ait, Anatomicos quosdam in ductu cystici
sto valvulas effinxisse, se autem credere, fibro-
sum annulum cystidis iis imposuisse, se enim
nunquam valvulam ibi invenisse. Ita & BIAN-
CHUS b) inquit, valvulas cystis felleae collum &
cervicem occupantes, imaginarias esse. Verum
an non haec indicata partes, non semel, sed ab aliquo
tempore in plerisque cadaveribus repertae, sint di-
cenda valvula, aliis diiudicandum relinquo. Ita
& quem usum hic prestare queant, doctioribus
indagandum commendo. Moneo solum adhuc hic
Bianchum in nova historia sua hepatica editione
pag. 973. & 974. ea, quae antea contra ductum
cystici valvulas scripserat, revocare, easque, postquam
quam experientia convictus est, iam admittere.
Ceterum Bauhinus c) Bidlous d) & Vestus e)
valvulas etiam hic statuerunt. Schelhammerus
vero notavit, ductum cysticum stylum neque a parte
te duodeni, neque a parte cystidis admittere; fla-
tum vero liberrime f): unde suspicor, hunc virum
valvulas

a) Tract. de Hepate, cap. 14. b) Hist. hepat. edit. prima
cap. 14. §. 2. c) Theatr. anatom. p. 156. d) Anat.
Tab. 38. fig. 3. e) in Observ. ad Crameri Colleg. chin.
f) Analest. anatom. Dissert. XI. N. 23.

valvulas hic offendisse, licet id ignoraverit, & alia ratione huius phenomeni sollicitus fuerit. Bianchus tamen etiam hic valvulas, cochleam per-
tinetissime referentes, vidit a) & de usu earum iam Riolanum & Highmorum differuisse Morgagnus indicat Epist. anat. 1. num. 53.

(18**) ad pag. 88. Multum hucusque disputa-
tum fuit, an dentur ductus, qui ex hepate, sine ^{de ductibus hepatico-}
interventu alterius ductus, hoc est, immediate, ^{cysticis.}
loqui solent, in vesiculam fellis bilem invehant. Johnius egregia describit experimenta b), quibus
vincit, dari omnino eiusmodi ductus in bobus, no-
tque Glissonium, Blasium & Amstelodamen-
s iam eorum mentionem fecisse, atque simul inde
concludit, ductus etiam tales in homine necessa-
rios esse, & existere. Attamen praestantissimi ana-
tomici fere omnes eos in animalibus variis quidem
concedunt; verum in homine negant, seque illos in
se nunquam reperire potuisse mecum affirmant.
J. E. Cheseldenus, Anglus, in prima anatomes
sua editione casum refert, ubi minutissimos eius-
modi ductus in cadavere ictero demortuo, se vi-
disse putavit, atque constitutionem illius vesiculae
illis Tab. XVIII. tunc delineavit. Verum in ter-
tia & ultima, quam possideo, libri huius edi-
tione pag 178. revocat hanc, quam, ut recens ana-
tomicus, sicut ipse loquitur, proposuerat, senten-
tiam, & fatetur, se nunquam postea hos ductus,
cum licet adhibita diligentia, deprehendere po-
tuisse. At Bianchus denuo illos ductus magno co-
ntu, multis rationibus & experimentis adstrue-

a) in Epistola ad Ioseph Pozzani, Bononiae edita 1726.

b) in Act. Eruditor. Lipsient. An. 1682. pag. 20.

c) in Histor. hepat. nov. edit. pag. 111, & 940.

re contendit, c) eosque in hepatico - cysticos & cyst-hepaticos distinguit, atque amplissimis figuris evincere satagit. An vero hæc inquisitiones aliis quoque in re anatomica exercitatis ita succedant tempus docebit; Hoc saltem certum, quod Morgagnus hæc omnia negaverit. a) Vnum tamen præ ceteris testimonium adducit, Caietani nimirum Taconi, Philosophi & Medici Bononiensis, qui in epistola ad Bianchum data, atque simul in figura cum eodem communicata, ductus eiusmodi ex hepate ad vesiculam fellis abeuntes peculiari observatione ex cadavere morbofo confirmare studet. Verum postea in epistola Iosephi Pozzi, Anatome. Professoris Bononiensis, ad Ianum Paulum Simonem Plancum Anno 1726. edita, & in huius responsione ad epistolam prioris, tota hæc Taconi observatio ficta ac falsa declaratur, atque Taconium ab arteriolis cysticis deceptum esse, (iure an iniuria aliis uberius decidendum relinquo) indicatur. Mihi saltem contigit, ut, cum in hos ductus summo studio sæpius inquirerem, tandem in cadavere quodam, præsentibus multis auditoribus, invenirem aliquem, quem ob colorem flavum & locum prope colli cystidis partem posteriorem, quam attingebat, verum ductum hepatico cysticum habebam. Sed cum, ut certus essem huius rei, hinc inde in originem & progressum eius diu diligenterque inquirerem, atque tandem per influctum vulnusculum flatum versus cystidem imitterem, cognovi eius distributionem per cystidem instar ramusculorum arboris se habere, truncumque vas cysticum sanguiferum esse: licet ob colorem, & locum, quod ductus

a) in Epistol, anatom,

ductus hepatico-cystici in bobus in collum cystidis se
serere solent, fere iurassem, me ductum hepato-
cysticum, qui tamen talis non erat, invenisse.
atque inde uberius cognovi, quam facile quis falli
esset in ductum horum inquisitione, & propterea
concludo: quodsi in homine revera dentur, eos
non esse perpetuos, sed raros, imo rarissimos.
Conf. uberius hac de re Morgagni Epistolæ
anat. qui Bianchum pluribus refutat.

(19*) ad pag. 89.) Qui hepatis substantiam ^{de substan-}
glandulosam esse dixerunt, ex eo potissimum fun- ^{tia hepatis}
damento hoc affirmarunt, quia varii in cadaveri- ^{glandulosa.}
bus morbofis, hydrope præsertim aut atrophia de-
functis, corpuscula spherioidea sæpe quamplurima in
observarunt. Verum quia in corporibus sanis
non ita reperiuntur, hæc corpuscula potius pro tu-
berculis præter naturam sunt habenda, sicuti su-
pra iam docuimus, pag. 194. Nam, etiamsi hepar
maximi bovis vel equi sumatur, in quibus omnes
hepatis partes valde magnæ existunt, tamen in
illis nulla peculiaris aut distincta corpuscula, sin-
gulari membranula inclusa, conspiciuntur. At,
in cadaveribus morbo defunctis ad tubercula illa
te attendatur, haud adeo difficulter cognosci po-
test, tubercula illa esse producta morbosa, & tota
præter naturam. Ita enim præter alia similia
corpora a me dissecta, cum amicissimo quondam
collega, D. IO. IAC. BAIERO, Altorfii aperui cada-
ver mulieris hydropico morbo defunctæ, cuius he-
par innumera in superficie albicantia corpuscula
spherioidea varia magnitudinis ostendebat: quæ cer-
te aliis, præiudicio occupatis, facile pro glandulis
imposuissent. Sed cum hæc tubercula dissecando

accuratius examinarem, materiam continebant a substantia hepatis quam alienissimam, & adipi sebo, sive materia in tumoribus cysticis durioribus saepe contenta, similem: quorum tuberculorum deinde, cum hepar (quod naturalem magnitudinem bis aequabat) ulterius diffecarem, intus per totam substantiam quam plurima dispersa invenimus horumque multa avellana, alia nucis, quaedam ovum magnitudinem aequabant, imo superabant. Eorum etiam color & totus habitus a substantia reliqua hepatis quam alienissimus erat: unde satis cognoscere poterat, haec tubercula sive corpora sphaeroidea non glandulas esse, sed tumores morbosos, licet figuram sphaeroidem habuerint, & aliquo modo glandulas mentita fuerint. Similiter, si aliis in subiectis, tam humanis quam brutis, talia tubercula examinaui, ea semper de natura tumorum cysticorum inveni: qui, sicuti in externis partibus, ita & internis oriri solent, atque sub specie glandularum saepe imponunt. Alii vesiculas morbidas in hepate observarunt, quas nonnulli glandulas esse volunt; sed idem hic opponimus, quod Nota (77*) renibus talibus opposuimus.

de itu redituque bilis. (19**) ad pag. 89. Palfinus me reprehendit, a quo quod contra Verheyeni sententiam itum & reditum, sive ingressum bilis per ductum cysticum in cystidem, eiusque rursus egressum e vesicula per eundem ductum in cholidochum asseruerim: cum plerique praestantissimi anatomici, ut perhibet, hoc negent, & cum Verheyeno sentiant: qui impossibile esse putat, per unum eundemque ductum cysticum bilem in cystidem influere

& rursum

rurfus inde effluere posse. Verum Bohnius & Ortlobius b) gravissimis rationibus atque experimentis certissimis (quæ ipse repetii) hoc evirunt, consentiuntque, Cole c), Io. Maur. Hoffmannus d), & alii quamplurimi, illudque uberius confirmavit Bianchus e): quæ de re tanto minus habitandum, quicquid nonnulli contradicant, quia analogiam habemus in vesiculis seminalibus, in quibus idem fieri certi sumus, neque vel ipse Palfius negat.

(20*) ad pag. 90. Sicuti in hepate, ita & in ^{de glandulis in lienis substantia.} liene nonnulli corpuscula sphaeroidea quandoque observarunt, in cadaveribus morbidis, quæ pro glandulis lienis venditarunt. Sed idem hic, quod paullo supra contra corpuscula sphaeroidea hepatis dixi, revertere licet. Imo, quia ne quidem secretio contingit in liene, dum nullus ductus excretorius adest; hinc tanto minus glandula hic requiruntur: Cui enim usui hic erunt glandula, ubi nulla sit secretio? Cum vero RVYSCHIVS in variis suis scriptis & præparatis tam clare demonstraverit, hæc viscera esse vasculosa, verasque glandulas in eis non adesse, atque SCHELHAMMERVS etiam glandulas lienis Malpighii, racematim ei inhærentes, merum esse commentum statuat f), præstat certum pro incerto amplecti. Conf. quæ in Adenologia N. 365. & seq. hac de re dicta sunt.

(21*) ad pag. 90. Nullius visceris usus magis ^{de usu lie-} obscurus fuit, quam lienis, & hinc nullum magis ^{nis.} differ-

e 4

differ-

a) in Actis Erud. Lips. A. 1682. pag. 20. & A. 1683. p. 126.

b) Histor. partium pag. 135. c) de secret. animal. pag. 133.

d) in Idea Machin. corp. human. pag. 55. e) in Hist. Hepat. cap. XIII. edit. prior. & cap. XVIII. edit. poster.

f) Analect. anatom. Dissert. X. N. XXII.

dissentientes scriptorum opiniones excitavit. Multi enim cum Erasistrato a), præsertim quia animalibus, salva vita, excindi potest, eum pro inutili & superflua corporis parte, sive pro errore naturæ, habuerunt. Alii cum tantum ob æquilibrium corporis conservandum factum esse putarunt. Nonnulli cum Hippocrate & Aristotele aquosas partes e ventriculo attrahere sustinuerunt. b) Plerique veterum illum cloacam bilis atræ sive melancholia cum Galeno constituerunt. Quidam fermentum sive menstruum ventriculi pro digestionem promovenda in eo secerni, & ad ventriculum demandari existimarunt. Varii lienem risus autorem crediderunt, iuxta tritum:

Splen ridere facit, cogit amare hepar.

Alii eum sanguinem inspissare docent. HAVERRVS c) putavit, illum præparare mucum illum, qui in glandulis mucosis articularum secernitur. SCHELHAMMERVS, d) & cum hoc Angli recentiores, ut LISTERVS e), PURCELLIVS f), eum diverticulum sanguinis esse volunt in motibus fortioribus: qui ultimus quoque vult, eum sanguinem inspissare, & ope acidi, nescio cuius, præcipitationem producere, pro meliori bilis secretionem. Alii adhuc alios usus produxerunt, quos omnes hic recensere prolixum nimis foret. Ego vero existimo, eum vi situs & fabricæ eius sanguinem tenuem, fluidissimum suppeditare hepati, ut reliquus crassus ex ceteris partibus ad hepar influens,

& ex

a) Galen. de usu part. libr. IV. cap. XV. b) vid. Casp. Hoffmann. de usu lienis. c) in Osteologia. d) Analect. anatom. Dissert. X. §. 40. e) Tract. de Humoribus. f) Tract. de Colica.

ex quo bilis in denso hoc viscere fecernenda, fluidior reddatur, hepatis obstructio sic impediatur, bilisque secretio hoc modo promoveatur. Nam si vena splenica in cane aliove animali vivente inciditur, sanguinem tenuem, viridum, subtilem effluere & alii & ego saepe apprehendi; nunquam vero crassiorem, reliquo sanguine venoso.

(22*) ad pag. 91. Renum substantiam ob ^{de glandulis} tubercula quandoque in eis reperta, glandulosam in renibus, quoque efficere multi conati sunt; de quibus vero neminem sentiendum, quod de tuberculis in hepate, notavi (19*), & superius N. 365 & seq. in adenogonia diximus. Quid vero de renibus, vesiculis observatis, sit iudicandum, inferius in Nota (27*) videri poterit.

(23*) ad pag. 92. Quoniam usus harum glandularum adeo obscurus & incertus est, ante alios ^{de renibus succenturiatis.} quot annos Academia Burdegalensis, in Gallia insignis praeonium publice obtulit ei, qui usum verum earum detegere posset; verum nemo, quantum ad nos pervenit, fuit, qui, id prestare, & praemium deportare valuisset. Attamen haud adeo diu post, Anno nimirum 1719, Valsalva, celebris quondam Bononiensium anatomicus, publicari curavit, imo ad varios scripserat a), se usum earum deprehendisse, ductusque invenisse, qui in viris ad epididymides; in mulieribus vero ad ovaria abirent, easque sic ad generationem conferre, atque dissertationem hac de re se editurum promiserat. Verum quamvis postea auctor adhuc per

e 5

aliquos

a) vid. Vallisneri Histor. generat. pag. 353.

aliquot annos vixerit, promissa tamen illa dissertatio non prodiit; neque adhuc ullum ab auctore hosce ductus didicisse cognovi. Hinc de iis non solum dubito, verum etiam ingens harum glandularum magnitudo in fœtu, & diminutio contra in adultis, huic usui quam maxime obstare videatur. Ceterum de harum fabrica eleganter dissertit Malpighius. a)

*de tunica
cellulosa &
musculosa
vesicæ.*

(24*) ad pag. 93. Tres vulgo tantum membranæ in vesica urinaria numerari solent, a nobis §. 222. recensite: verum quia WARTHONVS cellulosam numerat in mesenterio, in qua pinguedo hæret; RVYSCHIVSQUE & alii cellulosam in intestinis, ut §. 211. dictum est: hinc eodem iure & easdem vel forte adhuc graviores ob rationes in vesica humana tunicam cellulosam statui posse credo; quia manifesto inter extimam & muscularem tunicam plerumque, si non semper, pinguedo eaque sæpe copiosa, in pinguibus ibidem reperitur, in peculiaribus cellulis adiposis secreta, collecta, atque in certum usum asservata; sic ut merito quatuor membrana vesicæ urinariae numerari queant. Ex eodem fundamento cl. Morgagn. recte etiam tunicam cellulosam eiusmodi & in ventriculo & in vesicula fellis statuit; contra Bianchum vero tunicam vesicæ muscularem, quam in Hist. Hepat. p. 980 negare conatur, mascule defendit & confirmat. In canibus vero hæc cellulosa vesicæ tunica vix in conspectum prodit. Inservire videtur in homine ad vesicam contra urinae acrimoniam defendendam.

(25*) ad

(25*) ad pag. 94. Cum varia notatu digna ^{de testibus.} de testibus suo loco paginae 94 commodè inferere non potuerim, nonnulla adhuc hic notabo. Primo l. Morgagnus indicat a), quod veram testium substantiam vasculosam ex veteribus primi indicaverint Arantius, Cabrolus, & adhuc perbicacius Riolanus; Graafius vero connexionem eorum vasculorum & usum demonstraverit. Haec vero substantia vasculosa bene apparet in testu- line b). in suis c), ariete d), gliribus e). Deinde notamus, arterias spermaticas non semper ex sortis, sed sinistram quandoque ex emulgente, imo utramque aliquando ex hypogastrica provenire. f). Id quod haud observasse videntur illi, qui arterias spermaticas prorsus defecisse scribunt; quos nugari dicit Graafius. g). Præterea Lealis & Schraderus h) volunt, arterias spermaticas, antequam ad testes perveniant, per anastomoses communicare; quod tamen alii observare non potuerunt. i). Denique prima harum arteriarum descriptio Andernaco deberi videtur. k). Tandem albugineam testis tunicam in duas facile dividì posse, Morgagnus monet l). Teichmeierus vero eam in tres, tendinosam scilicet, vasculosam & nervosam distinguit. m).

(26*) ad pag. 95. Peculiaris testiculi & epi- ^{de epididymide pecu-} didymidis præsertim dispositio observata a me ^{liari.} est

a) Advers. anat. I. pag. 21.

b) Advers. anat. IV. pag. 4. c) Schelhamm. Analekt. Diss. XII. §. IV. lit. B. d) Lealis de part. genital. e) Graaf. & Cheselden. f) Nicolai direct. vasor. p. 69. g) de viror. organ. generat. p. 30. conf. Valisner. de generat. p. 352. h) in observ. anatom. i) vid. Heucheri Dissert. Anatomie ars magna, §. XII. k) Institut. anatom. p. 37. l) Adv. anat. IV. p. 3. m) Anthropolog. 171.

est Helmstadii in viro a me publice dissecto : ubi testiculus sinister non in scroto erat, sed in abdomine reperiiebatur ; verum non in pelvi ad vesicula latera, ut ab aliis observatum a), sed eo in loco, ubi alias vasa spermatica abdomine egrediuntur, altero longe minor, & sine epididymide. vid. Tab. VI. fig. nostra 25. m. Epididymis vero n. o per musculos abdominis, ubi alias vasa spermatica transeunt versus scrotum egrediebatur, & per inguen sinistram ad supremam usque scroti partem se extendebat. A fine vero epididymidis vas deferens rursus reflectebatur sursum, quod iuxta epididymidem per inguen & deinde musculos abdominis ventrem intrabat, & consueto alias more ad vesiculam seminalem sinistram abibat : quemadmodum hoc, & quomodo vasa spermatica hic se diviserint, clarius ex figura modo citata cognosci potest.

(27*) ad §. 227, pag. 96. LEAL LEALIS delineavit vesiculas feminales uno ductu communi in urethram desinentes : cuius descriptionem etiam sequitur Cl. BOERHAVIUS b), & ut percepi, nonnulli in Gallia : perhibentes, frequentius eos unico communi ductu gaudere, quam duplici. Verum ego semper duplicem observavi : atque non solum vesiculas tales exsiccatas ceraque repletas asseruo, ut & alias in spiritu balsamico, in quibus duplicem semper ductum ostendere possum ; verum in omnibus cadaveribus, quae adhuc secui, semper hucusque duplicem ductum, & duplex osculum excretorium, demonstravi. Præterea

de ductibus
excretor.
Vesicular.
feminal.

a) Advers. IV. pag. 1. b) in Instit. med. edit. alter. & tertia §. 648.

et omnes reliquos Auctores, (præter modo citatos) assentientes habeo. Imo & ipse Bærhavius postea sententiam hanc mutavit. a) Idcirco, licet forte subinde simplex tantum orificium, &unicus ductus adsit, tamen nondum credere possumus frequentius reperiri, si modo rite inquirentur: nam omnes ceteri anatomici mecum contrarium observarunt. Facile vero contingere potest, ut mihi exercitati unicum tantum reperire queant.

(28*) ad pag. 97. In præfatione editionis secundæ huius compendii pag. 24 notavi, me in ultis penis lateralibus. ^{de ligamento}mo, quod sub manibus tunc habebam, cadavere virili, in pene, præter ligamentum eius suspensorium, duo lateralia ligamenta, suspensorio fere similia, reperisse: quæ utrinque mox supra ortum musculorum erectorum ex ossibus pubis prodibant, supra insertionem horum musculorum in latera corporum cavernosorum penis se inferebant. Cum vero hæc ligamenta ab eo tempore non nisi bis, & quidem tenuiora longe, quam prima vice, deprehendere potui, eas pro partibus ordinariis habere nequeo.

(29*) ad pag. 99. CHESELDENVS, Anglus, municeps COWPERI, has ipsius glandulas in ^{de glandulis} prima anatomes suæ editione, pag. 160. prorsus in Cowperi. ^{Cowperi.}ubium vocat, affirmando, se eas nunquam reperire potuisse: additque præterea, nisi hæc glandule inventum essent Cowperi, suspicandum foret, quasdam glandulas exiguas, vel ob statum morbosum ita intumuisse in eo cadavere, unde COWPERVS illas delineavit: utpote qui lusus naturæ in glandulis non essent rari. Sed in tertiâ editione Cheseldenus omne, quod modo ex ipso

so adduximus, omittit; attamen non affirmat, /
 has glandulas reperisse verum modo indicat, Cow-
 perum has tres glandulas descripsisse pag. 294
 unde suspicor, eum hucusque ipsas non vidisse
 Morgagnus tamen affirmat, se illas in pluribu-
 cadaveribus invenisse, & ea quidem aliquando
 magnitudine, ut parvum phaseolum superarent, in-
 terdum pari, alias minori magnitudine conspexis-
 se: sæpe tamen etiam eas, omni quamvis adhibi-
 ta diligentia, deprehendere non potuisse a)

(30*) ad pag. 101. Multum semper utramque
 de hymene. in partem de existentia membranæ hymenis in
 virginibus disceptatum est a Medicis; multis eam
 olim & adhuc hodie vel negantibus, vel pro re
 inconsueta aut præter naturam venditantibus.
 Sed videntur hi iuniorum puellarum verarumque
 virginum vaginas haud inspexisse, & solum de-
 floratas perlustrasse. Ego certe in omnibus, quas
 ego examinavi puellas iuniores, (examinavi vero
 permultas) tam recens natas, quam aliquot men-
 ses natas, itemque unius anni, biennes, sexennes
 & illam quatuordecim annos natam, cuius descri-
 ptio & delineatio in Ephem. Centur. VII & VIII
 Tab. VI fig. 4. a me exhibita est: atque semper
 membranosum quoddam corpus, orificium vaginæ
 coarctans; nunc annulare, nunc semilunare, re-
 peri: ita, ut pro statu morbofo, quod in plerisque
 occurrit, minime sit habendum. Quod vero in
 adultioribus raro reperiat, multa huius rei pos-
 sunt esse causæ; de quibus vero hic dicendi non
 est locus. Consentiunt mecum Viri gravissimi.
 Wie-

a) Adversari. anatom. IV. pag. 25. & seq.

erius a), Riolanus, Graaf, Svamerdam
orgagnus, Santorinus, aliique. Vesalius ab
tio illud quoque negaverat: postquam vero iu-
res & veras examinavit virgines, illud affir-
avit.

(31*) adpag. 103. Nonnulli scriptores, & in
imis celebris Mauriceau b) ac Dionis c) volue- ^{de uteri}
nt, uteri substantiam in gravidis tenuiorem ^{crassitie in}
ri, quam in non gravidis; credendo, impos- ^{gravidis,}
sibile esse, uterum in tantam molem, quanta est ul-
tis mensibus in gravidis, extendi, sine diminu-
ne substantia aut crassitie. Verum non solum
eventeris integro ac peculiari capite illam sen-
tiam refellit d); verum ego ipse varias gravi-
s, aliasque mulieres, & in partu, & paullo post
rtum mortuas, cultro aperui; sed nunquam ute-
m tenuiorem, saepe vero crassiore inveni. Quod
primis probe notavi, dum, hic Helmstadii, intra
ius circiter anni spatium, tres gravidas mor-
as aliquando incidi: quarum due in partu, una
ro ex vulnere capitis, mortuae erant: sicut haud
idem scripsi. e) Sed dubium mihi interea obie-
rat vir quidam eruditus, an non forte partus
mum tempore tanta sanguinis copia ad uterum
dflueret, qua ita extenderetur, qua copia extra
ud tempus non adesset, adeoque etiam uterum
extra illud tempus forte non ita crassum esse: nam
servationes ex mulieribus in partu, aut paullo
post

a) Observat. med. pag. 95, 99, & lib. de praestig. Dæ-
mon. lib. III. cap. 19.

b) Traité des maladies des femmes grosses.

c) in Chirurgia sua, itemque in lib. de arte obstetric. cap.
de sect. caesar.

d) Operat. chirurg. cap. VIII.

e) in Actis Natur. Curios. volum. I. pag. 406.

post partum mortuis hanc ob causam fallere poss. Verum omne hoc dubium sustulit exemplum mulieris, quæ extra partus tempus ex vulnere gravissimi capitis, glande plumbea, medium cerebri penetrante concitato, sana ceterum & subito, octavo graviditatis mense interfecta est. In hac nullus insulitus tunc erat sanguinis ad uterum affluxus, nullus pariendi conatus, & tamen uteri substantia non erat tenuior, sed æque crassa, ut in aliis gravidis & puerperis eam observavi. Consentiunt etiam mecum, præter scriptores a Deventero & a me in Actis novis Academ. Nat. Curiosor. laudatos, Viri Clarissimi, Morgagnus a), Littrius b), Voglius c), Santorinus d), Vaterus e), aliique

Denique etiam ad hunc locum notamus, quod & musculo Ruyschius in puerperarum uteri fundo fibras carneas spirales sive orbiculares viderit & delineaverit, quas novum uteri musculum orbicularem appellavit f), cui vires adscribit placentam foetu edito, ab utero separandi & expellendi: atque simul docet, placentam nunquam vi ab utero separandam; sed, si lenem tractionem non sequatur, relinquendam esse, donec ab hoc novo musculo (quem tamen a reliqua uteri musculosa fabrica iuvare existimo) protrudatur. Inquisivi postea, occasione oblata in gravidis in hunc musculum orbicularem; Verum eum ita invenire non potui: sed solum fibras musculares

a) Advers. anat. IV. p. 46. b) Histor. Acad. Reg. Scient. An. 1720. pag. 22. c) in Anthropogenia Part. II pag. 35. d) Observat. anatom. p. 163. e) de utero gravido pag. 11. f) Adversar. anatom. Decad. III. Deinde in peculiari libello de hoc musculo belgice edito, Item in epist. Vateri ad Ruyschium de hoc musculo

varium sensum inextricabili modo circum-
 insas; quas vero idem imo plus præstare
 posse puto in foetu secundinisque expellendis,
 quam fibras illas orbiculares, eamque ob causam
 uterum ex gravida, paucis diebus ante
 partus tempus subito extincta, adhuc asservo.

(32*) ad pag. 104 *De menstruum fontibus sive de menstruo-
 rum origine*, utrum ex ipso utero, an solum ex ^{orum fontibus.}
 vagina uteri proveniant, *Medici non conveniunt:*
alibusdam prius, aliis posterius affirmantibus, e-
orumque magnum catalogum proponit doctissimus
Morgagnius a), qui simul docet, quod suis obser-
vationibus hunc cruorem sæpius ex fundo uteri,
inquam vero e vagina provenisse viderit.
Item & ego duobus in cadaveribus quam luculen-
issime vidi, & leni uteri pressione guttulas sanguinis
ex foraminulis adhuc satis conspicuis expressi. Confir-
mat etiam denuo menstruum ex utero ortum Lit-
terius notabilibus observationibus b), itemque Graf-
ius c) Santorinus d) ac Schulzius. e) Unicus vero
est, quem novi ex recentioribus f), qui sustinet, san-
guinem menstruum ex sola vagina prodire, illudque
in cadaveribus observasse scribit. Quibus obser-
vationibus variisque rationibus nixus, naturam in
hoc negotio variare, & modo per uterum modo per va-
ginam, modo forte per utraque loca exire, cum
reindio g), Morgagnio & Vatero h), existimo.

(33*) ad finem pag. 94. *Vesicula in ovaris*
 f ob.

a) Adversar. anat. l. p. 45. b) Hist. Acad. Reg. An. 1720.
 p. 20 c) Ephem Nat. Curios. Cent. V. obs XXIV.
 d) Morgagn. Adversar. anat. IV. p. 28 e) in Commerce lit.
 terar. An. 1731. f) Gouey veritable chirurgie pag. 398
 g) in Emmenologia. h) de utero gravido.

de ovulis
corporibus
luteis.

Observata vulgo cum Hornio, Graafio, Stenone, Kerkringio &c. pro veris ovis hucusque a plerisque habita sunt, in quibus fœtus principium, eiusque rudimentum sit delineatum. Verum recentiorum varii, ut Morgagnius, Vallisnerius, Santorinus & Paionus, cum Malpighio dubitant non solum, vesiculas illas vera esse ova; verum etiam evincere volunt, in luteis istis glandiformibus corporibus vera latitare ovula, sed minutissima, quæ post imprægnationem accrescerent: cum e contrario vesicula, pro ovis vulgo habita, facta imprægnatione, decrescerent, vero ovulo & fœtui in nutrimentum cederent, atque eius expansionem, accretionem & separationem promoverent: quæ sane res digna est, ut uberius pervestigetur, donec ad maiorem certitudinem hac in re perveniamus. Ceterum licet plerique recentiores medici generationem hominis ex ovo credant; sunt tamen, præter Diemerbroekium, Lamium, Duverneum Chirurgum, in *Zodiaco Medico Gallico*, A. 1680, & Sbaraleam, ex recentissimis auctoribus, qui systema hoc impugnant, Vidussius a) & Voglius b), Itali, atque de la Motte, Gallus c); qui vero a multis recentioribus, ut Morgagnio d), Santorino e), & qui de generatione speciatim haud pridem scripserunt, Nigrisolio f), Vallisnerio,

a) in libro, cui titulus: *Motivi di dubitare intorno la Generazione de' viventi* &c, in Venez. 1717. 12.

b) in *Anthropogenia*, Bononiæ A. 1718. 4.

c) *Dissertation sur la Generation*, Paris, 1718. 8.

d) *Adversar. anatom.* variis in locis.

e) *Observat. anatom.*

f) *Considerazioni intorno alla generazioni de' viventi.*

io a), Paitono b) aliisque refelluntur: qui & Evvenhœkii systema generationis ex vermiculis genitura virili destræere satagunt.

(34*) ad pag. 176. Figuram, quam DRAKIVS libet, de Tuba Fallopiana, quia liber extra ^{de tuba Fal-} ^{lopiana-} tanniam in paucorum manibus versatur, hic Tab. fig. 10. sistere volui. Quia vero in dissectione publica cadaveris feminini, mense Ianuario A. 19, cum mercurium in venam spermaticam dextram immitterem, ligata tuba Fallopiana inferiori parte, una cum ligamento ala vespertilionum facto, ne mercurius ad reliqua uteri vasa descenderet) copiosissimorum atque subtilissimorum vasorum cursum longe alia, & adhuc pulchriori ratione, per has partes observavi, atque auditoribus monstravi; totamque partem, quia nusquam similis figura exstat, delineari curavi, sicuti representatur Tab. III, fig. 11; Vbi vero mercurius, quam Tuba Fallopiana copiosissima vascula, tota tubam densissimis ramusculis ambientia, gravissimo spectaculo repleverat, tandem in ipsam tubam caveam illapsus est; manifesto indicio, vasa cum cavitate tubæ communicare, & pro ea conectanda atque lubricanda aliquod liquidum deponere.

(35*) ad finem pag. 106. Vterus quidem ordinis de foetibus ^{extra utero-} ^{rum,} rium atque consuetum foetus est domicilium, ubi nascitur, & ad partus tempus continetur; verum templa quoque non desunt, foetus extra uterum acceptos esse, & ad perfectionem usque accrevisse: quibus etiam, præter alias rationes, eru-

f 2

dimur,

a) l' istoria della Generazione, Venez. 1721.

b) Discorsi della Generazione, in Venezia, 1722. & 1726. 4.

dimur, foetum non in utero ex mixtura utriusque sexus geniturae orifi, ut cum veteribus nonnulli recentiores volunt; neque ex substantiae uterinae, ut Voglius in Anthropogenia sua contendit, elongatione; verum iam in ovario principium sumere, ibidemque a genitura virilis parte maxime volatili impragnari, & subinde varias ob causas vel in hoc, vel in alio loco remoram pati, ut in uterum pervenire nequeat, se nunc ex ovario se extricare non possit; modo in cavum abdominis decidat; alia vice tubae Fallopianae angustias superare haud valeat; verum ibidem parti cuidam accrescat, nutrimentum capiat, at sua plerumque & matris morte: quemadmodum triplicis huius generis historias ex variis scriptoribus collegit atque prolixissime descripsit Mangetus a); de foetibus vero extra uterum atque in tuba Fallopii repertis Dionis b) & Aeneolus c) varia quoque exempla proferunt. Speciatim vero historias foetuum in ovario reperorum publicarunt Zodiacus Medico Gallicus d) Vieussienius e) ac Littrius f); in abdomine deprehensorum, Straußius g), Baylius h), qui & aliorum adhuc observationes refert. Saviard. i), Cou-

tia

a) Theatr. anatom. Tom. II. pag. 140. & sq. quas iisdem verbis in bibliotheca sua chirurgica Tom. II. pag. 131 ut libri forte molem & pretium augetet, repetit.

b) Dissertation sur la generation de l' homme.

c) Suite de la nouvelle methode de guerir les fistules criminales p. 294.

d) An. 1682. e) Dissert. de structura & usu uteri. f) Hist. Acad. Reg. An. 1701. g) Historia foetus Mustaphae pontani. h) Hist. anatom. gravidit. Annor. XXV. ubi foetus epiplooo annexus erat. i) Observ. Chirurg.

a) Bianchus b), Calvus c); quibus & ea ad-
 eda historia, quæ de fœtu extra uterum reper-
 refertur in Diario Gallico An. 1722; sed in
 oia Fallopiana inventorum, Riolanus d), Els-
 ltzius e), Bussièrè f), Littrius g), Duverney
 Cyprianus. i) Quibus adhuc addendum re-
 etissimum exemplum a Santorino k) descrip-
 m, aliudque, si non idem, a Paitono indica-
 m, at simul in dubium vocatum, l) & forte
 oque ea historia Camerarii de fœtu per annos
 in utero detento, de quo An. 1720 Tubinga
 culiarem dissertationem edidit, cuiusque in vari-
 Diariis mentio fit. Ex quibus satis constare
 bitror, quæ modo affirmavimus. Conferri hic me-
 tur Celeb. Vallisnerii liber doctissimus, de Ge-
 ratione, Italico sermone scriptus, & sæpius
 m a nobis laudatus.

(36*) ad finem pag. 108 Quæstio agitur in-
 r anatomicos, an sanguinis detur circulus re-
 procus inter matrem & inter fœtum: ple-
 sque id negantibus, vel saltem in dubium vo-
 antibus. Verum, præterquam quod Covvperus
 mercurium in arterias umbilicales fœtus iniectum,
 edit intrare in venas uteri matris m); & e con-
 ario Vieussenius mercurium in arterias caroti-
 f 3 des

- a) Observat. anatom pag. 28. b) Manget. Theatr. anat.
 Tom. II. p. 142. c) Anel loco citato. d) Anthro-
 pograph. lib. 2. cap. 35. e) de conceptu tubario,
 de quo etiam Tillingius & Deusingius. f) in Aët. An-
 glican. 1694. & Lipsiensibus. g) Hist. Acad. Reg.
 A. 1702. h) ibid. i) Epist. de fœtu &c. k) Ob-
 serv. anatom. pag. 225. l) Discorso IV della Gene-
 razione, pag. 97.
 m) Anatomy of the human Body Tab, 54. & Aët. E-
 ruditor. Lips. An. 1699. pag. 53.

des canis gravida iniectum, non tantum in omnibus
eius membra & viscera decurrisse; sed etiam in
catellos in ipsius utero conclusos, pervenisse, a
firmat, ut ipsorum interiora & exteriora, cutisque
ipsa hoc mercurio, per vasa sanguinea affluente, in
cundo spectaculo pingerentur. a) Meryus hunc san-
guinis circulum singulari confirmat exemplo mulie-
ris, ultimo mense gravida, infelici lapsu subitu
enecata ac in sectione abdominis cavitatem sangui-
ne turgidam; ex adverso cuncta vasa sanguifera
cum propria, tum fœtus una mortui, prorsus vacui
exhibentis, cum placenta nihilominus uterina matri-
ci adhuc integra, sine ulla sanguinis in utero effusione
adharesceret. b) Hoc unicum optarem, ut auctor addi-
disset, quenam vasa in abdomine matris laesa fuissent,
unde sanguis effluxisset; vel ut alii, qui huic sectio-
ni interfuissent, hoc adhuc publice indicarent, ut
observatio sic perfectior esset. Denique & meam
addam observationem, quam haud parum senten-
tiam hanc firmare credo. Nimirum anno 1724
mense Decembri, presentibus D. VVAGNERO, Col-
lega meo coniunctissimo, & Academia nostræ Phi-
liatris, puerperam secui, quæ duos fœtus in utero
gesserat, unoque vivo feliciter excluso, paullo post
intra quartam horæ partem, ob enormem superven-
ientem uteri hemorrhagiam, altero adhuc retento
mortua est. Hanc infelicem puerperam aliquot horis
post (citius enim affines sectionem admittere recusa-
runt)

a) Manget. Theatr. anatom. Tom. II. pag. 139. quare ve-
ro propter hoc experimentum mercurium in carotides,
& non in alias arterias, utero propinquiores, iniece-
rit, rationem exhibet nullam.

b) Histor. Acad. Reg. An 1708. p. 43. & 240. Conferri
etiam potest, quod idem Meryus circa hoc argumentum
de fœtu sine corde nato profert. An. 1720. p. 17.

ent.) incidi, eiusque vasa sanguifera sanguine
 acua deprehendi. Cumque deinde matricem
 quoque aperirem, inveni placentam fœtus nati ab
 utero magna ex parte solutam; (unde sine dubio
 subita & lethalis illa hæmorrhagia) fœtus vero
 e utero adhuc relictæ placenta firmiter exacteque
 utero coherebat. Perlustratis atque indicatis tunicis
 fœtus relictæ, quæ adhuc integræ erant, ipsum hunc fœ-
 tum scalpello aperui, ut philiatris ea, quæ in fœtu no-
 tatu digna sunt, demonstrarem, nullum in hoc infan-
 te sanguinem, neque in corde, neque in vasis eius ma-
 joribus deprehendimus. Unde constare puto, sangui-
 nem huius fœtus per arterias ipsius umbilicales &
 placentam ad uterum matris transisse, atque una
 cum materno sanguine per uterum effluxisse. Eundem
 reciprocum hunc circulum etiam statuunt viri do-
 tissimi, Rauholtius a) Morgagnus, b) Salzma-
 nus c) aliique. Vasa vero placenta gemellorum,
 licet placenta inter se invicem arctissime sæpius
 concreta sint, non communicare existimo. Nam
 cœsservo tales placentas, in quibus unius arterias &
 venas ceracea materia probe replevi: ubi vero ni-
 hil ad alteram arctissime licet connexam transit
 placentam.

(37*) ad finem pag. 110. Fœtum per os eti-^{de nutritio-}
 am in utero nutriri, præter alia singularis casus,^{ne fœtus in}
 quem bis, multis Studiosis Medicina præsentibus,^{utero,}
 Altorfii observavi, extra dubium ponere videtur.
 Accepi nimirum aliquando fœtum vaccinum per-
 fectum, utero & membranis suis adhuc inclusum
 tempore hyemali frigido: ubi non solum liquor

a) in Histor. Acad. Reg. An. 1714. ubi de placenta agitur

b) Adversar. anat. IV. pag 82.

c) dissert. de circul. sanguin. in fœtu,

amni, qui fœtum ambit congelatus erat; verum idem liquor congelatus per os, totum œsophagum, & ventriculum, tanquam unum continuum corpus, digiti circiter crassitie, in œsophago reperiatur: quod ipsum deinde alia hyeme iterum mihi videre contigit: ita, ut liquoris huius fœtum ambientis, cum eo, qui in ventriculo eius reperitur, communicatio inde sit manifesta. Neque verisimile est, tantam illius liquoris copiam quanta in ventriculo fœtus perfecti plerumque reperitur, in hoc omnem secerni, sicut nonnulli existimant; sed aliunde potius eum provenire credo: præsertim, cum omnibus illis qualitatibus donatus sit, quas ille habet extra fœtum, cui innatat. Egrege etiam hanc meam sententiam confirmat observatio, quæ in Frid. Hoffmanni dissert. de pinguedine pag. 10. refertur: ubi auctor scribit, infantem perfectum natum esse, cuius funiculus umbilicalis putredine totus corruptus erat. Impossibile fuisset, ut vixisset, nisi aliunde, quam per funiculum, nutrimentum capere potuisset. Ita & Petitius Academia Parisina ostendit funiculum fœtus humani, qui in medio nodulum habebat: ubi manifesta indicia adfuerunt, hunc nodulum diu ante partum iam constrictum fuisse: unde iudicandum, hunc fœtum, sicut priorem, nutritione per os conservatum fuisse. a) Qualem nutritionis fœtus modum per os, ex glandula thymo, BELLINGERVS Angelus, in medium produxit, ut supra pag. 107 indicavimus. Conf. Act. Erud. Lips. A. 1718. p. 6.

(38*) ad

a) vid. Hist. Acad. Reg. 1718. pag. 40.

(38*) ad pag. 112. Vfus huius foraminis ova-
 magnas quondam movit lites inter Meryum ^{de forami-}
 si sanguinem ex auricula sinistra, contra vulga- ^{nis ovalis}
 ac receptam sententiam, in dextram per illud ^{usu.}
 fluere contendebat) & Duverneum, Sauvri-
 n, Sylvestrum, Buffierum, Listerum & Ver-
 yenum qui contrarium sentiebant, & pro recep-
 sententia, quam etiam plerique adhuc hodie tu-
 ur, pugnabant : qua de re evolvi possunt cum
 mis Historia Academiae Regiae Parisiensis Anni
 99, aliaque laudatorum virorum scripta. Wins-
 is tamen Meryo aliquo modo iterum assentire
 detur in eiusdem Academiae Historia An. 1717,
 g 20 & 272. edit. Amstelodam. atque simul
 et, Galenum hoc foramen & canalem arterio-
 n iam scivisse, pag. 281, aliter ac haecenus cre-
 um fuit. Plura etiam de hac re, ut Nova lit-
 ia indicarunt, in Hist. Ac. Reg. 1725 proposuit,
 i vero tomus ad manus nostras nondum pervenit.

(39*) ad pag. 116. Hoc interstitium varii
 igni nominis anatomici negant, imo imaginari- ^{de media-}
 a pronunciant, & a violenta sterni elevatione il- ^{stini inter-}
 id demum produci contendunt. Verum illud in- ^{stitio.}
 stitium semper in parte non solum superiori, sed
 am diaphragmati vicina, quamvis sternum le-
 time tantum, ut ab hoc diaphragma commode
 parari queat, elevetur, deprehendi : qua blan-
 profecto elevatione, qua ego utor, nihil, quod an-
 a non erat, nihilve novi aut prater naturam, pro-
 ci posse existimo. Imo An. 1730 in anatome pu-
 lica illud amplissimum inveni ac demonstravi, ita
 mediastini membrana dextra sterni medio, sini-
 a vero tantum cartilaginibus costarum sinistri

lateris adhaereret. Deinde prater varios auctores qui abscessus & pus in hoc interstitio viderunt, Maierus quoque recens auctor, se saepius serum in huius mediastini interstitio invenisse affirmat. a)

de thymi
vasis ex-
cretoriis.

(40*) ad pag. 118. Idem Maierus ex Murali observ. XXXII. refert, quod hic in thymo plurima vascula crystallina, ad mediastinum & pericardium serpentia, viderit, itemque ductum a tonsillas meantem, natura durum & membranaceum. b) Quo vero in libro Murali, cum plures eaderit hac observatio contineatur, invenire non potui.

quare arte-
ria pulmo-
nalis am-
plius vena.

(41*) ad pag. 129. Disputant nonnulli recentiores anatomici, quare arteria pulmonalis amplius sit vena pulmonali: cum alias in omnibus partibus vena arteriis ampliores esse soleant. Quidam existimant, hoc fieri propter sanguinem in arteria nimis resolutum, qui in pulmone per respirationem rursus cogeretur, sive condensaretur, eumque propterea in vena pulmonali minus spatium requirere. Ego vero, missis aliorum sententiis, existimo, arteriam propterea ampliorem hic esse: quia sanguis ad cor refluus ob crassitudinem difficulter per rete subtilissimum pulmonis vasculosum transire potest; hoc enim reluctatur vehementer hinc aliquo modo in progressu suo retardatur, unde arteria distenditur ac dilatatur. Ex adverso sanguis vena pulmonalis notabile obstaculum videt habet, quod eius motui resistat; sed libere in cordis caveam sinistram influere potest, hinc hac mi-

no

a) in Colleg. Anatomico. pract. 4. Pragæ. 1725. pag. 99

b) in Colleg. Anatomico pract. pag. 102.

x sive angustior. a) Cum supra commemorare
atermiserim capsulam sive tunicam cum peri-
rdio continuam, quæ vasa pulmonum, arteriam
mirum ac venam pulmonalem, itemque bronchia,
tra & in pulmone, eodem modo, ut capsula Glis-
nii vasa hepatis, includit, quam cel. Lancisius
aud pridem egregie descripsit, b) eam adhuc sup-
ementi loco hic indicare volui.

(42^{*}) ad pag. 102. Venas bronchiales, quas de vena
homine sæpe frustra investigavi. primum An bronchiali.
9. in cadavere muliebri clare ac perspicue vi-
, aliquot ramis ex venis intercostalibus ad bron-
ia abeuntes, quorum ramorum tres erant satis
tabiles, calami straminei tenuioris crassitiem ha-
ntes; quæ vero non semper occurrunt. Sed COV-
ERUS affirmat, se unam vel plures sæpe vidisse in
bclavias influere. c) Plura de hac vena legi pos-
nt in cel. Morgagni. Epist. anat. I. n. 90. ubi
ter alia etiam meminit, Galenum iam de hac
na scribere.

(43^{*}) ad pag. 125. Auricula & ventriculi cor-
s, licet non in omnibus, ob diversam ætatem, de magnitu-
tuturam aliasve causas, eandem magnitudinem & dine caven-
pacitatem habeant; tamen auricula dextra & rum cordis.
ntrculus dexter ut plurimum sinistris capacio-
s existunt: quæ de re multa experimenta ab
elvetio, Salzmanno, Michelotto & Morgag-
nio

a) Conferri hac de re prolixius possunt ea, quæ Helvetius
in Histor. Acad. Reg. Anni 1718. pro condensando san-
guine in pulmonibus, & contra hunc Michelottus in pe-
culiari epistola, atque Santorinus observat. anat. pag.
143. pro eo attenuando doctissime scripserunt. b) Lib.
de corde, &c. p. 23. 30. c) Anat: of. Hum. Bodies.

nio facta collegit & recensuit Nicolai, a) Anatomes iam Profesor Argentorati; quibus vero adhuc alia superaddit Santorinus b): quae egregie hoc argumentum illustrant.

(44*) ad pag. 125. Hoc tuberculum, quod Lovverus primus descripsit c), quodque in boum & vitulorum cordibus, massa sive eminentia carne efformatum, facile ostenditur, in corde humano nunquam observare potui. Memini quidem aliquem praceptorum meorum, cum tuberculum hoc in corde humano auditoribus suis ostendere velle, aperta vena, cum nihil in loco a Lovvero indicato protuberaret, volsella partem eam, ubi tuberculum in cordibus vitulinis existit, apprehendisset, illamque elevando dixisse: Videtis hic tuberculum cordis Lovveri. Verum cum nec ante nec post usum volsellae tuberculum eo in loco viderem, diligenter deinde in quamplurimis cordibus humanis in illud inquisivi; verum nunquam illud deprehendere potui. Interea tamen laudatus meo Nicolai d) affirmat, quod haec eminentia in homine longe maior sit, quam in bestiis. Verum ego ob hanc causam plura corda humana in spiritibus vini asservo, in quibus semper ostendere possum tale tuberculum sive eminentiam abesse, eamque ob causam in prioribus huius libri editionibus illud, tanquam partem in corpore humano non existentem, omisi. Nusquam etiam in elegantissimi de corde figuris in Covperi nova Myotomia reperitur; sed concursus ille venae ascendantis & descendens

a) in Dissert. de Directione vasorum &c. pag. 51. b) Observat. anatom. pag. 144. c) lib. de Cord. pag. 48. Tab. I. fig. I. cap. I. d) loc citato pag. 53.

ndentis, planus, ut ego eum semper vidi, repræ-
sentatur: & si forte quandoque adest, quemad-
modum & Schulzius se illud vidisse affirmat, a)
vero tamen id adesse existimo.

(45*) ad pag. 126. Lovverus in cordis de- de fibris
scriptione fibras rectas musculares, subiectas reli- cordis re-
as involventes, descripsit: quæ quidem in anima- tis.
bus brutis facile ostenduntur; verum a quibus-
dam magni nominis anatomicis in humano corde
orsus negantur. Fateor quidem, tam multas in
c non adesse, quam in bestiis; attamen hoc affir-
mo, me in humano eas ostendere posse; præsertim
superficie sinistri ventriculi. Quem in finem
adhuc cor humanum diuturna maceratione in aqua,
nec membranam externam avellere potuerim, ita
paravi, ut ablata membrana hac, mox fibra
etæ in conspectum prodierint: quod cor etiam
propterea adhuc in spiritu asservo, ut dubitanti-
bus illas ostendere possim.

(46*) ad pag. 127. Non conveniunt recentio-
res anatomici de situ œsophagi respectu aspera ar- de vero œ-
ria in collo. Plerique eum recta post tracheam sophagi situ,
eum esse scribunt, inter hanc scilicet & vertebrae
illi; Clar. Morgagnius vero eum aliquo modo ad
latus dextrum trachea inclinantem delineavit. b)
d Winslous ad latus sinistrum illum semper si-
um esse contendit. c) Cantius erroris Vesalium
excusat, quod gulam post tracheam collocaverit;
etque simul Morgagnium reprehendit, quod œso-
phagum

a) in commerc. literar. An. 1731. p. 33.

b) Adversar. anat. prim. Tab. I. lit. G.

c) Histor. Acad. Reg. An. 1715. pag. 315.

phagum in latus dextrum aspera arteria pinxerit, provocatque ad Eustachii tabulas. Verum ego in hoc situ naturam variare, & ut dicunt, ludere existimo: certeque asseverare possum, me, ut alia observationes taceam, adhuc ultimis investigationibus aliquoties gulam œsophago subiacere deprehendisse; in aliis cadaveribus ad latus dextrum inclinantem, ut a Morgagnio pingitur; attamen eum etiam in latere sinistro vidi. Si quis vero Eustachii tabulas, ad quas Cantius, licet neque numerum tabulæ neque figuræ indicet provocat, recte inspicit, ille cogoscet, opinor, Eustachium etiam œsophagum post tracheam pinxisse. Nam in tab. 41. fig. 8 & 9, ubi trachea cum gula (quod notandum) capite, dextro lateri incumbente sistitur, gula vix potest aliter apparere quam si ad latus sinistrum inclinaret, licet post tracheam sita sit; tabula vero 42. fig. 4. & 6, gula & trachea quam manifestissime sibi incumbunt.

de ductibus
novis Ver-
cellonii.

(47*) ad pag. 127. Ductus excretorios novos, in œsophagum desinentes, multos haud adeo pridem descripsit IAC. VERCELLONIVS in libro, cui titulus: dissertatio anatomico-medica, de glandulis œsophagi conglomeratis, 4. Astæ MDCCXI. In hoc libro Autor contendit, digestionis negotium nondum hucusque perspectum fuisse, quia Medici humorem vere digestivum ignoraverint. Hunc vero humorem œsophago & ventriculo, per ductus subtilissimos infundi, 1. ex glandulis conglomeratis, sinistro ventriculi ostio assitis. 2. Ex dorsalibus, & 3. ex bronchialibus & trachealibus. Ex thyroidea vero glandula, quæ nidus esset ovorum verminoso-

ovula verminosa ad æsophagum & ventricu-
transmitti : quæ chylo characterem vitalem
ciliarent ; sicuti hoc iam in Adenologia N. 384
seq. indicavi. Quid vero de his glandulis ac
tibus observaverim, in adenologia quoque can-
e professus sum.

[48*) ad pag. 131. Naturam varie in sinu ^{de sinibus}
his dura matris ludere, quartumque non sem- ^{dura ma-}
adesse, iam pag. 128 notavi. Hic vero adhuc ^{tris.}
pendum sinum lateralem sinistrum ex observa-
re Morgagni sapissime a dextro incipere, non
em a longitudinali, ut vulgo putarunt. a) De-
e sinus falcis, quem inferiorem vocant, mihi
rium minime sinum videri, quia tunica eius te-
s, ut in aliis venis ; neque figura eius angu-
is, ut aliorum. Præterea notavit Morgagnus,
sinus laterales per canalem peculiarem transver-
b communicantes invenisse b) : id quod ego quo-
anno 1726 vidi : huncque canalem sive sinum
communicationis, sicuti in eo cadavere erat, Tab.
fig. 32. delineari curavi. Rivinus quoque
is transversi mentionem facit, Dissert. de Au-
us vitiis, pag. 31. Omnes vero minores dura
tris sinus describere velle, vix operæ pretium es-
puto.

[49*) ad §. 273. pag. 138. Non pauci sunt aucto- ^{de rete mi-}
qui hoc rete homini denegant, quorum varios ^{rabili.}
legit Nicolai, c) mirorque ipsum Ruyschium,
hoc rete olim figura & verbis indicaverat d),
nunc

a) Adversar. anat. VI. pag. 2. b) ibidem pag. 2.
Dissertat. de Directione vasorum, pag. 43.
Epist. problem. XII. Tab. 13, lit. T.

nunc illud fabulis annumerare a): cum tamen modo dura mater utrinque iuxta glandulam pituitariam scalpello decenter aperiatur, unicuique te mirabile facile in conspectum veniat. Illud primum a Varolio descriptum esse, notat Morgagni Epist. anat. 1. n. 91.

de primario
visus organo.
no.

(50*) ad pag. 134. Veteres pro primario visus organo humorem crystallinum agnoverant recentiores vero superiori seculo tunicam nervi oculi, retinam dictam: quæ sententia cum experimentis opticis optime conveniens, plerisque & Medicis & Mathematicis post Cartesium placuit, adhuc hodie placet. Attamen Mariottus, celeberrimus Mathematicus, choroidem organum visus proprium constituere voluit b), multis ratiociniis & experimentis in medium adductis. Hunc deinde secutus est Meryus c), varia quoque nova experimenta proferens; itemque Dortu de Mayran d) Dn. de S. Yves, ophthalmicus quondam Parisinus lebris. e) Verum quia in omnibus reliquis sensuum organis pars sentiens primaria nervus est, rationem sufficientem non video, quare hic nervi tici expansionem in oculo, quæ retina est, excutere, alique minus ad sensationem aptæ membranae hoc negotium committere malimus. f)

de humeris
aquei et
crystallini
in oculo vero
situ contro-
versa.

(51*) ad pag. 144. Lis ab aliquo tempore mihi mota est, ab adversario sententiæ meæ de cata-

a) Adversar. anatom. II. pag. 45.

b) Nonvelles decouvertes touchant la vue, & Aët. Eru. 1683. pag. 67.

c) Histor. Acad. Reg. 1704.

d) Dissert. de causa lucis phosphorum, vid. Aët. Eru. 1717. pag. 460.

e) Traité des Maladies des Yeux, pag. 36. f) conf. de la même re diss. de Visu, & Hamel. Hist. Acad. Reg. m. pag.

& glaucomate, VTRVM PLVS HUMORIS
 QVEI EXISTAT IN ANTERIORI, AN IN
 POSTERIORI OCULI CAMERA? id est, utrum
 is humoris aquei inter corneam & uveam,
 inter uveam & lentem crystallinam existat?
 Versarius sustinebat, in posteriori; ego vero
 anteriori camera plus contineri, affirmabam.
 , ut videtur, ex figuris librorum magis, quam
 topfia edoctus, & ad hypothesein suam de sus-
 sione sive cataracta tanto melius defendendam,
 sentire necesse habebat: praesertim cum pleri-
 e scriptorum anatomicorum & optidorum, spa-
 m illud inter uveam & crystallinum, vel ma-
 longe, a) vel saltem aequale b) pinxerint illi,
 od inter uveam & corneam intercedit. Cum
 ro ob multa experimenta, olim iam in Hollan-
 instituta, certus essem, plus humoris aquei in
 teriori, quam posteriori camera reperiri; tamen
 g occasione

a) vid. Vesalius cap. de Oculo. Casserii Tab. anat. lib. X.
 Tab. XII. fig. 1. Vid. Vidius Anat. Tab. 78. fig. 20.
 Valverde Anatom. Tab. III. lib. V. fig. 1. Keplerus Pa-
 ralipom pag. 177. Horstius de Natur. hum. Tab. XXIX.
 Bartisch. Ophthalmod. fol. 8. Plater. Tab. Anat. Tab.
 49. fig. 1. Highmor Anatom. p. 238. Baubin. Theatr.
 anat. lib. III. Tab. XXII. fig. 1. Bartholin. Anat. re-
 form. cap. de Oculo. Tauvry Anat. Tab. 14. fig. 1. &
 2. Briggs Ophthalmogr. fig. 5. Zahn. ocul. artificial.
 variis in figuris. Blegny Zodiac. Med. Gallic. An. III. p.
 112. fig. 1. Salom Alberti in Hist. part. corp. hum. Mee-
 kren obs. chirurg. append. cap. XII. Bourdon Tab. anatom.
 V. fig. 3. Wagner. diss. de oculo. fig. 5. 6. Poliniere Expe-
 riencies. de Physique Tab. 15. 16. alique.

b) ut Stephanus Dissect. part. corp. hum. pag. 303. Cartesius
 in Dioptr. Scheinerus in Fund. opt. Honorat. Fabri lib.
 de homine, pag. mihi 300. fig. 1. Newton. Optic.
 Hartsäcker. Dioptr. Verbeyen. Tab. XXVII. fig. 5. Kau-
 bault, in Physica, alique.

occasione huius controversiæ denuo accurate in huius rei veritatem inquirere, veramque delineationem exhibere, constitui: quia a paucis satis bene humorum oculi situs exhibitus est. a) Quia vero in oculis recentibus, & non congelatis, ob effluxum humoris aquei inter disseccandum, & collapsum tunicarum, humorum situs rite conspici, adeoque de eo recte iudicari nequit, propterea necessum est ut experimentum in oculis congelatis instituatur in quibus, si caute procedamus, omnia naturalia & verum situm retinent. At quoniam ultima illius hyemis, ut & penultima maxima pars, cum altera vice hoc compendium ederem, nimis temperata erat, & magni frigoris tempore cadavera humana mihi non mox prostabant, primo in variorum animalium oculis recentibus, ego aliquot tam Altorfi, quam Norimbergæ, instinctu meo experimenta instituimus, & in omnibus his oculis, per axin dissectis, crystallinum uveæ valde vicinum, atque inter crystallinum & uveam exiguum, ac vix percipiendam humoris aquei copiam invenimus; inter uveam vero & corneam quadruplo, vel saltem longe maiorem semper quantitatem eius offendimus, sicuti ex Tab. nostra IV. fig. 18, quæ suillum oculum repræsentat, videre est. Nullus vero aequalem nondum maiorem copiam post uveam invenit; sed omnia experimenta & delineationes cum sententia nostra accurate conveniebant. Interea tamen, ut quoque ex homine delineationem veram exhibere

possem

a) inter eos, qui hunc situm optime repræsentarunt, sunt Fabric. ab Aquapend. de Visus organo, cap. VIII Mariott. de Visu, fig. 3. Bidloo de Oculis & Visu, pag. 3.

tem, si forte & ultima illa hyeme cadavera fri-
 is tempore me deficerent, per litteras rogavi Cl.
 MORGAGNIUM, quia sæpius ipsi cadavera præsto-
 nt, ut non solum suam sententiam hac de re
 bi perscriberet; verum etiam oculi humani,
 to modo preparati, delineationem transmitteret.
 quæ Vir humanissimus doctissimusque, VII Kal.
 ruar. anni 1719, non modo respondit, se sem-
 longe maiorem humoris aquei copiam in-
 corneam & iridem, quam inter hanc & cry-
 linum vidisse? sed etiam delineationem, quæ Tab.
 ra IV fig. 19 hic a nobis exhibetur, benevole
 smisit. Opportune vero in fine mensis Martii
 i 1719, cum alteram huius compendii editio-
 a pararem, cælum frigidum nobis favit, ut ex-
 imentum quoque novum in homine, violenta morte
 incto, instituere optime licuerit, ubi in theatro
 tomico, toti spectatorum corona, in oculo bene
 glaciato clare demonstravimus, vix conspicuam
 moris aquei copiam inter iridem & crystallinum,
 re vero maiorem inter iridem & corneam exti-
 e: ita, ut cum delineatione MORGAGNII ocu-
 hic optime convenerit: id quod & postea nobis
 tisque aliis semper feliciter successit. Potuisse
 hinc quidem nostram delineationem hic exhi-
 e: sed maluimus viri integerrimi, & a partium
 lio liberi, figuram retinere, ut æqui arbitri tanto
 ius inde iudicare queant, utrum adversarius,
 Morgagnius & ego, verum scripserim. Vid. ea-
 de re observatio, quam olim Ephemerid. Acad.
 C. Cent. VII & VIII inserendam transmissi: quæ
 dem pag. 381. legi potest.

dis quidem nonnulla, verum consueto, amaru-

nova obie-
ctiones.

lento suo more & stylo Wolhusius variis in scriptis opposuit; atque in eis audacter calumniando, quasi rem suam honesto ac decenti modo agere non posset, meam sententiam & experimenta convellere al- laboravit. Verum sicuti in Apologia & Vindictis meis ipsum de erroribus, plagis ac mendaciis quamplurimis ita convici, ut hucusque coram orbe literato se ab iis purgare non potuerit: sic vel ex sola maledica sua scribendi ratione, qua cum in alios honestissimos viros, tum in me continu- acerbissime debachari pergit a), honesti malam eius rem satis agnoscunt. Quare etiam cum inficet tali adversario, praesertim cum viri plures praestantissimi, inter quos Morgagnium & Winslo- um, summos anatomicos, Petitum, Medicum do- ctissimum Namurcensem, Dn. Reneaume, Aca- demicum Parisiensem, itemque Dn. de St. Yves, Morandum, & auctorem, quisquis ille sit, qui com- pendium meum gallice verterit, atque commenta- rio illustravit b), nominasse sufficiat, mihi assen- tiant, me ulterius committere, donec urbano de- centique modo forte aliquando scribat, nolo. At- tamen uno alterove tantum exemplo hic demon- strabo, quam vana ipsius sint argumenta contra me producta. c) Primum ipsi est, "quod globus „oculi,, a parte convexa corneae, usque ad cen- trum oculi semper crescat & augeatur; ergo „cameram oculi posteriorem maiorem esse, „quam anteriorem., Verum hoc argumentum cla- re ostendit, quam male ocularius hic oculi fabricam intel-

a) vid. Censuram eius amarulentiae plenissimam in Memor. Trevolt. An. 1725. mense Martio

b) titulo: *L'Anatomie d'Heister*. 8. à Paris 1724.

c) *Journal des Scavans* A. 1720.

telligat. Hoc quidem argumentum verum esset, si oculus sphaera cava, liquore solum repleta esset, vel ligamentum ciliare longius esset, aut remotior a cornea situm haberet. At quia hoc cum crystallino, tanquam paries sive septum, camerae posteriori brevissimos limites ponit, sicut ex Tab. nostra IV fig. 19 (quæ Clar. Morgagnium auctorem agnoscit) conspici potest, hinc hoc argumento non vincit, quod volebat; sed potius ex vero hoc uveæ ligamenti ciliaris, crystallini & vitrei situ manifeste cognoscitur, cameram posteriorem non augeri, ut anteriori maiorem fieri, quamvis oculus versus centrum crescat. Deinde ex puris copia, quæ, quandoque in hypopio post uveam observatur, sententiam suam stabilire contendit. Verum quales mutationes partium in morbis fiant, & imprimis quantum pus alicubi contentum partes præ naturam divellere, expandere & mutare possit, nemo ignorat: id quod vel ipse adversarius in Memor. Trevolt. An. 1725. pag. 406. in maledictione sua censura sponte fatetur. Vnde constat, quam male ex hoc aliisque morbosis casibus, aut operationibus quibusdam chirurgicis, naturalis & vera oculi constitutio doceri queat. Ita & reliqua eius argumenta similis farinae facile, si vellem, refutare possem. Verum quia compendii ratio non permittit, ut in una controversia nimis diu versemur, hæc & consensus supra laudatorum virorum nobis sufficiant, lectoribus iudicium reliquentes, cuius sententiam amplecti malint: præsertim si ea quoque, Cl. Winslous hac de re in Memor. Acad. Reg. An. 1721, & Petitus, Medicus, in eadem Acad. Regia. An. 1723. scripserunt, prius legerint.

de oculo a-
nimadver-
siones aliæ.

(52*) ad pag. 144. HOVIVS in tractatu suo de motu circulari humorum in oculis, vasa sanguifera minora in oculo, quæ sanguinem verum non amplius vehunt, sed lymphaticum, dum a RVYSCHIO descripta atque delineata a), nomine donavit, eaque NEURO-LYMPHATICA appellavit. Quam vero ob causam novo & inusitato nomine hic opus sit, & præsertim tali, a nervis desumpto, in vasis, quæ, vel arteriarum, vel venarum, propagines sunt, & ab aliis arteriæ vel venæ lymphaticæ, prout vel ab his vel ab illis oriuntur, appellantur, vel vasa arterioso-lymphatica, ego certe idoneam rationem non video: & idcirco a nomine tali quod perversam ideam lectoribus ac præsertim tyronibus, excitare potest, abstinere maluimus. Præterea in eodem libro quedam adhuc lectorum uberiori considerationi commendamus: ut, quando 1. tunicam choroideam in quinque tunicas dividendam esse vult; dubito vero, an in oculo humano hanc divisionem præstare queat: cum sua experimenta, ob cadaverum inopiam, ut ipse pag. 58 fatetur tantum ex brutis desumeret. 2. Musculosas fibras in processibus ciliaribus, & ligamento ciliari negat, pag. 68 & 101: quia vascula essent. Verum respondeo, ratum esse hodie prudentioribus anatomicis fibras musculosas esse cavas, five vascula: ideoque ex hac sententia nulla amplius musculosa fibræ in corpore essent statuenda; id quod absurdum esset. Hoc vero vasculosum esse, non prorsus repugnat musculosæ naturæ: quæ potissimum in manifesta motus sive contractionis actione consistit. In pupilla vero actio

con-

a) in Epistol. problem. Tab. XVI.

contractionis & dilatationis est manifesta, & fibre, musculosis simillima, in processibus ciliaribus conspiciuntur, quæ vasculorum habitum prorsus exserunt. Ergo merito pro veris musculosis fibris habenda sunt. Pagina tamen 25 uveæ substantiam appellat musculofo-membranaceam. 3. Pag. 21. contendit, vasa adducentia oculorum una eademque scaturigine provenire, a quo scilicet carotidis interno; aut non intra canalem admissio, uti NUCK sustinuisse; verum oculorum orbitæ impertito. At sciendum, quod in homine etiam revera e cranio ad oculum excurrant. 4. Pag. 49. ait, ductum arterialem Nuckii, e cranio proveniente, non esse scaturiginem ductuum aquosorum, quia nimis parvus esset. Respondetur, eum non esse scaturiginem, sed per anastomosis iunctum cum aliis ramis ad oculum excurrentibus. 5. Pag. 60. choroideam tunicam cum Mariotto aliisque a pia matre productam esse, perhibet: verum hoc non probat. Nam non solum diversissima est natura, coloris, figura & habitus; sed etiam certum est, reliquas membranas corporis similiter cum pia matre generari, & ortum suum ab ea non debere. 6. Pag. 45. inquit, crystallinam e nervis pellucidis constare. Sed quaro, cur non potius dicat cum aliis, ex vasis pellucidis? Pag. 75. Gluten in sanguine sine novo acido restaurari non posse ait, illudque acutum non nisi in glandulis separari. Quam sententiam nullo modo probavit, nec probare forte unquam poterit. 8. Pag. 77. affirmat, conglomeratas glandulas nullis inferentibus

gaudere vasis : quod vero est contra omnem rationem atque experientiam : si enim nulla inferentia essent vasa, nihil in ipsis secerni posset.

Pag. 95. ait, circulum venosum a ligamento ciliari linearum NB. SEX, SEPTEMVE mathematicarum distantia abesse cum tamen oculus integer vix septem lineas superet, & hic circulus ligamento ciliari sit quam proximus. Vnde apparet, eum, quid linea mathematica vocetur, non intelligere, 10. Arterias oculi, fontes appellat variis in locis ; sed quid opus est novo nomine & entia præter necessitatem multiplicare?

Pag. 165 angulum oculi internum, canthum minorem appellat, id quod est contra consuetudinem & ipsos sensus. Tacemus iam multas similes hallucinationes. Ceterum in amarulenta sua epistola in meritissimum RVYSCHIVM perhibet, ac persuadere vult lectoribus, se (homines Batavum) RVYSCHII scripta adeo nota & celebrata, nunquam vidisse, ut plagia sua defendat. An vero quis facile hoc credet, cum in Hollandia ubique prostent, omnibus literatis notissimi sint, valde dubito.

de nervio-
ptici inser-
tione.

(53*) ad pag. 144. Notandum hic esse existamus, quod nervi optici, licet obiter intuenti appareat, in oculis ex orbita exemptis, atque musculis ac pinguedine liberatis, quasi directi in medium sive centrum partis posterioris oculi inserantur, tamen oculum non ingrediantur in loco pupillæ e diametro opposito, ut BRIGSIUS voluit a); sed utrinque magis prope nasum

a) Ophthalmographia cap. 3.

radii ab obiectis in ipsos nervos, cum quibus
 eria ingrediuntur, incidant, a quibus quasi
 ſorbentur & ſuffocantur. Pupilla enim utrius-
 oculi per pollices fere tres a ſe invicem di-
 ſtant; foramina vero cranii, per quæ nervi op-
 titas intrant, parum ultra unicum pollicem.
 Sciendum vero eſt, hunc oculi locum, ubi nervi
 ſi eum ingrediuntur, cæcum eſſe: id quod no-
 bi MARIOTTI experimento primum evictum eſt
 ; hinc multa non viderentur, ſi directe e regi-
 o pupillæ nervi ingrederentur: quod vero incom-
 modum nervi a latere naſi inſertione præcavetur,
 homo talem defectum in oculo non percipiat.

(54^{*}) ad pag. 145. Quod per hunc ductum ^{de quanti-}
 nonianum larga ſalivæ copia, præſertim inter ^{tate ſalivæ.}
 mandendum effluat, variæ obſervationes chirurgi-
 docent. Et primo quidem Fabricius ab A-
 ppendente obſervavit, c) in vulneribus ge-
 rum verſus aurem, foraminulum angu-
 ſtum, vix oculis conſpicuum, apparere, per
 quod, potiſſimum ubi patientes mandunt, tan-
 ta copiam exire limpidæ aquæ, quæ eſt ve-
 ri lacryma ab oculis emiſſa; quæ vero quo-
 do & unde effluat, ſe nescire fatetur; ductus
 ſalivales tunc nondum erant cogniti. De-

g 5

inde

conf. Boerhav. Inſtit. Med. cap. de Viſu, & cumprimis
 Winſlow in Memor. Acad. Reg. An. 1721. ubi adhuc
 varia alia de oculo doctè pertractat.

Nouv Decouvert. touchant la vue: quod deinde de la Hi-
 re, diſſert. de Viſu, Boerhav. l. c. Stancarius Schedis ma-
 them. pag. 38. alique confirmarunt. Ego hoc quoque
 experimentum more Mariotti ſæpe immitatus ſum; ve-
 rum etiam nova ratione noſtu, ope vel unius, vel dua-
 rum candelarum illud inſtitui: ubi legitimo loco ac
 diſtantiâ repertis, mox candela diſparuit.

in Chirurgia, cap. de genarum vulneribus, m. pag. 180.

inde Helvetius affirmat, a) quantitatem huius liquoris, in hac glandula secreti, tantam esse ut, cum miles vulnus gladio inflictum accipisset in gena, quo ductus hic saliva dissectus esset, quoties hic cibaret, semper unico, eoque brevi prandio vel coena, quot mappulas (serviettes) saliva per hunc fluente totas impleret. Similes casus & adhuc alii viderunt. Vnde constat, quam apte nonnulli, motu maxillae in manducatione saliva in glandulis separationem & progressum os promoveri, negent, totumque negotium animi adscribere velint. Conf. & Nuckii Sialograph. cap. III. pag. 64.

*de glandula
sublingualis
ductibus.*

(55) ad fin. pag. 145. Glandulas sublinguales vascula excretoria utrinque ad linguae latera oblique brevissima & angustissima, sibi invicem parallela, vixque conspicua, nisi premantur, Stenon prius in brutis notavit atque delineavit b); inde Stenonis verbis, eius tamen nomine suppresso, ea quoque indicavit Verheyenus. c) Verum quia a summis quondam Belgii Anatomicis hac in homine nunquam demonstrata viderantur, hosque & alios magni nominis Anatomicos aliter sentire ac scribere noveram, atque ego ipse aliquoties frustra investigaveram, ea in brutis tantum ita esse pataveram: donec Clar. Morgagnus non modo in litteris suis, humanitate atque eruditione plenissimis; sed etiam in scriptis suis doctissimis d) me certiores reddiderat, da
rever*

a) Histor. Acad. Reg. An. 1719. pag. 43.

b) in Observat. anatom. de Glandul. oris, §. 20. fig. 3.

c) Anatom. Tract. IV. cap. XX.

d) Adversar. VI. pag. 130.

vera etiam in homine complura utrinque eius-
odi vascula, quæ ab exterioribus glandula-
m sublingualium lateribus, non antrorsum,
in transversum, recta gingivas versus ten-
ent, & non magno a glandulis intervallo
culiari quodque osculo hiarent, per quod
pius tenuiores fetas immittere potuerit, a
tempore maiori cura in ipsa inquirere cæpi,
ue etiam tandem inveni. Interea vero ha-
n glandularum ductus peculiari dissertatione
lixius descripsit, & primus, quantum novi,
homine delineavit Clar. Waltherus, Regis Po-
archiater, & professor Lipsiensis celeberr. a),
umque octo representavit. Mense vero Feb-
rio anni 1727 in cadavere virili hos ductus
ge plures atque ampliores, quam unquam alias
i, inveni atque, sicuti erant in hoc cadavere, ex
latere, lingua adhuc perspicuitatis gratia
n maxilla inferiori naturaliter coherente, ac-
ate delineari curavi. vid. Tab. nostra VII.

33.

(56*) ad pag. 146. In eodem cadavere, fo-^{de lingua}
nen, cœcum vulgo appellatum, in lingua^{foramine}
de amplum & profundum deprehendi, ita, ut^{cœco eius-}
ssum tubulum, qualem alias pro ureteribus^{que nobis}
vesica inflanda adhibere soleo, nullo negotio
mittere potuerim. Cumque per hunc, pro du-
a Vatero indicato, detegendo aerem inflarem,
s lingua posterior insigniter quoque intumesce-
. Quoniam vero nec sic eius verum situm,
stitutionem & progressum cognoscere valebam,
pone ceraceam materiam rubram inieci, atque
hoc

hoc eo quidem successu, ut, postquam foramen cum in lingua aperuerim, (vid. Tab. VIII. 34. lit. A.) mox principia duorum notabilium, usque non descriptorum, ductuum se offerebant, qui ad lineam circiter profunditatem sub tegumentis linguae pergebant; quibus tegumentis caremotis, ductus hi, alter in sinistro, alter dextro latere eadem figura, magnitudine, & progressu, sicuti hic ad exemplar delineati sunt, apparebant; quorum sinister b usque ad berculum c c, quod vesicula pellucida erat, quore saliva simillimo turgebat, qui liquorem ut mihi videtur, a cera vi iniecta in illum cum repulsus est, ubi cedere nesciens, partem posteriorem huius ductus ita dilatavit. In dextro d, non nisi in principio aliquid cera harebat, qua rursus exempta, flatum ope tubuli tenuis iectum usque ad e propellere potueram, sic ut usque ad e ductus eiusdem substantiae, ac salivae Warthonianus est, se manifestabat; in cuius fine vero nulla vesicula, ut in altero latere, conspiciebatur: qui igitur ductus in hac lingua, quod adhuc in spiritu asservo, veri ductus salivales mihi videntur. Quoniam vero in eodem foramine caeco adhuc tria oscula lit g g indicata, eadem magnitudine, ut hic exhibentur, aderant, deorsum spectantia, quae autem stylum tenuem ultra lineam unam alteramve non admittebant, hoc foramen sive canalem cum Collino, Morgagnio & Vitero ductum excretorium glandularum linguarum, vel concursum esse iudico variorum ductuum, qui ex glandulosa substantia linguae salivam indeponunt: quos vero ductus, praesertim si magni illi

foramen abest, quemadmodum saepius contin-
per plura minora oscula se exonerare, natu-
que in his valde variare existimo. Quae ce-
quin adhuc in hac figura notanda, in tabula-
explicatione monebimus. Ductus vero a Co-
witzio pro salivalibus novis descriptos atque
reatos, & a Kulmo a) repetitos, cum Du-
noi a) aliisque venas esse iudico.

57*) ad pag. 146. In hoc ipso subiecto duas ^{de glandulis} glandulas conglomeratas, utrinque unam, ^{molaribus.}
dentes molares posteriores maxilla superio-
inter muscolum buccinatorem & masse-
m, ea magnitudine & figura, ut in fig.
ffff delineantur, deprehendi, quae ob situm
ares dici possent: in quarum qualibet duo mag-
scula, punctis lacrymalibus duplo ampliora,
facillime setas crassas, gg gg, itemque stylos,
us in fistula lacrymali utor, ad duarum li-
um profunditatem, admittebant, perbelle con-
ebantur; in sinistra vero adhuc duo vel tria
o minora foraminula aderant, quae omnia
branam oris & buccinatorem muscolum pene-
ant, glandulaque leviter pressa, guttulam
libet salivae pellucidae dabant. Fig. 37, osten-
faciem externam glandulae sinistri lateris ex
bus minoribus, fere ut mori fructus compa-
: unde, quod ad compositas sive conglomerata-
ut vocant, pertineat, cognosci potest; quae ve-
hoc cadavere, ubi dentes posteriores deficie-
cum glandulosa palati substantia coharebat.

An

An hæ glandula semper adsint, earumque ductus
sive oscula excretoria in aliis quoque adeo sint ma-
festa, affirmare non audeo, sed ulterius inquiri-
dum est.

(58*) ad pag. 146. Cum in eodem cadavere ci-
de ductu mu- tubas Eustachii & musculos columella pervestig-
cose in pha- dos occupatus essem, forte fortuna digito impin-
ryngis for- in supremam pharyngis partem, in locum figu-
vice. 38. b, membrana illius crassæ, quæ ibi inferioris
partem apophysis magnæ ossis occipitis investit,
ex loco a, prope supremam vomeris partem, humo-
rem mucosum, non pellucidum, prodire observa-
Cumque postea studio illam regionem ac viciniam
premerem, semper similis humor prodibat. Expe-
raturus, quid hoc foraminis sive ductus in fauces
antis esset, primo stylum tenuem versus anteriora
itemque ad latera immittere volebam; verum
non succedebat. Postquam vero eum recta ad pos-
teriora, sive versus magnum occipitis foramen
rigerem, facile ad digiti transversæ profunditatem
intrabat: nimirum usque ad b. Deinde cum ca-
noscerem, meatum sive canalem hunc tam amplum
esse, ut crassioris stylum admittere posset, tale
immisi, qualis in eadem figura lit. f conspicitur.
qui quoque usque ad b liberrime intrabat. Immo
etiam aerem per tubulum; ob densam vero substan-
tiam parum vel nihil distendebatur: sensim tam
sensimque satis largam liquidi mucosi copiam expro-
mere poteram. Aperui deinde hunc meatum, cuius
que ab osculo a ad b, inter substantiam densam
glandulosam, qua cingitur, sub medio apophy-
sis occipitis versus foramen magnum se extendere
comperi. Suspicebam primum, annon hic ductus for-

mort

posus eset in hoc cadavere, aut ulcusculum
per naturam, inprimis quia vir hic, præter
symptomata, quæ passus est, etiam faucium
inflammatione, eo morbo, quo mortuus est, labora-
t, præsertim quia etiam non succurrebat, quod
quam de ductu tali hoc in loco aliquid scripse-

Postea vero incido in locum Santorini a),
de pharyngis fornice agit, quo hanc fere re-
m intelligit, quam hac figura inter narium
tuba posteriora, utramque tubam Eustachii &
men magnum occipitis representamus. De
scribit, quod densa crassaque membrana
tegatur, plurimis cumculata glandulis, e qui-
spissior mucus destillat. Hanc in leves
tates, quodam velut ordine compositas,
quando discretam se offendisse, aliquando
inordinatos loculos diductam, aliquando
cavernosam reperisse, quæ conspicuis of-
, ac profundioribus sinubus, propemo-
tonfillas æmularetur, e quibus primum
et mucosum humorem elicere. Hic mu-
sive ex pluribus osculis, sive ex unico, ut
hic observavi, & quasi communi proveniat,
uius canalem vicina glandulosa substantia se
coneret, (qua in re analogia inter canalem si-
bramæ illud lingua & hunc canalem interce-
coniicio) pro faucibus lubricandis, vocis sua-
te ac cibis facilius per gulam detrudendis in-
re videtur. In statu præter naturam autem,
undat, ex his fontibus illam proluviem, quam
fecti e capite destillare indicant, & frequen-
ti

ti excreatione reiiciunt, maxime provenire, c
Santorino iudico.

de ductu e
naribus ad
palatum.

(59*) ad pag. 152. In ultimis, qua secui,
daveribus magno studio in ductum hunc, Ster
nis, ut vocant, a naribus in os, post dentes in
fores inquisivi. Verum quo manifestior est in
leti capite, eo obscurior mihi apparet in cadav
bus. Rugas & foveolas quidem varias post a
tes incisores semper deprehendo; sed nullum
ctum aut canalem ad nasum, neque stylo tenu
mo, qui neque seta, puncta lacrymalia facile ing
ditur, detegere potui. Palati membrana rugosa
dem postea resecta, stylus quidem in canalem osse
iuxta membranam, qua per hunc canalem exp
rigitur, per breve spatium intrabat; verum
nasum non penetrabat. Ita vice versa nec e
so ad os aperturam reperire potui, qua vel tenu
simum stylum aut setam transmisisset. Qu
membranam hanc, qua satis valida est, ligame
tum quasi esse suspicor, quod membranam pa
ti ossibus nectit & firmat, ne a durioribus
asperioribus alimentis, aliisve iniuriis a palati
sibus facile avellatur, unde gravia alias symp
mata oriri possent.

de biatu Ri-
vini in
membrana
tympani.

(60*) ad pag. 154. Cl. RIVINVS hoc fo
men, quod nonnulli hiatum Rivini appellant,
tuit in ea parte tympani, ubi chorda sita est,
manubrium mallei capitulo suo iungitur: sicut
cum hunc designat & figura illustrat ipse RI
NVS a) itemque Cl. TEICHMEYERVS, discip
lus & Auditor quondam RIVINI, Anatom. i

Prop

professor Ienens. celeb. amicus & fautor singulariter colendus. a) Alii hoc foramen alio in loco, alioque modo describunt: & quidem inter recentissimos scriptores anatomicos, CHESELDENVS affirmat, membranam tympani, eo in loco, ubi circulus osseus, cui in infantibus hac tympani membrana innascitur, integer non est, in tantum apertam esse, in quantum circulus ille dedit b): Eam tamen aperturam in diversis hominibus variam esse fatetur: & in quibusdam eam eo patere, ut ignem candela, pressione aeris ex clauso per tubam Eustachianam & aurem externam, extinguere potuerint: Iequae vidisse virum, si fumum tabaci, integri tubuli tabacalis sensim attractum, per aures rursus emisere; atque hunc virum optimo auditu gavisum esse. In cadavere virili se membrana huius dimidiatam apertam deprehendisse; virum tamen non esse surdum. De alio refert, fide tamen Dn. S. Andreae, quod ei totum tympanum ulcere destrutum, atque ossicula auditus eiecta fuerint, & tamen auditum non sublatam esse. Sed haud meminit, hoc in una, an in utraque fuerit aure: si enim lésiones in una tantum fuerunt, altera adhuc aures potuerunt. Mihi contra notum est, auditum laborum ossiculorum omnino sublatum esse. Ceterum Munnicks c) & Valsalva d) asseverant, se quoque foramen Rivinianum aliquando vidisse; licet posterior alium locum indicare videatur, quam Rivin-

h

Quod

a) in Anthropologia sua, fig. 13.

b) In Anatom. suae primae editionis cap. de Aure. In tertia vero huius libri editione exiguum tantum hic loci adesse aperturam, eamque valvula esse testam.

c) Lib. de Re Anatomica. d) de Aure humana.

Quod ad me attinet, lubens fateor, me neque illam aperturam certo videre, neque reperire potuisse; licet in quamplurimis humanis & bestiarum auribus, magna industria, variisque experimentis, in illas inquisiverim. Asservo etiam adhuc tales membranas ex cadaveribus humanis, in situ naturali constitutas: quæ vero integerrimæ sunt, nullamque vel minimam aperturam, neque in loco a Rivino, neque a Cheseldeno indicato, in eis deprehendere possum. Novi etiam, Cl. R V Y-SCHIVM & RAVIVM, exercitatissimos quondam anatomicos, aperturam talem in tympani membrana sapius, sed frustra, investigasse.

Vidi quidem quoque iam dudum hominem, & haud pridem adhuc Helmstadii militem, qui fumum tabaci ex ore per aures transmittere potuerunt; verum hic ex ulcere auris; ille ex verberibus vehementibus, quæ puer acceperat, furdus factus erat: idcirco suspicandum, ipsorum tympani membranas ruptas fuisse. Nullum vero adhuc, auditu valentem, qui hoc præstare posset, invenire potui: licet multi fuerint, etiam sæpe inter Medicinæ studiosos in usu fumi illius exercitatissimi, qui huius experimenti gratia, hoc sæpius, omni conatu, tentaverint. Certum hinc esse existimo, hunc meatum sive hiatum, si detur, non in omnibus adesse; verum potius in plerisque abesse: alias plures repertum iri, qui illud perficere possent. Interea tamen, quia quidam (qui tamen, paucissimi sunt) id præstare valent, uti nonnulli scriptores testantur, illum hiatum non omnino negandum esse censeo. Atta-

men

en optandum est, ut Anatomici adhuc diligentius
hanc rem inquirent, donec veritas & consti-
tutio eius melius pateat.

Percepi quidem ab Auditoribus quibusdam RI-
VINI, clarissimum hunc virum hiatum illum de-
monstrare solere, seta procine appellatione ad lo-
cum supra indicatum, eiusque per membranam
tympani transmissione; oculis vero eum observare
aud posse. Tentavi quidem idem experimentum
eodem methodo, setaque transmissio mihi quoque
accessit. Verum semper dubius hæs, & adhuc
creo, utrum seta per naturalem meatum transie-
at; an potius per tam tenuem membranam no-
vam aperturam fecerit: experimentum enim sine
stabili quadam pressione mihi non successit; qua-
etiam aliis in locis membranam tympani perfo-
rare poteram.

Idem prorsus, quamplurimis experimentis hunc
finem institutis, convictus mecum sentit lau-
datus Cl. VVÄLTHERS, dissertatione docta de
membrana tympani. a) E contrario celeb. TEICH-
MEIERVS existentiam huius hiatus perpetuam
non solum vindicandam; verum etiam eius faci-
lem inveniendi rationem, in aure vitulina, novo
scripto, novaque figura docendam nuper sibi sum-
pt. b) Attamen nondum mihi contigit adeo esse
facilem, ut tam facile stylum, sicut ille asseverat,
transmittere potuissem. Ex adverso observare mi-
hi videor, locum huius hiatus in figuris Teich-
meieri & Rivini non unum eundemque indicari.

h 2

Quam

a) quæ Lipsiæ prodiit An. 1725. 4.

b) Vindicæ quorundam inventorum suorum anatomico-
rum, lenæ 1727.

Quam enim ille in *Anthropologia* dedit figuram, cum Rivini convenit, dum hiatus in area, ut vocant, maiore tympani representatur. In figura VII vero, quæ Vindiciis addita est, in area minori exhibetur. Deinde si hiatus hic semper, vel saltem sæpe adesset in homine, quero, cur non multi fumum tabaci vel aerem per aures efflare queant: cum tamen hi homines sint adeo rari, imo rarissimi. Plures habeo rationes, quæ contra perpetuam huius hiatus existentiam pugnant, quas vero hic proferre nimis prolixum foret.

de ossiculis
auditus.

(61*) ad pag. 154. Occasione numeri ossiculorum auditus notandum hic adhuc esse putamus, Cl. TEICHMEYERVM in laudata modo *Anthropologia* sex ossicula in unaquaque aure numerare & præter illa quatuor, vulgo recenseri solita, adhuc duo alia ex vitulis describere, figuraque 14 & 15. ea representare. Horum primum, lenticulare ab ipso vocatum, malleo & incudi, instar ossiculi sesamoidei interpositum, iisque per ligamenta iunctum esse, ad articulationem hanc firmandam, ad instar patellæ, affirmat. Alterum sive sextum ossiculum ad finem tendinis musculi stapedis herere, musculumque hunc, non in caput stapedis, ut vulgo perhibetur, sed ossiculo huic ovatæ figuræ stapedi lateraliter annexo, inseri hocque iam a VESLINGIO; alterum vero a nemine adhuc observatum esse.

Illud, quod lateri stapedis adheret, in vituli facile reperitur, atque id non solum Bilsius a) &

COW-

a) In specim. anatom. ubi auditus organi anatomia exhibetur, mihi pag. 17.

OWPERVS a) iamdudum delinearunt; verum
 id etiam semper meis Auditoribus demonstravi.
 Quia vero in homine nullum horum adhuc reperi,
 a hucusque inter ossicula auditus omisi. SCHEL-
 AMMERVS quidem in brutis etiam eiusmodi
 ossicula observavit b), nunquam vero in homine.
 Quid denique de quarto ossiculo, orbiculari
 dicto, sentiendum sit, iam supra § 68 indicavi.
 enim epiphyses pro peculiaribus ossibus nume-
 rare velimus, tunc os femoris non unum esset os,
 sed quinque constitueret.

Teichmeierus nuper his adhuc novum, tan-
 quam septimum ossiculum addidit, triangulare
 figuram ipsi dictum, quod quoque in vitulis
 reperisse docet; & quidem in pariete, ut ait,
 mastoidei ossis, cui crus incudis brevi-
 & crassius, tanquam basi sive hypomoeblio
 assisteret c): monetque simul, hoc os difficillime, &
 non nisi in coctis organis deprehendi, ac loco mo-
 veri posse. DOUGLAS denique etiam de alio ad-
 duc ossiculo auris loquitur d), quod nonnulli in
 ordine muscoli mallei, quem internum Eusta-
 chii vocat, observarunt. Hoc vero tantum ex-
 tremum a longo illo canali, cui inhaeret, abru-
 tum esse putat, quod tendini illi forte fortuna sub-
 de adhereret. Ceterum quod Alex. ACHILLINVS
 primus de mallei & incudis ossiculis scripserit,
 et forte inventor non fuerit, monet Cl. MOR-
 AGNVS, e) quia alii vulgo aliis, iisque recentio-
 ribus inventionem tribuunt.

h 3

(62*) ad

Myotom. reform. fig IX. b) de Auditu, pag. 44. & seq.
 c) in Vindiciis modo citatis, pag. 22.
 d) Myographia, pag. 27. e) Epist. anat. I. n. 92.

de Simon-
cellii distri-
butione ner-
vi auditorii.

(62^{*}) ad pag. 155. Quia liber hic, in quo singularis hic nervi auditorii reptatus describitur his in regionibus, & forte multis in aliis, extra Italiam, rarus est, imo & a MANGETO adhuc in Theatro anatomico omissus est, hinc Lectoribus curiosis, eisque, qui desiderio forte flagrant in hanc rem uberius inquirendi, integram descriptionem latine utcunque versam, hic adiungere, & qui adhuc spatium aliquod in Tab II aderat, figuram quoque sub numero 21. addere placuit.

Titulus libri est, LETTRES DE G. DESNOVES Professeur d' Anatomie & de Chirurgie de l' Academie de Bologne; & de MR. GUGLIELMINI, Professeur de Medecine & de Mathematiques à Padoue, de l' Academie Royale des Sciences, & d' autres Savans, sur différentes nouvelles decouvertes. A Rome MDCCCV in 8. In quo pag. 206. MASTICHELLIVS, Medicus Romanus, sequenti modo nervum auditorium describit. Par nervorum, auditorium, qui medulla oblongata proveniunt, ingrediuntur foramen ossis petrosi; & postquam portio dura a molli recessit, hæc per exiguum foramen quod linea centralis cochleæ format, transit & inde per exiguum foramen exit, quod a barrecta sursum ascendit. Postea in parte superiori non solum parva illa foramina, fere hæc conspicua, quæ VALSALVA indicavit, reperiuntur; verum adhuc meatus quidam, in quem seta immitti potest: per quem via libera datur portioni molli, formam filamenti adeptæ quæ, augetur in principio sicut in centro suo, atque in progressu prolongatur, se ita inflectit sicut

cut in circumferentia quadam, & per cavita-
 es spirales cochleæ, de qua iam diximus. Post-
 quam vero descendit ad finem basis, transit per
 arvum foramen in vestibulum. Hic vero hæc
 substantia mollis & nervea muco quasi quo-
 am involvitur, & diversis inflexionibus sen-
 im progreditur ad arcus usque labyrinthi;
 bi assumens iterum formam filamenti mollis
 & nervei, mox intrat orificium angustum mi-
 imi canalis, & transeundo per huius cavitatem
 em redit per proprium orificium parvi cana-
 s; & postquam transiit per hanc cavitatem,
 greditur inde e magno orificio eiusdem arcus.
 Hinc ingreditur orificium proprium parvi ca-
 nalis; & egreditur rursus ex orificio commu-
 ni huius arcus, per quem denuo intrat in ca-
 alem magnum, & egreditur iterum ex orifi-
 cio proprio, tandemque ex osse petroso exit
 per unum foraminum illorum, quæ transver-
 tim in vestibulum hiant, atque in cranium re-
 tertendo se in cerebrum insinuat, ubi vero
 lum penetrat, in ramos se expandit, seque
 multis exiguis ramulis iungit, sicuti alias parvæ
 amificationes venosæ atque arteriosæ, in dura
 matre, in cerebri superficie superiori, & circa
 glandulam pinealem. *Vt vero circuitus huius ner-
 vi facilius intelligi queat, en adiectam figuram, (nobis
 hic Tab. II. fig. 21.) quæ eum seorsim, ab ossibus libe-
 ratum exhibet: ut inde videri queat, quomodo per
 has cavitates transeat: Hæc est descriptio huius ner-
 vi, cuius mirabilem circuitum SIMONCELLIVM, Chi-
 urgum & anatomicum Romanum, detexisse, per-
 ibet MASTICHELLIVS; in quo præcipue demon-
 strare*

strare vult, nervi auditorii portionem mollem per cavitates cochleæ & labyrinthi neque in forma membranæ, (*ut vulgaris est opinio*,) neque in forma Zonarum, (*quemadmodum VALSALVA vult*,) *excurrere*, verum in forma filamenti nervei, mollis, quod tandem ad cerebrum revertitur: *Præterea vero scribit*, SIMONCELLI hanc aliasque curiosas observationes de auro brevi peculiari libro editurum, figurasque iam æ incisas esse. Quod tamen, licet iam An. 1705. promissum sit, hætenus, quantum novi, nondum factum est. Descriptio quidem huius nervi sine dubio multis obscura videbitur, licet magnam in ea, e Gallico vertenda, adhibuerim industriam; verum in Gallico quæque adeo obscura est, ut paucos esse existimem, qui mentem scribentis recte intelligere queant. Denique notamus Camerarium in Dissert. Taurinensi X. hanc Simoncelli, inventionem impugnasse: quæ propter ea si, lubet, evolvi potest.

de tunicis
arteriarum.

(63^{*}) ad pag. 156. In præcedenti huius libelli editione tres tantum, ut olim numerarunt, descripsi arteriarum tunicas: posterioribus vero inquisitionibus reperi, quinque minimum in arteriis numerandas esse, quæ in maioribus arteriis, & præsertim trunco arteriæ magnæ, satis manifestæ ac distinctæ sunt, facileque eo deprehendi possunt ordine, quo illas descripsi. In extima multa conspiciuntur vasa sanguifera; altera ex multis plexibus retiformibus constat, & in varias lamellas dividi potest: quam tamen ob homogeneam substantiam tantum pro unica numero. Tertia est tenax & firma membrana, ad tendineam substantiam accedens: quæ ablata, tunica densa crassa ex fibris

manifestis muscularibus quamplurimis, circum
 vel annuli in modum arterias ambientibus,
 posita, quæ quoque ob crassitudinem in diversas
 cellas facile dividua est. Quinta denique &
 na, fibris annularibus carneis subiecta, nervea
 ellatur. Quod vero ad muscularem specia-
 attinet, in diario quodam, quod quondam Hala,
 ua germanica, titulo Bibliotheca miscellanea
 mischte Bibliothec) prodibat, in recensione com-
 dii mei Autores illius tunicam muscularem, par-
 auctoritate Pechlini & Schelhammeri, par-
 propterea negare voluerunt, quia requisita
 culi hic abessent, & quandoque arteriæ osseæ
 nt; id quod contra naturam musculorum es-
 Schelhammerus insuper putavit, arterias non
 aut tunica musculari, sed sola ipfarum
 umentia constringi. *Analect. anat. Dissert. IX.*

erum cum in intestinis aliisque partibus fibræ
 longe tenuiores tunicam muscularem constitu-
 & pro musculari habeantur, atque motus &
 rictio intestinorum huic intestinorum tunica ab
 ibus anatomicis, & quidem merito adscribatur,
 r, quare arteriis, in quibus hæ fibræ carneæ annu-
 s longe sunt manifestiores ac crassiores, varias-
 satis notabiles subrubicundas lamellas, quod
 uique quotidie ostendere possum, constituunt,
 ue longe manifestiorem ac fortiolem in propel-
 o sanguine constrictionis vim & motum exe-
 , muscularem tunicam, aut requisitum mu-
 i, (quod in manifesta fibrosa substantia, &
 rictionis vi ac motu consistit) denegare queant.
 ique etiam nec hoc verum esse, quod partes mu-
 b 5 sculo-

sculosa in osseam substantiam mutari nequeant, (ter officula sesamoidea, quae hinc inde & in principio & in fine variorum muscutorum saepe deprehenduntur,) ipsa dura mater, quae recentiorum anatomicorum iudicio muscularis est, imo ipsa intestina, in quibus subinde ossea substantia reperitur, satis evincit. Denique auctoritati Pechlini & Schelhamm loco multorum aliorum, auctoritatem Morgagni summi anatomici, oppono: qui in *Advers. 11. madv. 38.* tunicam muscularem arteriarum solum statuit; sed etiam eius fibras annulares, intra Mangeti spirales, defendit. Adeoque tum mo iure arteriis tunica muscularis tribui potest qua de re etiam conferri potest LANCISIUS de *cap. pag. 95.* DOUGLASSIUS contra in *Dissert. de P. tonæo* arterias tantum ex sola & unica tunica musculari constare vult, exterioresque reliquas tantum a tunica cellulari communi provenire stimat pag. 26.

de arteria
magna di-
visione,

(64^{*}) ad pag. 157. Multi quidem Anatomici Physiologi dividunt Arteriam magnam in truncum eius ascendentem & descendentem, eodem modo, uti vena cava dividitur. Verum alio modo se habet hac arteria in homine. a) Nam perquam tres circiter digitos transversos unico truncu surrexit, arcus in modum inflectitur, retrorsum simul deorsum pergit per thoracem atque abdomen, qui vero arcus a basi cordis, donec descendat, Morgagni annotatione b) septem circiter digitos transversos implet, vocaturque a loco inflexionis versus inferiora, truncus aortæ descendens, ut

omo

a) vid. optima eius delineatio in Drakio Anthropolog. Tab. 1.
b) vid. Michelott. de Separat. fluid. pag. 104.

es arteria partium inferiorum. Ex arcus vero
riori parte in homine tres usitatissime insignes
si sursum ascendant, quorum dexter deinde,
o citius, modo remotius a trunco, in subclaviam
arotidem dextram dividitur, medius vero ca-
dem sinistram, & tertius subclaviam sinistram
tituit: quæ postea per totum caput & brachia
ribuantur. Aliquando, quod rarum est, qua-
r ramos ascendentes in feminino cadavere
eri: quorum duo extremi, utramque subcla-
m; duo medii vero binas carotides constitue-
t: quod cor vasis his cera repletis, adhuc in
itu asservo. a) Rarissime vero, si unquam, duo
tum rami, ascendentes in homine reperiun-
multo minus unus; quapropter aorta in truncum
ndentem & descendentem dividi nequit. In ca-
us quidem, vitulis, aliisque bestiis plerumque
is insignis ramus ascendens observatur, unde
er ille ortum traxisse videtur: cui tamen ple-
que adhuc minor quidam ramus ascendens vici-
est. Neque Cantii nova horum vasorum deli-
tio b) cum statu ordinario maximeque consuetudo
venit; cum duos quasi tantum ramos ascenden-
exhibeat: alterum eumque priorem, solito ma-
m, (ex quo deinde subclavia dextra & duæ ca-
des) alterum a priori quam remotissimum, quæ
claviam sinistram constituit. Ego contra in
eibus, quæ a multis annis huius distributionis
ssa examinavi cadaveribus, nullum cum hac de-
linea-

quatuor etiam ramos notavit ac descripsit ill. Bergerus,
A& Erudit. An. 1698. pag. 295. qui vero a meis diffe-
ant.

mpet. Anatomic. Tab. IV.

delineatione conveniens depredendi. Nam r
qui carotidem sinistram constituit, ut plurimu
stinctissimo principio, ac fere in medio, inter
mum & tertium prodire solet. Quare figuras
heyeni, Ruyschii a) & Drakii b) accuratiores
dico: licet hic divisionem subclaviae & carotidis
extra truncum nimis vicinam delineaverit.
men non quatuor exhibuit ramos, ut Nicolai vult
sed tantum tres. Carotidem enim dextram ex
clavia provenire, & ex figura Drakii, & e
ius explicatione quam manifestissime agnosco.

de caroti-
dum divi-
sionibus.

(65*) ad pag. 157. Cantius libro saepius cit
Tabula 1. figura 2. explicatione, omnes anat
corum de arteriarum carotidum divisionibus a
distributionibus carpit figuras, & pro imperfe
declarat, aliamque novam substituit, quam f
perfectam credidit. Verum quantum & hac a p
fectione adhuc absit, facile illi agnoscent, qui
leviter in vasis ope cera replendis exercitati su
illi enim norunt, harum arteriarum distributio
per tempora & faciem longe ulterius progredi,
que finem non habere, ubi ille fines fecit; ver
temporales longe lateque per totam supremam
pitis partem, reticulatis anastomosibus distribu
atque cum arteriis alterius lateris coire. Ita
ea arteria, qua genam ascendit, & quasi circa n
dium eius minimis ramusculis terminaretur, de
neatur, minime ibi finitur; sed huius arterie i
signis ramus per totam malam oblique versus occu
canthum maiorem ascendit, partim orbitam ingre
ditur

a) Thesaur. anatom. IV. Tab. III.

b) Anthropolog. Tab. XX.

c) Dissert. de Direct. vasorum, pag. 24.

, iisque in regionibus multis partibus prospicit;
 im ad frontem abit. Alius eiusdem arteria
 us notabilis, prius subdivisus, per labra per-
 & arteria alterius lateris per anastomosis iun-
 r: quæ arteria in cura labri leborini vel car-
 natis labri incisa magno satis impetu sangui-
 fundunt; quæ vero labra secundum Cantii fi-
 um, nullos arteriarum ramos haberent. Tace-
 ne nimis hic prolixi simus, alios huius figuræ
 & us, variasque eas variationes, quas circa pri-
 carotidis divisionem sæpe observavimus, ab
 quæ a Cantio sistitur, longe diversas. Hic
 neque in arte vasa replendi satis exercitatus
 e videtur; alias hæc faciei vasa melius re-
 a essent; neque forte sæpius hæc vasa replevit;
 carotidis externa & interna situm atque fle-
 es non ita semper se habere, ut scribit, sine
 o monuisset. Quandoque enim, ut a Drakio
 reate sunt, quandoque vero alia ratione flexæ
 ehenduntur: quod illi facile invenient, qui has
 rias sæpius apta cera, idoneisque siphonibus im-
 unt.

66*) ad pag. 157. Arterias vertebrales a sub. de arteriis
 iis oriundas, per foramina, quæ apophysibus^{vertebrali-}
 ebrarum colli insculptæ sunt, ad cranium ascen-^{bus.}
 omnes, quantum memini, docent, qui de his ar-
 s scripserunt, anatomici: atque sic per hæc om-
 n vertebrae colli foramina has arterias tran-
 tacite innuere videntur. Ego vero, quod ad-
 a nullo notatum novi, in quamplurimis cada-
 bus, in quibus arterias cera replevi, constanter
 ehendi, has arterias non in infima vel septi-
 colli vertebra, verum in sexta sive penultima
 fora

foramina hac ingredi; venas autem vertebrales septimæ demum vertebrae foraminibus proa
Quod eum in finem ab effectuore corporis nostri
ctum videtur, ne, si arteria & vena per un
idemque foramen transirent, arteria dum valde
latatur, venam comprimeret, atque sic progress
sanguinis in hac impediret. Quam ob causam
am in cranio arteria & vena præcipue non per id
foramen, sed per diversa transeunt.

De arteria
brachiali.

(66**) ad pag. 157. An. 1729. in cadavere
minino, in quo arterias totius corporis cera re
repleveram, hoc inprimis notatu dignum iuda
vi, quod arteria axillaris dextra, statim ubi a
lam deseruerat, atque ad brachium pervenerat
mox in duos eiusdem magnitudinis insignes rami
brachiales divisa esset: quorum alter per int
num brachii latus versus cubitum, uti alias
consueta naturæ lege fieri solet, pergebat, ibi
postea easdem divisiones, eundemque per cubit
& manum progressum ac distributionem, ut ali
quando unica tantum arterie brachialis trun
adest, habebat; alter vero mox infra articulu
humeri super musculum bicipitem transibat, &
externo brachii latere, iuxta bicipitem usque
os radii, ac deinde secundum huius situm ad c
pum & pollicem manus descendebat, arteriam
primo illam, que in carpo apud egros explor
solet a Medicis, constituebat. Postea prope po
cem varie divisus per anastomoses cum prioris
manu ramis iungebatur, qui deinde simul per m
num & digitos, ut alias, ubi unica tantum ar
ria brachialis adest, fieri solet, distribuebant
Inprimis vero notandum, quod ramus internus

bio in interiori bicipitis latere, alter vero in
erno eiusdem latere ad cubitum descenderit, at-
ambo demum in manu rursus manifestis ramu-
uerint coniuncti. Quales usus in chirurgica
plina ex his in vulneribus Brachialis arteriæ
ulosis, itemque in anevrysmatibus brachii cu-
lis, deduci possint, brevitatis causa silentio
prætermitto: qui vero prolixius legi possunt
dissertatione, quam titulo observationum Me-
rum An. 1730. Candidatus tunc Medicinæ, D.
bius Helmstadii publicavit, pag. 18. atque so-
hic monemus; nunquam ob vulnus brachialis
riæ brachium esse amputandum, ut alias sæpe
um est a chirurgis, antequam certe cognove-
ligatura arteriæ brachium servari non pos-

67*) ad pag. 158. Arterias œsophagi a pau- ^{de arteriis}
notatas atque indicatas esse, iam dudum mo- ^{œsophagais.}
: Nicolai a) non nisi Ruyschium citat atque
kium, qui parvulam arteriam ex aorta ad gu-
abientem, notaverint. Ego vero non semel,
sæpius, duas, imo tres tales arteriolas, distin-
principiis ex arteria magna oriundas vidi ac de-
stravi, quæ cera repleta erant.

68*) ad pag. 159. Venas vertebrales ad cra- ^{de venæ}
m non ascendere, neque sinus laterales adire, ^{vertebralis}
Willisio & Fallopio, contra Vesalium, Ridle- ^{ingressu in}
-cranium.
& me, modo laudatus Nicolai contendit. b) Hoc
um esse concedo in illis cadaveribus, in quibus
amina illa sive canales post apophyses condyloi-
deas

) Dissert. de Direct. vasor. p. 64.
) ibidem p. 4.

deas ossis occipitis, (de quibus §. 102. dixi)
 sæpius esse solet, clausa sive coalita sunt.
 niam vero hæc foramina in multis non clausa
 aperta sunt, & insinus laterales manifeste
 nunt, in hisce cadaveribus, præsertim si per
 dura matris longitudinalem reliqui eius sinus
 vena inde provenientes, bene repleti sunt, per
 foramina sive canales venas vertebrales cran
 ingredi, & in sinus laterales, prope exitum e
 e cranio, se inferere vidi. Qui huic experimen
 apta inveniet cadavera, & meo more procedens
 hanc communicationem sine dubio inveniet. I
 per ab iis, qui hanc venarum vertebralium cum
 nubus lateralibus, per canales indicatos, com
 municationem negant, rogo, ut alium horum cana
 cranii usum ostendant.

de valvula
 Eustachii.

(69*) ad pag. 160. Valvule huius insignis p
 cor in vena cavæ trunco inferiori, (de qua
 pag. 112. nonnulla dixi) primam mentionem feci
 invenio Cheseldenum, in anatomes suæ prima
 tione, quæ Londini, Anno 1713 prodiit, pag.
 qui & ejus aliqualem delineationem cum pub
 Tab IX. communicavit; quam vero Douglassius
 adscribit, eamque valvulam nobilem cavæ ascen
 dentis (quo nomine cavam inferiorem hic inte
 git) appellat. Sed in tertia huius libri editio
 hanc tabulam, in qua hæc valvula delineata
 nescio quam ob causam, rursus omisit. Ad hanc
 vero valvulam designandam forte Eustachii T
 VIII. fig. VI, quæ in opusculis eius anatomicis An
 1564. Venetiis impressis, curaque Boerhavii
 1707. Lugduni Batavorum recufis, exhibet
 Douglassio occasionem dedit: sed Eustachius e

valvulam, sed membranam solum, artifi-
& admirationis plenam, appellat, quæ fo-
mini venæ cavæ a iecore ascendente, quam-
num hæc in dextram auriculam degenerat,
fecta esset, dimidiam partem, eamque an-
terem illius occuparet, & deinceps reticu-
li efformaret. a) De usu vero illius nihil ad-
b) Sed Lancisius in Eustachii tabulis, quæ
perdita credebantur, atque Anno 1714. Romæ
perpsa editæ sunt, & speciatim in Tab. XVI. fig.
explicatione, hanc membranam quoque valvu-
lam appellat: quæ impediri credit, ne sanguis
in angularibus, per superiorem cavam descen-
dens, nimio impetu arietet cum sanguine per
eam inferiorem ascendente. Winslous ve-
rum optime hanc valvulam & descripsit &
notavit c), eique valvulæ reticulatæ Eustachii
locum imposuit. Deinde elegantem eius figuram
notatam atque reticulatam, situm ac connexionem
enunciavit, quam antea factum est, litteris consi-
deravit: notavitque, eius cavam partem sursum,
extremam vero deorsum spectare. Præterea ostendit,
eam investigando non anteriorem, sed posteri-
orem cavæ partem incidendam esse, alias eam
facile reperiri. Denique notavit, eam sæpius
i in

in libr. de vena sine pari adhuc paullo prolixiorem huius membranæ descriptionem dedit.

Baubinus in theatr. anatom. append. Tab. VIII. fig. I. eandem Eustachii figuram exhibet; sed usum quoque huius membranæ silet, neque adhuc valvulam eam appellat.

in Histor. Acad. Reg. An. 1717.

in adultis , ubi foramen ovale clausum , abesse ; infantibus vero , præsertim recens natis , & alias foramen ovale apertum , optime conspici demonstrari posse : in primis si vasi aquæ pleno immittatur. Tandem , ut alia , quæ notatu digna docta hac dissertatione enarravit , brevitatis causa , præteream , docuit , eam ipsam non solum sum præstare , quem Lancisius ei assignavit ; verum etiam , cum primis in fœtu nascendo , (ut maxime spectabilis) impedire , ne sanguis ex a. rricula dextra , aut vena cava superiori , in eam in ferio rem remeare possit : quibus vero de rebus Winslous uberius legi meretur : qui etiam eodem loco de usu foraminis ovalis & membrana huic opposita , quam contra vulgarem sententiam cum Meryo valvulam esse negat , variè profert , quæ uberiori inquisitione digna sunt.

de ortu nervorum incerto.

(70*) ad pag. 162. Nervos vel ex medulla cerebri oblongata , vel ex spinali oriri , Anatomici consentiunt ; verum ex quibus speciatim medullæ partibus aut locis proveniant , valde discrebant , quemadmodum ex Willisio & Vieussenio de Nervis Duverneo de organo auditus Tab. XI, Ridleo de cerebro , Morgagnio & Santorino variis ex locis aliisque videri potest. Quod autem non tam erroribus nonnullorum auctorum , ut facile quis suspicari posset , quam natura varianti patissimum adscriben

bendum esse censeo : qua in origine, distributio-
 & plexibus multorum nervorum, ut rectis-
 Morgagnius sentit a), incerta & varia est.
 Santorinus quoque, subtilissimus nervorum per scru-
 tor, postquam in veris eorum originibus detegen-
 multum opera impendit, atque digna de iis pro-
 nit, tandem tamen fatetur b), origines nervo-
 cerebri non constantes esse, sed variare. At & specia-
 tim de vero nervi intercostalis principio ex^{tim inter-}costalis
 antioribus anatomici præstantissimi dissentiant.
 Aliique cum Willisio ex pari quinto & sexto si-
 eum deducunt, atque certos surculos huic; illi,
 s. adscribunt. Eustachius, ut ex tabulis eius
 stat, ex solo sexto eum accersit : cum quo maxi-
 consentit Morgagnius : qui nunc unico, nunc
 bus, nunc tribus surculis, eius exortum a sexto;
 quam vero satis luculenter a quinto se vidisse
 mat. c) Lancisius hunc nervum, neque a quin-
 neque a sexto pari deducit; sed peculiarem ac
 nctum exortum, a protuberantiis scilicet ce-
 ti, ubi cum pedunculis glandulæ pinealis ad-
 tuntur, ipsi tribuit. d) Covvperus de certa &
 anti origine eiusdem nervi nihil affirmare vo-
 e) Santorinus tamen rursus a pari quinto &
 o, cum Vieussenio & Ridleo ortum eius se vi-
 testatur. f) Ego quoque eum nunc ex sexto,
 i 2 nunc.

Adversar. anat. II. pag. 75. 76. & Advers. VI. variis in
 locis.

Observat. anatom. pag. 63. ad 67.

Advers. anatom. VI. pag. 30.

Morgagn. Advers. V. pag. 105.

ut Morgagnius monet Advers. VI. pag. 30.

Observat. anatom. pag. 66.

nunc ex sexto & quinto simul prodisse observata
que omnia, originem eius variare, satis evincere
videntur: cuius tamen varia ac diversa operatio-
nis tam nervorum cerebri in universum, quàm
speciatim intercostalis, etiam aliqua causa esse potest
est summa exilitas & mollities horum nervorum
prope exortum, ob quam, dum cerebrum eximitur
& preparatur, facillime rumpi, distrahi, aut
modo ladi possunt.

de pari ce-
rebri deci-
mo.

(71*) ad pag. 163. Willisium, qui primus
cem cerebri paria nervorum numeravit, omnes fere
Medici & Anatomici recentiores hucusque secuti
sunt. Mihi vero iam dudum visum est, de
mum sive ultimum eius par immerito ad nervum
cerebri relatum esse: primo, quia non a cerebri
aut medulla oblongata oritur, sed a spinali me-
dulla: quæ vel sola ratio, si alia deficerent, suffi-
cere posset, ut Anatomici illud mecum e numero
nervorum cerebri eximerent, & ad medullam spi-
nalis, cuius vera & genuina soboles est, nervum
transferrent. Accedit deinde, quod hoc par
per foramen quoddam capitis sive cranii, quod
admodum cerebri reliqua: transeat: imo ne quod
dem inter cranium & primam colli vertebra-
m, Willisius aliique eum sequentes voluerunt; verum
inter primam demum, ut ego saltem observavi
& secundam colli vertebra-
m: nullum enim
quam nervum inter cranium & primam ver-
tebram prodeuntem manifeste conspiciere potui
ipseque, Willisius, ubi de paris huius exitu dis-
sit, tam dubitanter de illo loquitur, ut merito
in

e suspicandum, ipsum hunc nervum inter occi-
 & primam vertebrae exeuntem luculenter
 ed vidisse: & idcirco, quia eius ortus & egres-
 omnino est extra cranii limites, nullo modo
 nervo cerebri, sed pro spinalis medullae primo-
 veri debet. Doctissimus, mihiq; amicissimas
 argagnius concedit quidem, hoc par non e me-
 la cerebri oblongata, sed ex spinali oriri,
 ue per oranii foramina exire a); differre au-
 in eo a spinalibus reliquis, cum Ridleo affir-
 t, quod non, ut hi, antico & postico oriatur
 ncipio: & propterea illud spinalibus non ac-
 sendum esse arbitratur. Verum Santorinus
 e solum mecum sentit b); sed accuratissimis
 am inquisitionibus se reperisse asseverat, illud,
 eti ceteri nervi spinalas, tam e priori, quam
 steriori medullae spinalis facie oriri: hinc quia
 omnia spinalium nervorum, nulla vero cerebri re-
 sita obtinet, merito etiam ad spinalis medullae
 ed referendum esse censeo.

(72*) ad pag. 184. Cum in uvula eiusque mu- de musculo
 lis examinandis occupatis essem, saepius & ul- cerato- sta-
 is inquisitionibus perpetuo observavi, e radice p bilino.
 ophysis tenuis processuum pterygoideorum, (quam
 torinus haud inepte corniculum horum proces-
 um appellat) seriem fibrarum carnearum, satis
 spicuarum, oriri, quae coniunctae exiguum mu-
 elum constituunt, cuius tendinea expansio desi-
 in velum palatinum, versus uvula partem
 i 3 supe-

a) Adversar. anatom. VI. pag. 39. 40.

b) Observat. anatom. pag. 69.

superiorem, quam una cum aliis musculis surtrahere valet. Si & ab aliis exigua hac muscosa pars pro musculo agnosceretur, quemadmodum revera esse videtur, cerato-staphilinus vocari posset, eumque aliquo modo Tab. VIII. fig. 38. tera II indicavi: licet a calatore satis bene non expressus.

de musculis
intercosta-
libus.

(73*) ad pag. 188. Quadraginta quatuor musculos intercostales perperam numerari, cum D. Lincurtio sustinet Schelhamerus. a), „Fibras enim intercostales, ait, non ita dispositas esse, musculos seorsim exhibere queant; sed permixtas esse, ut decussatim inter se discurrant. Alterum enim horum ordinem a costâ superiori parte inferiore externo, ad costâ inferioris partem superiorem internam, oblique decurrerit, alterum contrario modo a costâ superioris partem inferiori interna, versus inferioris partem superiorem externam, itidem oblique. Huius fabricæ autem rationem esse, quod non tantum sursum, sed etiam extrorsum costâ traherent, quo thorax amplior fieret. Atque huius modo thoracem follem exhibere, qualis nullus exstaret usquam, nec ab artifice quoquam fabricari posset. Itaque tantum XXII. intercostales numerat: quibus solis cum subclavæ elevationem thoracis adscribit. Gouey vero contendit, omnes musculos intercostales non nisi unum cum constituere musculum, qui in plures tantum

a) Analect. anatom. Dissert. IX. N. 46.

tres distributus esset a) : quod singulari experimento probare vult , quo unum latus thoracis, ex homine, vel alio animali resectum, coquit, nec carnes ossa relinquere queant : ita enim cum hoc extensum carneum, ut partem continentem, a costis detrahi posse docet : quod iis forte displicebit , qui musculos multiplicare non possunt.

(74*) ad pag. 193. §. 337. Musculorum lum- de muscu-
calium quatuor ut plurimum in quavis manu a. lis lumbric-
se solent, quorum singulis singulo digito, ut su- calibus,
indicavimus, inseritur ; attamen subinde, ut profundo &
aliis, ita & hic varietas observatur. Deprehendi sublimi.
m An. 1730. quinque in una manu, ab eadem
gine, tendinibus nimirum musculi profundi in ma-
, unico principio provenisse, quorum primus in la-
externum digiti indicis, pollicem respiciens, se-
dus, in latus externum digiti medii ; tertius, in
us internum eiusdem digiti ; quartus, in latus ex-
num digiti annularis ; V. in latus internum, annu-
is inferebatur. Quatuor posteriores in prima sta-
phalanga iungebantur tendinibus interosseorum ;
mus vero tendine suo peculiari per latus exter-
n digiti indicis excurrerat , & in extrema de-
m huius digiti phalanga finiebatur. Praterea
avi , digitum minimum ab his lumbrica-
us hoc in cadavere nullum obtinuisse mu-
lum, ut alias fieri solet : contra digitus me-
us & annularis quilibet duplici musculo lumbric-
i gaudebat , index vero tantum unico. Circa
i 4 usum

usum horum mulculorum moneo, cum vultum tantum pro flexoribus & quidem prima phalangia haberi solcant, eos 1. quando uni solum latere digiti, ut vulgo fit, inseruntur, & quidem plurimum pollicem respicienti, eos etiam adducere posse ad pollicem, atque sic interosseos iungere; 2. quando ad extremam usque phalangiam eurrunt, eos non solum primam, verum etiam reliquas phalangas movere; 3. quando duo uni digito utrinque inseruntur, eos non solum flexionem huius digiti multum promovere eiusque vim augere posse, praesertim si hoc in duobus digitis medius unius manus, ut hic factum est, contingit; verum etiam eos ad digitos facilius citiusque & adducendos & abducendos a se invicem multum facere posse; id quod Musicis ad digitos citius elegantiusque movendos, magnam aptitudinem, praesertim aliis conciliare potest. Denique notamus, musculos lumbricales proprie unum tantum esse musculum, in quatuor vel quinque caudas desinentem; dum unico tantum principio, eodem fere modo ut sublimis & profundus incipit: circa quos vero ultimos musculos, sublimem & profundum adhuc monemus, quod tendines eorum in manu sapientissime tendines fibris inter se hinc inde connectuntur, imo & nonnulla harum fibrarum musculi profundi in primam digitorum, phalangiam inserantur, atque sic & his movendis famulentur.

de musculis
interosseis.
Winsloui
sententia.

(75*) ad pag. 193. §. 337. Haud sine ratione Clariss. Winslous monet a), plerosque Anatomicos musculum.

os interosseos non satis accurate propterea tra-
 sse, quia hi in myologia demonstranda ut-
 timum postremi sint, ubi Anatomici, diuturni
 ris tunc pertasi, ad finem properent, atque
 os musculos, (quod saepe verissimum est)
 debita cura perscrutentur; sed obiter, &
 per transennam tantum ostendant atque in-
 nt: quemadmodum etiam ipse Cowperus, dili-
 tissimus alias musculorum perscrutator, satis ie-
 ac imperfecte eos describit: atque hinc factum
 , ut eousque haud accurate a plerisque traditi
 int, adeoque meliorem eorum descriptionem, quae
 sequitur, Winslous suppeditavit. Divisionem
 in externos & internos, numerumque sena-
 n probat; verum ratione insertionis & usus
 vulgari descriptione non convenit. Nonnul-
 enim, ait, affirmare, omnes externos esse ab-
 dores; internos vero adductores: alios contra-
 de iis statuere. Winslous vero contendit,
 ernorum duos priores, (indice scilicet maxime
 nos) unico digito medio utrinque inseri, ad
 m adducendum & abducendum; tertium vero
 ulari digito datum esse, eumque abducere: at-
 sic ostendit, interosseos externos non nisi duo-
 digitis (medio scilicet & annulari) inservi-
 ternorum vero primum, indici; alterum, an-
 nulari; ad tertium minimo digito committi: qui
 es hos digitos abducerent. a) Unde apparet, in-
 osseos internos, ex Winsloii sententia, digito me-
 diocri famulari, sed solum reliquis tribus.

i 5

Ad

quomodo vero interosseus internus, si situm confide-

sententia
Douglassii.

Ad eundem fere modum, sed prolixius, ne anatomicus, & speciatim subtilissimus musculosector, Jacobus Douglas, in saepius laudata Myographia a), hos sex musculos lingua Anglicè describit. Quia vero hic liber extra Britanniarum, erat cum tertia vice compendium hoc rem, nec a Winsloo multisque aliis anatomicis adhuc visus videbatur, eius descriptionem breviter, quantum potero, latine versam, hic addere volui: quæ tamen iam etiam in versione totius libri, quæ An. 1729. Lugd. Bat. prodiit, legi potest.

„ Recte eos dividi, ait, in externos & internos. Externos replere spatium totum (sive tria spatia) sum metatarsi in dorso manus: internos vero, quoniam nomen interosseorum minus recte competeret, oriri a anteriore parte ossium metacarpi, quæ volam respiciunt, eosque unice in vola manus, non in dorso esse conspicuos esse; cum contra externi utrinque appareant. Primum interosseum internum ortum a partem tendineum, partim carneum, a tota parte anteriori.

ro, digitum minimum abducere possit, (abducere enim anatomicis hic est, a pollice remove re sive abducere) ego satis non perspicio. (Monuit me Cl. Winslous hoc abducere vitium esse typographicum editionis Amstello-damensis; cum in editione Parisina, quam non vidi, adducere scriptum esset, quod itaque hic lectores monere volo, quia sic sensus manifestus & perspicuus est.) Attamen non omnes interni sunt adductores, sed solum secundus & tertius, Tab. nostra IX. fig. II. E. & F; primus vero D. indicem a pollice, abducit.

a) quæ iam Londoni A. 1707. prodiit in 8.

riori ossis metacarpi indicis , inter caput & stylium eius , ut & a parte superiori ossis metacarpi digiti medii ; atque inseri ei lateri indicis , & digito medio proximum. Alterum , eumque externorum primum , ortum habere a parte maxillaris externi ossis metacarpi , quod medium sustinet , & aliquo modo tendineum ab eadem parte interiori , proxime sub capitulo eius , & per latus medii , quod indicem spectat , extendere. a) Tertium , externorum secundum , alterum digiti medii latus porrigi , atque reple hoc spatium , quod inter ossa metacarpi huius & annularis digiti , ex quibus oritur , interstitium , implere. Quartum , internorum secundum , ad latus digiti annularis , quod medium sustinet , respicit , pertinere , oriundum a tota facie anteriori ossis illius metacarpi , cui annularis substitit. Quintum , externorum tertium , per latus huius digiti latus excurrere , & interstitium , inter ossa metacarpi annularis & auricularis , in quibus ortum habet , replere. Sextum , eumque internorum tertium , extendi per illud digiti auricularis latus , quod annularem spectat , & reple partim tendineum , partim carneum , a tota facie anteriori ossis metacarpi facie anteriori originem habere.

Omnes

magis perspicua & facilis forte fuisset Auctoris descriptio , si prius omnes internos , & deinde externos descripsisset , aut vice versa ; ordinem vero eius hic mutare nolui.

Omnes hos musculos utriusque generis transmonet sub ligamento quodam transverso cartilagineo, & tunc quemlibet duos formare ternes: quorum alter mox superiori & lateri parti primi internodii inseratur, alterum valde ampliari, ita, ut maximam partem in iunctura, cui tendo extensoris adhaeret, gat; postea eum paullo angustiores rursus si appropinquet ad secundum internodium, ultimo nominatus musculus finiatur, atque omneque secundum longitudinem huius ossis exorere, ibique ipsum, in parte superiori articuli extremi, postquam prius cum socio suo alterius teris se coniunxerit, finire.

Quod ad usum ex mente Douglassii attinet pergit; si tendines longi agant, ultimum articulum eis extendi, atque sic eos supplere vicem extensoris magni, qui hic deficeret; sin vero breves, digitos ad latera moveri, id est, vel pollicem adduci, vel ab eo abduci. Haecenus Douglassii horum musculorum descriptio, cum quae Winsloei & nostrae posteriores observationes plurimum conveniunt.

Vbi tamen adhuc monere volo, interosseum tertium primum Tab. IX. fig. I. A esse adductorem digiti medii, alterum B, abductorem eiusdem digiti, & tertium C abductorem annularis: contrario internorum primum indicis esse abductorem Tab. IX. fig. II., D; alterum E, adductorem annularis, ac tertium F, adductorem auricularis.

er hos usus vero, dum interossei simul agunt sublimi & profundo, flexionem digitorumovere; sed si agunt cum extensore communi, eorum extensionem iuvare, imo & laeso extensori communi, eos aliqui modo extendere possunt; vero quilibet solus agit, unum digitum ad alium adducere vel abducere potest.

Quod Clar. Stockhusius, ut in tertia editio-Stockhusii ag. 319. significavi, tres externos & sex in-sententia. os interosseos stabilire voluerit, neque cum aglossii aut Winsloei, neque cum nostris ultimis observationibus convenit; videturque mihi, in partes illas externorum, quae in manu, ut anteriores musculi apparent, pro distinctis musculis abuisse, quae tamen revera tantum partes externorum sunt, ut in antecedentibus satis indicatum est.

(76*) ad §. 351. & 352. Quintum extensorum digitorum pedis longi tendinem §. 352. a non indicatum, nonnulli & cumprimis etiam Clar. Aglassius hic omittit, & pro peculiari musculo refert: quorsum vero sit referendus, quantum ego ignoror, non indicat. Quando igitur pro peculiari musculo sit compulendus quemadmodum hoc fieri potest, referendus erit ad flexores pedis; eique nomen dari potest peronæi aulici manus sive longi: nam oritur a fibula medio supra peroneo aulico vulgari sive minori, & ligamento interosseo, & subinde in duos vel tres tendines dividitur, qui in os metatarsi extremum sive quintum

tum inseruntur, atque pedem flectit. Attamen
 sepissime cum extensore longo siue communi
 torum satis arcte cohaeret in principio, ut pro
 te eius a multis fecerit habitus. Vesalius quidem
 Lib. II. Cap. IX, ut Cowperus Myotom. pag. 2
 indicat, eum pro musculo pedis agnovit; at
 men eum ad extensorem communem longum retinuit
 & inde separare noluit.

de renibus
 vesiculis.

(77*) ad pag. 9. Tom. 2. Ad celebrem observa-
 nem Cl. LITTRII a), de renibus foetus vesiculosos,
 quibus multirenum substantiam, in statu secundum
 naturam, vesiculosam esse certe probatam
 demonstratam esse credunt, praeter ea, quae p.
 cit. 9. & seqq. iam diximus, adhuc sequentia
 monemus.

1. Eos renes quasi monstrosos fuisse, &
 statu naturali quam alienissimos, ex hoc etiam
 tere existimamus, quod ureteres non solum prope
 nes, ad pollicis latitudinem prorsus solidi siue
 liti; sed etiam ipsius pelvis parietes concreti fa-
 rint deprehensi: id quod statum prorsus praeter
 naturam, inusitatum atque extraordinarium fuisse
 se aperte demonstrat.

2. Licet LITTRIVS octo conclusiones siue
 sequelas ex hac observatione deduxerit, ad gla-
 dulosam renum substantiam probandam: una
 tamen, eamque precipuam, consequentiam omisi-
 mihi visus est, quae ex hac observatione rectius fo-
 te elici poterit, quam reliquae omnes. Nimirum
 foetum humanum urinae excretionem in utero
 ideoque & tunica allantoide non adeo absol-

a) in Acad. Reg. Scient. An. 1705. descripta.

digere, sicut multi putarunt. Si enim hic
 sine urina excretionem ad perfectionem perve-
 potuit, (fuit enim foetus novem mensium, &
 tempore, partu difficili, in quo mortuus est,
 esus,) cur non etiam in aliis id fieri poterit?
 im enim & ureteris adeo solidos & coalitos
 affirmat LITTRIVS, ut nullum liquidum sub-
 mum, neque aerem neque flatum, multo minus, ut
 confitetur, urinam, tanquam, liquidum cras-
 transmittere potuerit. Ideoque ex his nul-
 ina ad vesicam, nedum ad urachum & allan-
 m vel pervenit, vel pervenire potuit. Sed
 imat LITTRIVS, a) ex versiculis horum
 m, liquido urinæ simili repletis, proba-
 cretionem urinæ in foetu fieri: adeoque
 m vel meiere urinam in allantoidem, vel
 per urachum in allandoidem demittere.
 rum vero horum inde sequi existimo. Ratum
 m esse, opinor, aliquam quidem secretionem
 in renibus foetus; verum an hac adeo larga
 e urina in vesica, ureteribus & pelvi conti-
 omnis nequeat, nondum demonstratum est. Si
 verso consideramus renes, a LITTRIO deli-
 s, facile iudicare licet, omnem liquidi, in
 elis his renalibus contenti, copiam, unicam
 non excessisse; nihil vero plus in hoc foetu
 um esse, coalitus pelvis atque ureterum mani-
 evincit. Cum vero foetus humanus facile
 em adhuc copiam urinae in vesica, satis, pro
 itudine corporis, magna, ureteribus & pel-
 vi

vi utraque continere queat, atque ille fœtus adfectionem, sine ullo alio vitio in corpore, per illud in renibus, pervenit, & tamen urinae in autoidem excretio facta non est, constare liquido posse, opinor, hanc excretionem in allantoi in aliis fœtibus quoque non absolute esse necessariam. Hinc, donec urachus in fœtu humano frequentius reperiatur pervius, & tunica autois certius clariusque demonstretur, quam ac factum est, eam in fœtu humano, ut partem ovarianam, non admittendam esse censeo. Vias earum quacunque illae fuerint, per quas ex hoc fœtu ITRII omnis, excepta pauca ea copia, quae in renibus renalibus erat, excerni potuit urina, et in aliis fœtibus urina exitum concedere posse, est dubitandum. Deum enim ab urina onere, quod in vaccis profecto ingens est, feminas, utpote quibus tantum pedibus incedentes, liberare, & nam cum sanguine, per arterias umbilicales, sanguinem & renes matris transmittere sive retere voluisse, ne gravida ob ventrem alios nam magnum & protuberantem tam facile cadant procidant, mihi, præter modo dictam rationem etiam ex coalitu illo ureterum, si non absolute monstratum, tamen valde verisimile esse, videtur. a) Denique non omnia, quae LITTRIVS his renibus scripsit, tam clare atque perspicue eis, apparuisse, sicuti ab autore loco prædicto præsentata sunt, ex Cl. FONTENELLII, Academia Regia Scientiarum a secretis, monito per epistolam

a) Ita quoque sentire cognovi Molinettum dissert. anat. patholog. lib. VI. cap. 7. p. 394.

risi constare potest ; dum scribit a) : quam tumidi
distenti etiam fuerint illi renes, in quibus D. LIT-
IVS observationes has suas fecit ; tamen maxi-
mā partem rerum singularium, quas in eis notavit,
nisi microscopio detegere potuit. A MAYERO
observatio notabilis ex adulto refertur b), ubi to-
substantiam renum vesiculofam deprehendit :
e longe maioris mihi momenti videtur, quam
triana.

Monita quædam

circa

Splanchnologiam Garengéoti, Chi-
rurgi Parisiensis.

Um Compendii huius quarta editio iam magna
ex parte Altorfii impressa esset, ad manus meas
venit liber Anatomicus Gallice conscriptus, edi-
tione a Chirurgo, alias diligenti, & in observatio-
nis aliorum colligendis hactenus perindustrio, cui
Garengéot nomen, Titulo *Splanchnologie, ou L'Ana-
tomie des visceres, avec des figures originales, tirees d'
les cadavres &c.* a Paris 1728. in 12 : cumque
libellum evolverem mox præter spem, inveni
in loca, ubi autor rudi ac indecenti ratione mihi,
tamen ipsum nunquam læsi, aliisque magnis vi-
niultavit, c) variasque leves hallucinationes, si
k modo

Hist. Acad. Reg. Scientiar. A. 1705. pag. 58. & 59. edit.
Amstelodamens.

Colleg. anatom. pag. 73.

Quam ob rationem diu eius distributio & venditio, ut per-
cepi, Parisiis prohibita fuit.

modo tales vocandæ sunt, tam acri ac mordaci sobendi ratione mihi exprobrat, quasi errores maximæ momenti commissem. Agnovisse quidem ipse videtur, cum hæc scriberet, se rudius quam par æquique rerum arbitri probare possint, me aggregatamen ut petulantiam suam excuset, me Verheyenum quoque durius tractasse perhibet, sed nusquam id probat. Ego vero hic prolixius me a cavillatione & falsa accusatione hac purgare nolo, quia i autores Diarii Gallici Parisini, qui antea mei amici non erant, me iam dudum, cum interpretes ille Galus, qui compendii huius editionem II. A. 1724. Parisiis gallice edidisset, ab hoc imputato crimine librum pronunciarunt, meque neque *Verheyenum* neque ullum alium offendisse affirmarunt a).

V

a) Confer, Journal des Scavans A. 1725. menſe Julio, ubi ſcribunt; *Le Traducteur ménage peu Meſſieurs Verheyen Heiſter; il fait entendre, que le livre du premier eſt plein de fautes, & que dans celui de l'autre il y a de la paſſion. Il même iuſqu'à dire que le procédé de M. Heiſter à l'égard de Verheyen eſt peu ſeant à un homme judicieux & moderé. ajoute, que cet Auteur ſ'eſt laiſſé aller à des Emportemens ridicules.* Cependant on ne trouve dans le livre de M. Heiſter rien d'offenſant contre perſonne. C'eſt ne point, comme veut perſuader le Traducteur, pour decrier Verheyen, que M. Heiſter a compoſé ſa Préface c'eſt ſeulement pour perfectionner les Oeuvres de cet Anatomiſte, c'eſt pour avertir les Etudiants en Médecine de ce que cet Auteur a négligé, de ce qu'il a ignoré, & de ce qui a été decouvert après ſa mort. M. Heiſter dit, que Verheyen a fait honneur à l'Anatomie, il applique à lui rendre juſtice, & à lui conſerver toute l'eſtime que lui eſt due; mais en même tems il tache de ſe mettre couvert du ſoupçon injuſte de n'avoir fait que ce que Verheyen a fait,

Vnde apparet contra veritatem, adeoque malo
mo hæc a Garenggeoto dicta esse, eumque sic pa-
n iuris, me tam inique aggrediendi habuisse.

Quoniam vero tam immodeste mecum egit, qui
um nunquam offendi, sed potius in Chirurgia mea,
a quantum edita, sæpius laudavi, dum multa præ-
ntiorum Chirurgorum inventa & observationes,
æ alias facile periissent, notavit & edidit, pauca
ca librum hunc ipsius, quem & thrasonico fere
do extollit, monebo : si enim omnes eius erro-
hic commissos indicare & debita censura perstrin-
e quis vellet, magnus liber conscribendus esset :
que tantum nonnullos indicabo, & a falsis quibus-
n accusationibus me purgabo.

Primo in præfatione alibique multis in locis ve-
nenter gloriatur, de multis novis suis inventis &
endationibus errorum anatomicorum omnium
m recentissimorum, nullo sæpe excepto, & quo-
do hæc non ab aliis nec ex libris, sed ex solo na-
æ libro desumserit, cum alii plerique recentiores
cum ab aliis libros suos descripserint. Attamen
in Chirurgia sua, tanquam compilator, quod alii
iles Chirurghi præstiterunt ac invenerunt, fere tan-
a descripsit, paucas vero vel nullas operationes
gni momenti a se peractas : ita & hanc anatomen
tim ex meo compendio, partim a meis discipulis,
a me Parisios abierunt, cum quibus amicitiam co-
hausit ; partim a præstantioribus anatomicis Pa-
nsibus, uti Cel. Winslous aliique forte brevi pro-
unt, desumfit, atque pro suis inventis & observa-
ibus edidit.

Quod ex meo compendio didicerit & in suum li-
k 2 brum

brum multa transtulerit, inde suspicari licet, quocum errores quosdam mihi exprobraret, errores editionis secundæ mei compendii maximam partem aggredditur, quos ego ipse in tertia editione, quæ circa principium Anni 1727. adeoque diu ante splanchnologiam ipsius prostabat, meo studio ac labore correxeram. Hic vero simulans, ac si tertiam compendii mei editionem non vidisset, (cum tamen Anni 1727. iam abunde Parisiis prostaret) varia tanquam errores a se primum deprehensos redarguit, quos ego diu antea ipse correxeram, exemplo originis musculorum abdominis aliorumque Quæ an non ipso pro plagio sint imputanda, aliis diiudicandum relinquo.

Deinde de ingenti errorum copia, qui adhuc in recentissimis scriptoribus anatomicis essent, ipsumque ad novam anatomiam edendam impulissent (*le grand nombre de fautes, qui sont dans les ouvrages, qu'on nous a donné jusqu'ici*) conqueritur, paucos vero alios cuius momenti producit. Præterea quod recentissimi autores anatomici (ubi nullum excipit) scriptura sua in musæo confecerint, nec cadavera incidierint sed alter alterum tantum descripserit, se vero solos (ut gloriatur) cadavera incidisse. Quam iniuriæ vero sit in tot tantosque ævi nostri anatomicos Ruyfchium, du Verneium, Valsalvam, Cuvperum, Larcium, Morgagnum, Winsloun, Douglassium, Cheseldenum, Santorinum, Cantium, Albinum, Waltherum, me aliosque, qui ingentem cadaverum numerum secuerunt, quilibet, qui hos viros eorumque scripta novit, satis cognoscit, huiusque cavillatoris maledicentiam atque ostentationem abunde intelligit.

Quar

Quando igitur ingens magnorum illorum errorum copia est ostendenda, pauci revera sunt, quos profert, qui alicuius essent momenti, qui vel ad theoriam vel praxin medicam aut chirurgicam illustrandam aut emendandam, aliquid faciant, & qui non compendii mei editione tertia iam emendati fuissent; aut quos indicat, vel errores non sunt, vel item, tam exigui, ut ab earum ignoratione nullum damnum in arte Medica aut Chirurgica sit metuentum. Ita & inter additamenta eius multas res quamvissimas producit, ut v. gr. peritonæi quasdam productiones, quibus intestina & viscera abdominis hinc de connectuntur: quas quidem ego & sine dubio etiam alii recentissimi anatomici haud ignorarunt; verum ob levitatem rei, magnamque earum varietatem in variis cadaveribus nihil de iis dicere voluerunt. Nam quis adeo stultus erit, qui credat, omnes anatomicos recentiores, qui tam sæpe intestina & viscera abdominis examinarunt, & ex cadaveribus secuerunt, eas productiones vel ligamenta peritonæi non vidisse, cum manifestissima sint, & necessario secanda, quando viscera auferre volumus. E contrario loco levissimorum additamentorum aut emendationum quas profert, & quæ (ut forte brevi tempore & anatome a Cl. Winslovio expectanda doceant) ab aliis, tanquam autoribus, provenerunt, gravissimos novos errores, suo Marte productos, committit, qui sua gravitate longe superant levissima eius additamenta aut emendationes; quemadmodum nonnullos mox proferemus, priusquam incavero, quod etiam *figuras recentiorum anatomicorum in universum*, nullo etiam excepto, *contemnat*,

suas vero thrasonico prorsus modo (*en véritable Gascon*) ad coelum usque extollat : cum tamen multi errores iique enormes & anatomico non condonandi in eis deprehendantur, qui in vilissimis etiam figuris evitati partesque rectius ab aliis exhibitæ sunt.

Accedit, quod, quemadmodum, quæ bona & nova scribit, vel ex ore & demonstrationibus præstantiorum Anatomicorum Parisiensium, quos, ut audio, continuo & laudabili alias conatu audivit, præsertim Cl. *Vinsloi*, vel ex meo compendio anatomico hauserit, ita & figuras suas bonas, ut ipse fatetur, ab alio obtinuit, & quidem a D. *Stockhusio* Medico nunc Magdeburgensi, in vicinia nostra præstantissimo, Germano & discipulo quondam meo qui veram partium constitutionem, situm & fabricam prius apud me vidit & didicit (id quod Garengéot astute filet). Vnde manifestum est, quam parum de iis ipsi gloriandum, & cui e contrario honor & gloria, quæ ex bonis figuris proveniunt, iure debeat.

Attamen quam accurate etiam hæ figuræ delineatæ fuerint (novi enim quod D. *Stockhusius* artem delineandi accuratissime calluerit) tam enormes tamen errores chalcographi & Chirurgi nostri vitio post abitum *Stockhusii* ex Gallia commissi sunt, quone observare quidem valuit Garengéot : dum neque eos corrigi curaverit, neque in descriptione aut explicatione indicaverit. Hinc quam accuratus si in suis inquisitionibus & observationibus (id quod tamen sæpe iactat) facile iudicari licet, aperteque ostendit, eum hos errores non agnovisse vel eos quod perinde est, approbasse, ut exemplis nunc nonnullis probabo.

In omnibus figuris, ubi peritonæum indicatum, ut Tab. VI. VII. X. ita exhibetur ac si ex fibris rotatis muscularibus, quæ in muscutorum delineatione tam robustæ & crassæ non pinguntur, constaret: inde eas ita exhibet, ac si ab umbilico, tanquam centro, ut radii circuli ad ambitum excurrerent; quod vero in cadaveribus, vel in libro naturæ, vulgo loqui amat, & quod tantopere se perscrutum esse sæpe gloriatur, nunquam ita reperitur, illumque librum anatomicum novi, in quo peritonæum non melius delineatum exhibeatur, quam Garengéoti: dum ut tyrones norunt, pellucida membrana, in qua vel nullæ fibræ, vel saltem us eorum cursus observantur.

In præfatione præterea perhibet, quod omnes artes in situ naturali melius repræsentet, quam alii cerint: & speciatim pag. 163. affirmat, quod Tab. *venas & arterias umbilicales in situ exhibeat*; id quod tamen falsissimum; quemadmodum quilibet imo intuitu cognoscet, præsertim quia funiculo alligato ex situ naturali remotæ a pictore de industria fiuntur, quod vero cavillator pro situ naturali venat. Vnde quantum accuratione & iudicio valeat vero situ partium determinando, facile intelligi-

Vnus vero omnium errorum anatomicorum manus, qui unquam in figuris commissi sunt, Tab. X. fig. 2. conspicitur, *ubi ureteres ambo ita exhibentur, si in partem anteriorem & superiorem vesicæ insereantur*: cum tamen semper in partem posteriorem inferiorem vesicæ ingrediantur, quemadmodum vivis tyro chirurgiæ aut anatomix novit, ceteri-

que anatomici semper repræsentarunt, lectoremque huius enormissimi erroris ne quidem admonet. Verum potius quamplurimis encomiis suas super omnes figuras reliquas ita extollit, ut nihil supra; cum tamen verissimum sit hanc insertionem ureterum nusquam peius, sed ubique longe melius exhiberi.

Quamobrem etiam miror, quod nonnulli Chirurgorum illorum, a quibus encomia, libro eius præmissa, emendicavit, ipsius figuras promiscue tantopere laudaverint, nullusque ingentes hosce errores vel observaverit vel indicaverit.

Porro in præfatione iactabundus asseverat, *se in hoc libro non de vulgaribus omnibusque notis rebus agere velle; sed tantum de illis, quas minus cognitas esse credat.* Mox tamen pag. 5. dicit: *nous sommes obligé de convenir, que l'homme est composé des parties solides & des parties fluides.* Ex quibus constat, ipsum credere, nihil vulgare, sed rem minus cognitam esse, quod homo constet ex partibus solidis & fluidis cum tamen hoc semper nihil fuit notius aut vulgari-
tius. Atque eiusmodi res tot in hoc libro occurrunt, ut quis integrum libellum scribere posset, & vulgares omnes eiusmodi res notare & perstringere vellet, quæ pro novis & minus cognitis, dum vulgaritas tradere non vult, describit.

Deinde pag. 9. perhibet, *ipsius descriptionem vasorum lymphaticorum eorumque cursus diversam esse a descriptionibus reliquorum scriptorum*: ubi tamen ego quidem nihil notatu dignum deprehendi, quod non vel ipse vel alii iam de iis dixerimus.

Pag. 10. & pag. 11. *vasa secretoria & vesiculas glandularum* omnes intus indutas esse villosa substantia.

(d'une

ne espece de duvet) : id quod vero in libro natu-
unde suas observationes omnes desumpsisse sæ-
iactat, demonstrare non poterit. Vt enim ve-
æ glandularum, saltem in plerisque demonstrari
possunt, prout in Adenologia mea iam dudum
i, & plerique anatomici, experientia convicti ho-
affirmant ; ita multo minus villosa substantia in
ostendi potest. Verum Garengéot potius hic
, quod anatomicis recentioribus vehementer
probat ; nimirum scribit aut describit, (*il copie*)
d alii hac de re iam dudum ex ingenio scripse-
t, & nunquam viderunt, neque adhuc in libro na-
e demonstrari potuit. Vnde manifestum est, quod
erta dubia & falsa, quæ alii iam scripserunt, hic
ipsis, vel eorum fide descripserit, licet ea non vi-
t, nec demonstrare queat.

ag. 15. affirmat, *ungues pedum* ad ambulandum
vivere, *pilosque* parvos tubos esse insensiles : quod
o non probat, sed rursus ex aliis tantum descri-
: ita *quod pili sub cute proveniant*, ego aliique iam
um scripsimus, aliaque multa similia.

ag. vero 16. postquam partes simpliciores, quas
go *similares* appellant, descripsit, & inter has
m, pilos, ungues, ossa, medullam &c. retulit, tan-
n pergit, *quod omnes expositæ partes similes con-*
stitim omnis generis partes conficerent, quæ viscera di-
ntur.

ed scire vellem, ad quod viscus constituendum
, ungues, medulla & ossa concurrant ? Quod ad
is componendos faciant, novi, quod vero ad
ficienda viscera naturaliter concurrant, anatomi-
adhuc ignotum est, atque magnificis inventis chi-

rurgi nostri adscribendum erit, quæ, quia non sunt etiam demonstrari nequeunt.

Pag. 17. In *divisione trunci* sequitur ac describitur (quod adeo detestatur in aliis) methodum vulgarem anatomicorum, qua illum in tres cavitates tantum dividunt abdomen scilicet, thoracem & caput, collumque prorsus omittit: ubi vero iam diu, consentientibus eruditis, monui, illam vulgarem trunci divisionem mancā sive imperfectā, adeoque non tam esse; quia collum sic excluditur, quæ notā lem trunci partem eamque quartā merito constituit quemadmodum non solum gravissimi anatomici, verum & liber naturæ, in quo facile a quolibet etiam ex vulgo ac sine artificio demonstrari potest, opinione mecum consentiunt: nam collum sine confusione neque ad caput, neque ad thoracem commode referri potest.

Pag. 18. *Ex medulla oblongata cerebri novem par nervorum in cranio provenire docet*, quasi hoc eius esset inventum aut primo ab ipso notatum: cum iam dudum ego, & forte primus contra vulgarem anatomicorum sententiam, qui post *Villisium* scripturunt, & decem cerebri nervos esse docuerunt, insistuerim, novem tantum cerebri seu medullæ oblongatæ in cranio esse nervos, ubi vero me filet, pro sua inventionē venditare videtur.

Pag. 28. Ita & inter nova sua inventa refert, cum alii hoc non doceant, *quod rotula os sit forma cordis præditum*. Qui vero librum naturæ inspicit, peritum cordiforme in hoc esse deprehendit, veteres

anatomici a figura quam in eo agnoverunt rotulam, illam potius *rotulam* dixisse verisimile est. Idem sustinet *digitorum pedum ossa in quovis digito tria*, ut in manu ; cum tamen in virili ætate tribus non solum in pollice, verum & in digito primo, imo & in huic proximo, in libro naturæ tantum duo & raro tria ossa distincta reperian-

g. 30. & 34. *negat corpus reticulare subcutaneum* *Wighii*, illudque imaginarium esse proclamat. Verum non solum in recentibus cadaveribus, sed etiam præparatis meis hoc semper ostendere possum. g. 50. Contendit, maximam partem anatomicum velle, *corpus reticulare hoc in æthiopibus album* quod vero falsum est : quia plurimi anatomici hoc colorem æthiopum nigrum deducunt, ut videtur in comp. anatom. meo N. 197. Præterea D. TREWIUS, Medicus Norimbergensis, in comment. litterar. universal. An. 1731. pag. 141. non solum hoc corpus reticulare novis observationibus constat ; verum & Cingarorum sive Aegyptiorum communis fuscum, quemadmodum nigrum æthiopum inmanifeste deducendum esse evincit.

g. 56. *cuticulam & ungues a cute sine diuturna maturatione separari non posse existimat* ; adeoque hanc methodum inter nova eius, dum vulgaria proponere non vult, referre velle videtur ; Verum methode N. 196. indicata, aqua scilicet fervida, intra momentum temporis separari possunt ; id quod tantum anatomicus qui acerba sua censura in omnes reiores anatomicos invehitur, scire, vel saltem non simulare deberet ; quia hæc methodus prompta, altera

altera vero quam ipse, ut novam forte & peculiariter proponit, valde diuturna ac tædiosa est.

Ibidem *ventrem esse affirmat, ubi cutis in corpore valde tenuis* : quæ tamen in palpebris & præputio longe est tenuior, quam in abdomine. Ita nec leve verum est, quod hic affirmat, *cutem in ventre magis esse durior, quam omnibus aliis corporis in locis.*

Glandulas cutis miliares negat, pag. 59. quasi ipse primus esset, qui hoc observasset & hoc in compendio meo nunquam legisset. Vnde apparet, ipsum habuisse sententiam, meo nomine suppresso, ex meo libro hausisse.

Quamplurima adhuc essent monenda, imo Augustinus stabulum expurgandum, si omnes chirurgi non lapsus proferre & refellere vellem; cui negotio autem expediendo nunc non vacat. Vnicum tamen silentio prætermittere non possum, quod inter præcipua sua inventa refert, imo forte pro præcipuo habet, atque Academiæ Regiæ scientiarum Parisiensem An. 1726, tanquam rem novam magnique momenti, in qua omnes anatomici hucusque erraverint, multa cum iactatione & ostentatione obtulit, & qua adhuc in hoc libro pag. 348. nimis, quam par est, magnifice loquitur; quod tamen inventum re vel valde exiguum est, vel prorsus nullum. Constitit autem in eo, quod *Arteriæ intercostales duarum vel trium costarum superiorum non a subclaviis arteriis, sed ex trunco aortæ descendentes proveniant*; adeoque costas superiores arterias suas non a subclaviis, sed ex ipso trunco aortæ descendentes accipere. Quamvis vero ego negare nolim, hoc quandoque & fortæ sæpius accidere, quia natura in vasorum minorum distributione

butione, ut vel tyrones Anatomes non ignorant, menter variare solet; tamen non solum certus erare possum, me sæpissime superiores arterias costales ex subclaviis, ut omnes antea anatomiserunt, & sine dubio multi ex iis viderunt, propterea observasse; verum & præstantissimus subtilisque Lipsiensium Anatomicus, August. Frid. Cætherus occasione huius novæ Garengéoti sententiam immo studio quoque in has arterias inquisivit; verò non ut Garengéot perhibet, invenit, sed nonnulli aliique præstantissimi anatomici eas descripsisse, ex subclaviis prodeuntes notavit: quemadmodum hoc peculiari *exercitatione de vasis vertebralibus*, æ An. 1730. edita, perspicue descripsit, atque etiam simul huius Chirurgi dictatoriam censuram, omnes tam veteres quam recentiores anatomici magni erroris alto supercilio accusat, dum pag. 1. ait. *Parmi plusieurs erreurs, que j'ai remarquées dans les livres d'Anatomie, tant anciens que modernes, la connaissance des artères vertébrales est une de plus considérables* &c. ex libro naturæ refutavit, p. 3. & 4. atque hæc hac vice licet quamplurimi adhuc super hoc loco speciminum errorum huius chirurgi suffragari possunt. Diu sane dubius hæsi, utrum quicquam insultationibus regerere vel respondere, an gestoso contemptu eas negligere debeam: quia prudentes facile eius alios laceffendi petulantiam cognoscunt; attamen ne solus sibi sapiens videatur aut ut hinc hoc sibi licere existimet, ut alios bene meritis atque adhuc bene merentes viros, tam temere laceffat, mordeat, ac contemnat, nonnulli amico-meæ etiam existimationis & nominis servandicau-

caussa, ut nonnulla tantum responderem, suaserunt id quod tandem etiam hic effeci. Quod si vero in posterum non modestius se geret, profecto non deerunt, qui acriori lixivio caput ipsi lavabunt. Nunquam me infallibilem credidi, multo minus rem anatomica omnino a me absolutam, exhaustam aut umbilicum deductam esse, credidi, ut falso mihi tribuere videtur; sed potius probe gnarus fui, multa in ea adhuc corrigenda, emendanda & supplenda peresse. Neque etiam unquam ægre tuli, quando viri docti & honesti vel errorem aliquem a me commissum, vel aliquid adhuc addendum, quod vel novum esset vel antiquum, privatis litteris aut publicis scriptis decenti modo mihi indicarunt; sed potius grato animo hunc favorem erga me & bonum publicum agnovi, in novas compendii mei editiones, si factum prius examine in cadaveribus, verum id esse deprehendi, intuli, autoresque illius laudavi. Qui vero tam amarulento, mordaci ac sarcastico scribendi genere utitur in eos, qui bene meruerunt & a quibus nunquam læsus fuit, ut Garengéot fecit, male agunt, atque merito gravi reprehensione digni sunt. Quare in fine tandem ipsi commendo verbum gallica D. VERNAGE, Censoris Regii Parisiensis, qui leguntur in eius Testimonio D. Chevalieri libro de usu & differentiis Venæsectionis præmissis, qui ita se habent: *En écrivant le but doit être d'éclaircir les doutes & decouvrir la vérité; & non pas de blesser par des ironies piquantes.*

EXPLI

a) Cui titulus: Reflexions critiques sur le Traité de l'usage de différentes saignées principalement de celle du pied à Paris 1730, 12.

EXPLICATIO

TABVLARVM ET FIGVRARVM.

addidit compendio huic anatomico figuras aliquot addere observationum anatomicarum novarum, in aliis Anatomicis, si duas forte excipias, non occurrunt; ceteræ vero ex nostris sunt observationibus.

EXPLICATIO TABVLAE PRIMAE.

I. Demonstrat *Malleum* ossiculorum auditus, perspicuitatis causa naturali paullo maiorem, ex homine, cum apophysi sive *processu*, ut vulgo vocant, *Rauiano*.

Est capitulum mallei.

Eius manubrium.

Apophysis minor.

Apophysis Folii, vulgo dicta *Rauiana*, sive longissima.

Ad malleum mox adiungitur, microscopio delineatum, ut omnia clarius in conspectum prodeant: ubi litteræ maiusculæ *A B C D* idem indicant, quod in Tabula minori.

Notandum vero hic esse censemus, hanc *apophyse processum Rauianum*, nobis ita sæpe apparuisse, verum os non esset. Nam flexilis & elasticus est, quemadmodum & alii notarunt, ut spinæ omnes sunt tenuiores; ita, ut, si in apice aliquo loco prematur, paullulum flectatur & cedat; sine vi a pressione remittatur, apexque relaxetur, apophysis hæc in pristinum statum se restituat: qualem flexi-

flexibilem facultatem in aliis ossibus veris, si cos excipias, non facile offendimus. Deinde eum centem, imo quandoque iam aliquo modo induratum, acu circa apicem in varias fibrillas, sicuti capilli in apice sæpe finduntur, sive ut tendinem paulatim induratum, dividere potui; id quod primum apud Clar. RUTSCHIVM vidi: sic, ut tendinis quasi induratum illius muscoli, qui ibi inseritur, sive spinæ piscis quandoque magis obtineat naturam, quam veri ossis. Quosdam tales processus, quos microscopio examinavi, circa angulum *E*, cartilagineos esse deprehendi; reliquum vero ab hoc angulo *E*, ad *D*, magis rursus osseum, & quasi peculiare os, sive epiphyseum esset, inveni: hincque forte fieri credo, quod tam facile in extractione mallei abrumpatur: ita ut hucusque multi præstantissimi Anatomici præsertim illi qui speciatim de Auditu & Aure humana nostris temporibus egerunt, ut *Duverney*, *Scheilhammerus*, *Valsalva*, & *Vieussens*, imo & *Mangetus* in magno suo theatro anatomico, hanc apophysin (vel, si placeat epiphysin) prætermiserint, aut non invenerint. Hoc vero tanto magis mirandum, quia non solum a *Cælio Folio*, equite, in schediasmate, quod inscribitur *Nova auris interna delineatio*, & Venetiis An. 1648 impressum est, (quod vero post compendii mei alteram editionem primum vidi) descriptus atque delineatus, licet forte non satis accurate, cernitur; verum etiam in *Bartholini* Anatom. Reform. pag. 713 exhibetur. Nullum tamen adhuc vidi, quod cum horum delineationibus recte conveniret.

Quoniam præterea primæ meæ de hoc figura perspicuitatis causa naturali factæ sunt maiores, ea
den

tabula 1. fig. 1. * alium adhuc malleum cum hoc
cessu, ex infante recens nato, magnitudine, ut
s est, naturali, diverso situ, bis repræsentari cu-
ubi huius *processus Foliani* verus situs, figura, ac
aliqua varietas apparet.

2. Exhibet *offis femoris partem inferiorem*, cum
duobus ossiculis sesamoideis, ab aliis anatomicis,
quantum memini, nondum delineatis.

denotat os femoris.

condylum internum.

condylum externum.

Os *sesamoideum maius*, in fovea notabili condy-
li externi; quod vero in alio cadavere longe
maius vidi.

ossiculum *sesamoideum minus*, in condylo interno;
quod non, nisi rarissime; prius vero frequen-
tius reperitur.

Denotat *ossiculum sesamoideum maius*, seorsim,
ex fovea sua condyli externi exemptum.

Demonstrat *ossiculum minus* condyli interni.

Indicat *ossa digiti auricularis*.

est os metacarpi, cui auricularis insistit.

prima huius digiti phalanga, sive nodus.

os sesamoideum, quod inter iuncturam ossis
metacarpi & digiti auricularis, sæpissime re-
peritur: quod non raro maius, quam hic
repræsentatur, tendini musculi abductoris
huius digiti inhærens, offenditur.

Ostendit *partem dextram ventriculi humani. flatu
extensi & exsiccati*, cum *valvula*, sive membrana
1. ampla

ampla circulari, quæ in dextro eius orificio, *Pylorus* dicto, sæpe reperitur.

A, A, A, Pars dextra ventriculi flatu exsiccati.

B, B, B, Pars intestini duodeni aperti & reclinatæ.

C, D, *valvula pylori*, sive membrana circularis pylorum intus ambiens, in naturali situ, præ in hoc cadavere sese obtulit, satis ampla.

E, Apertura in ventriculum.

Ex hac figura patet, primo, *pylorum non habere situm horizontalem*, sicuti vulgo a WILLISIO, in Pharm. rationali, VERHEYENO in Anatomia sua aliisque representatur; sed obliquum: & quidem sic collocatur ut a latere dextro *C*, oblique deorsum versus latere sinistrum *D*, descendat. Deinde, *quod pylorus non solum ex serie fibrarum circularium, orificium hoc ventriculi ambientium constet*, ut vulgo describitur; sed peritæque ex satis ampla membrana, duas, & quatuorque tres lineas lata: unde fit, ut orificium hoc bene impleat, egressumque rerum crassiorum, e ventriculo, magis remoretur. Sciendum tamen hanc membranam pylori sive valvulam non in omnibus hominibus tam amplam reperiri; verum in quibusdam minoram, & vix unicam lineam mathematicam latitudinem esse. E contrario vero, eas quoque non raro duntaxat *adhuc ampliores*; assero quoque ventriculum, in quo talem habet magnitudinem & figuram, uti litera *A* & *G* repræsentatur: ubi regio, *G*, angustior; regio vero, quæ superior, amplior existit.

Denique monemus, similem figuram, quam cum Ephemerid. Natur. Curios. Cent. V. communicavimus, culpa Calcographi inversam ibi fuisse repræsentatam. Tab. II. fig. 4. pag. 158.

fig. 2



fig. 2



figs. *




fig. 3



fig. 4



fig. 6



EXPLICATIO TABVLÆ SECUNDÆ.

7. Exhibet portionem intestini *ilei*, *cæci* & *coli*, cum *valvula coli Bauhini*. Exhibuimus quidem iam varias huius valvulæ delineationes, in Dissertat. nostra de *valvula coli*, præsertim duas diversitates notabiles ibidem, Tab. II. fig. I. & II, repræsentavimus; alteram scilicet, ubi partes hæ omnes sunt amplissimæ, alteram vero, ubi angustissimæ. At hic exhibemus unam, quæ medio modo se habet, & prout frequentius reperitur: ut sic, non obstantibus hisce varietatibus, cognoscatur, *dari revera semper valvulam coli Bauhini*, ad finem *ilei*, eamque non esse fictam aut suppositam, ut *Cl. Bianchus* in *Mangeti Theatro anatomico orbi literato* persuadere voluit.

A Est *intestinum ileum*, oblique, ut plerumque solet, ad crassum ascendens, & in sinistrum huius parietem se insinuans.

Intestinum cæcum.

Processus eius vermiformis, sursum reflexus.

D D D Pars cæci & coli aperta, ut interiora conspici queant.

Apertura valvulæ, sive intestini *ilei* in crassa.

Valvulæ pars superior.

Valvulæ pars inferior.

H Membranæ utrinque valvulam hanc, (vel rectius valvulas has) sustentantes, quæ *ligamenta vel frenula eius* appellari possunt.

III Variæ valvulæ conniventes coli.

Fig. 8. Ostendit VASA LACTEA, quomodo ea bis in cadaveribus humanis reperi. Conf. quæ de i
Nota (14*) dicta sunt.

AAA Pars intestini ieiuni, cum rugis vel plicis su
leviter transparentibus.

BBBB Copiosissimæ *radices vasorum lacteorum*
quæ longe plures hic in cadaveribus appar
bant, quam pictor repræsentare potuit, ac
in canibus vulgo apparere solent, multas an
stomoses conficientes.

CCCC Eorum reptatus quoque longe frequentior
per mesenterium, frequentissimis anastomo
sibus inter se communicantes, & partim in
mesenterii glandulas se insinuantes, partim
glandulas transgredientes.

DDDD maiores hinc inde glandulæ mesenterii
præter quas plures hinc inde minores ad
runt.

Fig. 21. Quam ob spatii commoditatem huc colloca
vimus, indicat *distributionem Nervi auditorii per*
labyrinthum, prout in Epistolis NOVESII sistitur
pag. 208. vid. Nota nostra (62*)

A, Nervus auditorius.

B, Eius per cochleam in forma filamenti distr
butio.

C, Progressus per vestibulum.

D, Gyri per tres canales semicirculares.

E, Extremitas ad cerebrum rediens, & per illu
multis ramulis distributa.




fig: 2.

fig 8



EXPLICATIO TABVLAE TERTIAE.

9. triplex sistit schema *tortuosi cursus & valvularum ductus biliarii cystici*, cum parte vesiculæ fellis, prout in diversis cadaveribus eum observavi.

A Pars est vesiculæ fellis aperta.

Exitus in ductum cysticum valde tortuosus.

Ductus cysticus, instar funiculi contortus, intus *valvulas spirales* obtinens.

9. D. Aliam eiusmodi demonstrat vesiculam fellis;

Eius exitus & inflexio quasi sigmoidea.

F Ductus cysticus apertus, *valvulas spirales*, alio modo conformatas, ostendens, quam in figura priori.

9. G, Rursus alia exhibetur vesicula: quæ

H Varias intus obtinet cellulas, & membranulas transversas, rectas, obliquas; omnes tamen pro transitu bilis perforatas sive patentes: quæ quidem flatum, sed non stylum ad vesiculam admittebant. Conf. Nota (18*)

eglectæ hætenus sunt a plerisque anatomicis hæ valvulæ; sed credo, si semper inquirentur, eas frequentissime observari: quia in plerisque cadaveribus, quæ a multis nunc annis disseceui, aliquid valvulosum, sed semper cum aliqua diversitate, ibi offendi. Idem nunc testatur *Bianchus* in Historia sua hepatica nova, qui has valvulas olim negaverat.

Fig. 10. Ostendit unam *Tubarum Fallopiannarum* uteri ex DRAKII Anthropologia, cuius vasa *mercuri* & *flatu* repleta erant: ad demonstrandum illorum progressum in altera alarum vespertilionum, una cum distributione reticulari venarum in parietibus tubæ, eiusque expansionum sive fimbriarum: quibus hæ partes in orgasmo venereo, distenduntur, eriguntur, aptæque redduntur ad amplectendum ovarium sui lateris tam pro semine masculino ab utero ad ovarium conducendo, quam ad ovum imprægnatum, e ovario ad uterum transmittendum.

A Pars est huius tubæ, utero proxima.

B Extremitas eius altera; quæ aliquo modo rursus angustior fit, antequam fimbrias suas emittit.

CC *Fimbriae*, sive expansiones membranaceæ distentæ.

D Orificium huius extremi distentum.

E Ala vespertilionis huius lateris.

F Venæ & arteriæ eius ab hypogastricis.

G Vasa, mirabile cavernosum sive reticulare corpus in parietibus Tubæ conficiencia.

Fig. 11. Ostendit quoque *TVBAM FALLOPIANAM*, cuius venas mercurio in dissectione quadam publicè quondam replevi: in qua vero earum distributio longe alia & pulchrior apparuit, quam DRAKIO delineata est.

A Est pars tubæ, utero proxima, filo ligata: qui alias Mercurius ad uterum & vasa hypogastricæ rueret, atque perfectam tubæ expletionem impediret.

B Ex

B Extremitas altera : in qua

CC Fimbriae, sive expansiones membranaceae, ad extrema ultima, vasis minimis, conspicuis tamen, repletissimae; quae vero a pictore tam pulchre omnia exprimi non potuerunt, quam visui se exhibuerunt.

D Osculum huius extremi.

E Ala vespertilionis sive ligamentum inter tubam, & ovarium: quod primo aspectu vasis mercurio plenis, erat refertissimum; quae vero rursus, donec pictor accerseretur, ex parte deplebantur; quia mercurius per foraminulum quoddam effluebat.

F Vena, cui mercurius injectus erat, a spermatica uteri orta.

G eius divisiones maiores.

HH Ramus insignis, cum tuba uteri quasi parallelus incedens, fere ut venae intestinorum in mesenterio: ex quo ramo parallelo.

II Rami plurimi, tubam, fere ut vasa in intestinis adeuntes, eamque tam copiosis ramulis replentes, ut tota fere tuba ex meris vasculis confecta videretur: nam tam copiosa erant, ut vasa, quae a RVTSCHIO in pia matre, corde, aliisque partibus, maxime vasculosis, variis in scriptis suis, repraesentantur; quae tamen tubae hactenus ab autoribus fere absque vasis delineatae sunt. Inde vero mirum non est, has partes, in orgasmo venereo, a copioso sanguine, in haec vasa irruente, distendi & erigi posse: cum etiam ipso flatu aliqua ratione erigi queant.

Fig. 12 Demonstrat *hepar foetus recens nati*.

AAA Hepatis ambitus.

BBB Pars hepatis Ima, in qua variae inaequalitates.

C Vesicula fellis.

D Vena umbilicalis, ab umbilico ad hepar unico trunco progrediens.

E E Sinus venæ portæ, in quem solum vena umbilicalis, aliter ac *Verheyen* scribit, uno trunco se inserit.

F Truncus venæ portæ resectus.


G Rami præcipui sinus venæ portæ per hepar distributi, hepate leviter abraſo demum conspicui.

H Truncus venæ cavæ.

I I *Canalis venosus* sive *ductus venosus*, e regione ingressus venæ umbilicalis, ex sinu venæ portæ egrediens, & in venam cavam se inferens; qui in utero magnam, imo forte maximam sanguinis partem, per venam umbilicalem ad hepar foetus allatam, ampla via in venam cavam & cor recta transfert; qui vero postea, foetu nato, sensim concreſcit. Hic canalis in *Bianchi Historia hepatica* non delineatus reperitur.

K Locus introitus venæ umbilicalis in solum sinum venæ portæ, unico extremo, non duplici, uti male a *VERHETENO* aliisque nonnullis perhibetur.

Fig. 13 *Diaphragma* exhibet a parte inferiori, eo scilicet positu, quo in corpore situm est: quod propterea rursus ad corpus humanum recens delineari curavi, quia in altera editione a pictore male



male exaratum fuerat, atque etiam figuræ VERHEYENI & MANGETI illud inversum, sive a parte superiori tantum repræsentant: quo lectores, præcipue tyrones, facile falli possunt.

A A A A A Diaphragmatis musculus superior, fibris carneis crassis e sterno & costarum cartilaginibus proveniens: quæ fibræ versus partem tendineam, quasi radii ad centrum excurrunt.

B Musculus inferior, quasi duplex.

C Tendo eius dexter & longior.

D Tendo sinister & brevior.

E E Pars tendinea, sive centrum tendineum, cui superius pericardium adhæret: in qua fibræ tendineæ, observante *Santorino*, roboris gratia, decussantur, & mirabiliter sibi invicem intexuntur.

F Foramen ellipticum transversum, in parte tendinea, per quod vena cava transit.

G Foramen oblongum in parte carnea, per quod oesophagus ventriculum adit.

H Locus sive interstitium inter duo capita musculi inferioris, ubi *Arteria magna* e thorace in abdomen descendit; *Ductus* vero *thoracicus* & sæpe *vena azygos* ex abdomine in thoracem ascendunt.

Pars quædam carnea, quæ hic erat in tendinea.

I Appendices duæ musculosæ, quæ in variis variant, & modo adsunt, modo desunt.

EXPLICATIO TABVLAE QVARTAE.

Fig. 14 Repræsentat GLANDVLAM THYMI ex foet humano recens nato.

AA est Cor, pericardio involutum, cui thymus magna parte adhæret.

BB Glandula thymus, prout in hoc foetu se habebat bifida quasi, in inferiori; trifida vero in superiori parte. Cuius partes inferiores, *aa*, adhærent superiori parti pericardii; pars media *bb*, trunco aortæ; partes vero superiores *ccc*, principio ramorum aortæ ascendentiun incumbunt.

CCC Rami tres ascendentes aortæ.

Fig. 15 Varietatem huius glandulæ ex alio foetu ostendit: quales adhuc plurimas afferre possem: nam æque figura, quam magnitudine, in quo vix fere infante variat.

AA Pars superior cordis pericardio involuti.

BB Glandula Thymus, superius in duas partes divisa, *aa*, inferius leviter tantum sinuata, *b*.

CCC Rami ascendentes, ut in præcedenti.

Conferatur §. 256. & §. 387.

Fig. 16 Exhibet CEREBELLVM HVMANVM: in quo divisiones eius in lamellas sive lobulos, ab aliis, quantum novi, non descriptos, pulchre demonstrantur.

aaaa Indicatur cerebellum humanum, in medio perpendiculariter & in æquales partes sectum.

BBB Interior substantia corticalis & medullaris.

ccc Tractus medullares, non adeo crassi, nec adeo breves, ut vulgo a multis delineantur.

ddd

d d d d Divisiones corticalis substantiæ primo in lobos maiores, qui vero mox in plures minores, & tandem *minimos lobulos* ubique pulchre dividuntur: ita, ut quilibet lobus maior, suum peculiarem habeat ramum medullarem, & quilibet lobus minor, imo minimus, suum ramulum medullaris substantiæ, quorum quilibet ab altero distinctus: omnes tamen tandem rursus prope medullam oblongatam, quasi in unum truncum, coeunt. Hæ divisiones & lobuli literis satis indicari non possunt; sed ex figuræ consideratione facilius patebunt.

e e Medulla oblongata.

f f Principium spinalis medullæ.

Quomodo vero ope spiritus vini præparari, & in conspectum optime produci debeat hæc fabrica, olim in Ephem. Nat. Curios. Centur. V. pag. 157. prolixius docuimus.

3. 17. Ostendit CEREBELLVM VITVLINVM, in medio quoque verticaliter divisum, cum partibus quibusdam annexis, ut in eo lobuli cerebelli, quomodo in vitulo sese habent, quoq; videri queant.

a a a a a a a Demonstrat maiores & præcipuos cerebelli huius lobulos.

b b b b b b Præcipuas divisiones lobulorum cerebelli, quos vulgo pro una eademque continua substantia habuerunt.

e e Tractus medullares præcipui unde minores, tamquam ramuli arborum innumeri procedunt.

d d Crura cerebri resecta.

e Rima ad infundibulum.

f Glandula pinealis.

g g Nates.

h h Testes.

i i *Ventriculus quartus cerebri*, sive calamus scriptorius, in cuius medio, *crena*; in parte superiori

k *Anus*, sive orificium ad *Aqueductum Sylvii*.

Fig. 18. Proponit OCULUM SVILLVM recentem, frigore congelatum, & verticaliter dissectum, ut situs trium ita dictorum humorum oculi & tunicæ uveæ rite conspici queat.

a a Membrana cornea.

b b b b *Sclerotica*, nec non subiectæ *choroideæ & retinae* ambitus.

c membrana *uvea*, in cuius medio pupilla.

d d *Ligamentum ciliare*, iuxta humorem crystallinum insertum.

e e e *Humor vitreus*, partem posteriorem oculi occupans.

f *Humor crystallinus*, in sinu vitrei: a ligamento ciliari quasi suspensus, & membranula inclusus.

g *Humor aqueus*, inter crystallinum & tunicam corneam: ubi conspicitur, copiam humoris aquei inter corneam & uveam, sive in anteriori humoris aquei camera, longe maiorem esse, quam in posteriori, sive inter uveam & crystallinum: ubi pars longe minima, & vix tenuissima lamella observari potest.

Fig. 19. Demonstrat eadem, sed ex OCULO HUMANO in quo adhuc plus humoris aquei ante uveam quam post uveam conspicitur. Ceterum nulla notabilis differentia, quam quod *crystallinus* f in homine longe sit minor, quam in porcis, canibus, vitulis, ovibus, leporibus, aliisque omnibus bestiis, quas

fig. 14



fig. 16



fig. 15



fig. 18




fig. 17





fig. 20



quas huius caussa difsecuimus. Conf. quæ de hoc argumento Nota (51*) dicta sunt.

20. Exhibet LINGVAM HUMANAM, cum tribus eius tegumentis, quæ, si recte memini, nusquam adhuc delineata sunt. a)

AAAA Superficies superior linguæ, in qua eminentiæ papillares capitatae & pyramidales undique in conspectum prodeunt.

B Tunicæ exterioris frustum, separatum a reliquis, & reclinatum, in qua papillæ nerveæ innumeræ in conspectum prodeunt, interiori eius superficiei adhærentes.

C Tunica secunda linguæ, *corpus reticulare Malpighii* dicta; per cuius foramina papillæ nerveæ ex tertia ad primam sive extimam transeunt.

D *Corpus reticulare*, a subiecto tertio involucro separatum & reclinatum

E Membrana, sive *corpus papillare nervosum*, in quo innumeræ papillæ eminent, quæ ex hoc corpore, per membranam reticularem, ad tunicam extimam, transeunt.

F Glandulæ linguales, ut & papillæ anterioribus longe maiores, in posteriori linguæ parte conspicuæ: nunc plures, nunc pauciores.

G Foramen, quod in posteriori linguæ parte sæpe occurrit, figuræ incertæ & dubiæ: modo rotundum, quandoque triangulare, alias ovale, de quo vide plura Nota (56*)

21. iam in Tabulæ secundæ explicatione exposita est.

EX-

Reperi postea, quod apud *Boirdontum* Tab. V. fig. 12. hæc iam delineata sunt; sed magnitudine naturali maiora.

EXPLICATIO TABVLAE QVINTAE.

Fig. 22. Ostendit membrum genitale virile a facie superiori; cuius venæ & substantia cavernosa, singulari & eleganti modo, argento vivo ita a me repletæ sunt, ut egregie & melius in conspectum prodeant, quam eas antea unquam vidi, aut delineatas usquam reperi: quod membrum adhuc ita præparatum asservo.

A Venæ penis truncus, in quem mercurium, per tusa prius valvula eius, immisi.

B B Venæ huius circa penis medium in ramos duos insignes divisio.

C C Vberior horum in plures ramos notabiles, & tandem in quamplurimos ramulos minimos prope coronam penis, distributio.

D D Elegantissimus vasculorum subtilissimorum & copiosissimorum, ex minimis ramulis ortorum inextricabilis & mirabilis cursus per totam glandis superficiem, tortuosis & flexuosis gyris, a intestinulorum aut vasculorum seminalium in testiculis similitudinem; quæ adeo numerosa sunt ut tota glandis superficies ex meris minutissimis vasculis constare videatur.

eee Vasa quædam minora, maiora & maxima multis in locis scandentia, amplectentia sive superrequantia.

F. Finis urethræ, per quam urina exit.


G. Funiculus, quo post expletionem penis pars posterior constricta est, ne mercurius facile effluat.

fig. 22.



fig. 23.





7. Pars penis posterior resecta.

23. Repræsentat eiusdem penis faciem inferiorem: in qua, quomodo venæ, mercurio repletæ, tam mirabili reptatu atque tam multis amplexibus, coniunctionibus sive anastomosibus, per hanc, & in primis etiam super urethram discurrant, apparet; quarum multæ longe subtiliores sunt & copiosiores in ipso obiecto, quod iam ultra quinquennium asservo, præsertim circa frenulum & coronam, quam a pictore & sculptore, sine confusione producenda, exhiberi potuerunt.

8. Frenulum penis, copiosissimis minutissimisque vasculis pilum tenuitate superantibus instructum.

B Corona & cervix penis, vasculis omnium subtilissimis abundantes.

C Glandis tota pars inferior, sicuti superior, ubique vasculis valde exiguis, mirabiliter tortuosis, repletissima.

D Urethra protuberans: cuius corpus cavernosum, mercurio plenum, eam ita extendit, cum vasis plurimis eam ambientibus.

E Corpora duo penis cavernosa, urethram in medio continentia, argento vivo quoque repleta: quæ una cum urethra vasorum maiorum, multas flexiones, ambages, amplexus & anastomoses facientium, magna copia cinguntur, omnia mercurio impleta.

Finis urethræ.

Funiculus, quo penis ligatus.

Pars penis posterior resecta.

Hoc pulcherrimæ repletionis experimentum aliquoties in aliis penibus iterare volui: sed in nullo tam bene succedere voluit, quam in hoc: quia mercurius per venam dorsi immissus, per iter urinæ mox rursus effluebat. Unde vero communicatio huius itineris cum venis penis cognosci & præter alia, contagii veneri modus inde intelligi potest.

EXPLICATIO TABULAE SEXTAE

Fig. 24. Repræsentat *testiculum humanum*, cuius vasa seminalia more *Ruyschiano* a me resoluta sunt.

A Tunicam testiculi albugineam denotat a vasculis seminalibus separatam & reflexam.

B B Vascula testiculi seminalia resoluta, quæ generationem conficiunt, atque instar capillamentorum fere dependent: ex quibus interiorem testis substantiam totam constare, hic videri potest.

Fig. 25. peculiarem *testiculi cuiusdam humani compositionem*, sicut a me *Helmstadii*, in cadavere publice inciso, olim reperta est.

A Arteria aorta descendens.

B vena cava inferior.

C C venæ emulgentes.

D ortus arteriarum spermaticarum ex trunco aortæ.

e Vena spermatica dextra, e trunco venæ cavæ.

f Vena spermatica sinistra, ex emulgente sinistra.

g Vena & arteria spermatica dextra sibi invicem implicatæ consueto modo ad testiculum abeuntes.

h testiculus dexter, &

ii epidydimis e scroto exempta.

l vas deferens sive eiaculatorium ; quæ tria omnia, hoc latere , consueto & naturali more se habebant.

Testiculus sinister, qui non in scroto, sed in abdomine hæsit, eo in loco, ubi alias vasa spermatica abdomine egrediuntur, altero longe minor, & sine epidydymide. Conf. Nota (26*)

o epidydymis in hoc cadavere a testiculo maximam partem separata ; nam ad *n* tantum adhærebat testiculo, reliqua pars per loca vasis spermaticis alias consueta, per musculos scilicet abdominis ex abdomine egrediebatur, & ad scrotum usque se extendebat, sic ut locus *o*, quæ pars eius inferior fuit, in superiori scroti parte hæreret. Inde vero

ductus sive vas deferens, (quasi ex testiculo e scroto veniret) rursus ascendebat ad abdomen, sub testiculo *m* pergebat, ad

emergebat, & deinde more solito a litera ad vesiculam seminalem sui lateris progrediebatur.

Est locus, ubi vasa spermatica dividebantur, & pars

ad testiculum, pars vero ad epidydymidem abibat.

noscimur ex hoc lusu naturæ, quam ingeniose & hre natura huius testiculi structuram fabricaverit, in eo deficit, sed partes, quæ alias coniunctæ essent, ut epidydymis & testiculus, separatæ & quasi a se invicem resolutæ erant.

que alias testiculus in scroto naturaliter esse constit, natura vero per errorem eum in abdomen

m

posuit,

posuit, voluit tamen, ut pars aliqua eiusdem, nimirum epididymis, cum vasis ejaculatorii parte, extra abdomen versus locum consuetum abiret: atque scilicet hæc testiculi fabrica non sit consueta & naturalis, hac tamen ratione omnes testiculi naturalis functiones & usus præstare potuit, ac si naturali prorsus modo factus esset. Persuademur etiam hac fabrica certius, genituram ex testibus per epididymides: vasa deferentia pervenire.

Fig. 26. *aaa* denotat *vesiculam seminalem* dextram apertam, recentem, non siccata; at elotam ut non solum variæ eius cellulæ, verum etiam *facies interna reticulata*, a *Santorino* in *ob. anatom.* pag. 201. descripta, in conspectu prodeat.

bbb *Facies interna reticulata*, (tanquam corpus reticulare) quæ fere ut interior facies vesicullæ a *Ruyfchio* delineata: quibus in cellulis si reticulis genitura virilis forte maiorem perfectionem acquirit, Pulchrior vero in ipso obiecto apparet, quam a pictore & calcographo exhiberi potuit.

Fig. 27. *Fætus est humanus*, abortu ex muliere, tertio mense gravida, reiectus, membranis suis, qui in ovo adhuc pulcherrime inclusus, ac liquore suo consueto innatans: omnia in naturali magnitudine, ut a me asservatur.

A *Fœtus humanus*, capite crasso, oculis magnis protuberantibus, nigris, sicut plerumque hoc statu esse solent, per liquorem & tunicas pellucidas, sicut situs est, apparens.

BBBB *Tunica exterior chorii*, valde vasculosa, vascu

fig. 24.



fig. 25.




fig. 28.



fig. 26.





fig. 27.



fig. 27.



sculis instar radicularum undique dependentibus, copiosissimis, ab aliis, quod sciam, nondum delineatis, ornata: ubi notanda

CCCC Tunicarum foetus pellucidarum pars, a quibus vasculosa a me ex parte separata sive detracta est, ut una cum foetu in liquore suo ambiente conspici possit: nam sciendum, maximam partem huius ovi humani tunica tali vasculosa, vasculis fluctuantibus, ut pictæ sunt, & dependentibus fuisse instructam.

DD Funiculus umbilicalis rudi modo adhuc apprens.

27* aaaa Ovulum a muliere per quatuor circiter, ut credit, hebdomades gravida, magna uteri hæmorrhagia & doloribus reiectum: quod fere pellucidum, multisque vasculis sive radiculis chorii, tanquam villis, in ambitu ornatum, in quo

b corpusculum apparet, embryonem adhuc informem repræsentans, quod quoque adhuc affervo.

28. aaaa Est pars ani & intestini recti aperta.

bb Inæquales eminentiæ & rugæ in extima ora ani, ubi venæ lividæ tumentes in hoc cadavere apparebant.

ccc margo, qui a litt. *cc* ad litt. *aa* inferiores instar fimbriæ erat, ubi sphincter & intestinum rectum colore & consistentia, ut plerumque fieri solet, differebant.

dddd Oscula minima quamplurima circa intestini recti finem, cum multis glandulis subrotundis, ut in hoc cadavere apparebant.

eee Oscula quædam maiora setam admittentia,

infra fimbriam recti, ubi sphincter situs est, prout in hoc cadavere videnda erant, quorum duobus setæ immissæ.

EXPLICATIO TABVLAE SEPTIMAE.

Fig. 29. Ostendit *intestinum ileum*, *colon*, *cæcum* cum *processu* vermiformi, quomodo se sæpe habeant in infante recens nato, flatu distenta & exsiccata.

A A Pars intestini ilei, eiusque in latus seu parietem coli sinistrum ingressus.

B B Pars intestini coli.

C Intestinum cœcum, eiusque in processum vermiformem peculiaris & diversa, quam in adultis, mutatio: in infantibus enim his cœcum sensim sensimque angustatur in processum hunc coni quasi figura; cum in adultis id alia fiat ratione, & cylindricus fere sit.

D E Processus vermiformis in hoc infante singulari modo inflexus: primum enim a *C* sub ileo transibat & ascendeat ad *D*. Deinde vero supra ileum iterum reflectebatur, & descendeat ad *E*.

Fig. 30. Eadem *intestina a parte posteriori*, ut cœci mutatio in processum vermiformem, quomodo in infantibus plerumque se habeat, clarius conspicui queat.

A A Intestinum ileum cum eius in colon ingressu.

B B Colon.

C Cœ

C Cœcum.

D Initium processus vermiformis.

E E Singularis huius flexus circa ileum.

g. 31. *Processum quendam vermiformem separatim ex adulto, peculiaribus flexionibus, & quasi gyris donatum, exhibet; qui simul solito longior erat.*

A Principium eius a cœco resectum.

B Finis sursum spectans.

C C Singulares flexiones.

g. 32. *Sinum longitudinalem dura matris cum lateralibus exhibet, quibus sinus peculiaris transversus in hoc cadavere interiectus erat.*

A A Sinus longitudinalis pars aperta.

B Locus, ubi accurate in duas æquales laterales, (quod sæpius ita non contingit) dividebatur in hoc cadavere.

C C Initium duorum lateralium.

D D Laterales in progressu suo resecti.

E Sinus quidam transversus, duobus lateralibus communicationem præstans, per quem

F F Stylus crassus facile trans mittebatur.

ius sinus transversi hiatus in dextro sinu amplior erat, quam in sinistro. Conf. Not. (48*)

g. 33. *Repræsentat linguam cum maxilla inferiori adhuc cohærentem, & in illa oscula ductuum salivalium glandulæ sublingualis, sicut in hoc erant cadavere.*

A A Lingua ad latus sinistrum reclinata.

b b b Oscula ductuum salivalium glandulæ sublingualis, quorum septem in hoc latere occurrebant.

cccc Setæ his osculis immissæ.

DD Duo muscoli elevatores labii inferioris.

In sinistro huius linguæ latere horum osculorum primum & anterius tam amplum erat, ut non solum setam, sed tenuem tubulum immittere, atque per hunc flatum iniicere potuerim: reliquorum vero osculorum duo vel tria tantum apparebant minora. Conf Nota (55*)

EXPLICATIO TABVLAE OCTAVAE.

Fig. 34. *Lingua sistitur humana, ubi in foramine, cœco alias dicto, duo notabiles ductus salivales a me observati sunt. Conf. pag. 146. & Nota (56*)*

A Foramen illud cœcum, quod in hoc cadavere valde amplum erat, iam apertum.





b ductus alter salivalis, & quidem sinister, versus radicem linguæ abiens, cera rubra repletus.

cc Vesicula in fine huius ductus, saliva distenta.

d principium alterius ductus in latere sinistro: quidam cera repletus non erat: instar ductus tamen non solum a reliqua linguæ substantia tractu albicante, distinguebatur; verum etiam subtili tubulo flatu distendi poterat.

e Locus, ubi hic ductus disparebat.

ff Situs & progressus horum ductuum: ubi notandum, eos non in superficie linguæ hæsisse, sed ad lineæ profunditatem sub lingua
invo



involucris , quæ hic remota sunt , sitos fuisse.

ræterea notamus osculorum *b* & *d* singularem fuisse fabricam : nam ut valvulæ vel carunculæ se habebant , quæ collapsæ apparebant. Si vero flatus ob tubuli certa ratione inferiora versus pellebatur , aperiebantur , seque , ut hic delineata sunt , exhibebant.

g g Adhuc tria alia oscula sive foraminula : quæ in maiori erant , indicant : unum in parte anteriori ; alterum in latere dextro ; alterum , in sinistro ; quæ quidem setam per breve spatium oblique admittebant ; verum an ulterius progredierentur deprehendere non potui. Vnde videtur , hoc foramen , quando adest , communem quasi ductum variorum ductulorum salivarium ex lingua esse ; in quibus vero natura non constans est , sed sæpe ludit & variat.

h Epiglottis.

i Eius ligamentum anterius.

k Musculosæ fibræ , qua ex linguae substantia in ligamentum hoc , tanquam in tendinem , inferebantur ; quæ ad epiglottidem elevandam , quando adsunt , (nam semper non patent) inservire , & pro musculo epiglottidis , nomine *glosso-epiglottidei* , haberi possunt

l l ossicula duo minima ossis hyoidis.

m m Apices cornuum ossis hyoidis.

n n Variæ glandulæ & papillæ in linguae superficie circa medium.

o Linguae apex deorsum flexus.

Fig. 35. Demonstrat ductus hos seorsim, e lingua quasi exemptos, cum foramine cœco, hic non dissecto, tanquam ductu communi minorum,

A Foramen hoc linguæ cœcum, quod valde amplum, & canalem in hoc cadavere, sicut hic est, tres circiter lineas longum, conficiebat, atque tubulum crassum facile admittebat.

B B Duo ductus salivales novi in illud desinentes, ea magnitudine & figura, sicut in hoc cadavere erant.

C C Fines horum ductuum, aut quorum saltem ulteriorem progressum invenire non licuit.

D Locus, ubi sinister in vesiculam pellucidam expandebatur, quæ liquido pellucido, subviscido, salivæ simillimo, replebatur: quod a cera, vi iniecta, illuc compulsus esse videtur.

Fig. 36. Exhibet varia in *palato*, iuxta palatum, & in *labro superiori* considerata.

a a Palati pars anterior, in qua nulla oscula hic apparebant.

b b Palati pars posterior, valde glandulosa: ubi in hoc cadavere quamplurima oscula excretoria manifestissima apparebant; quorum nonnulla setam crassam, & stylum tenuem, ad duarum triumve linearum profunditatem, non recta, sed paullo oblique versus posteriora admittebant: quæ alias tam magna rarius occurrunt.

e In loco, qui respondet canalibus illis Stenonianis, in capite osseo, post dentes incisores, conspicuis.

spicuis, & ad nasum desinentibus, nulla hic erat apertura, nullus transitus ad nares patebat. vid. Nota (59*)

D D D Labrum superius reflexum, ut interiora pateant.

d d d d Glandulae eius lenticulares & miliares, sicut in hoc cadavere, remota tunica oris interna, apparebant, ad secundum usque dentem molarem utrinque se extendentes.

e Ligamentum labri superioris.

f f Duæ glandulae conglomeratae in hoc cadavere observatae, cum osculis aliquot excretoriis, ab aliis, quantum scio, non descriptis. Conf. pag. 146. & Nota (57*)

g g g g Setæ & styli osculis his ad duarum linearum profunditatem immissi.

i pars huius glandulae, ubi adhuc duo ampla oscula apparebant, quæ pressa guttulas salivæ, instar roris emittebant.

g. 37. Alteram harum glandularum, & quidem sinistram, a facie exteriori exhibet: unde, eam ad conglomeratarum genus pertinere, conspiciatur.

g. 38. *Varia circa fauces & uvulam* repræsentat, in capite & maxilla superiori a parte inferiori inspectis.

a Est ductus ille in fornice, sive suprema faucium parte, sub processu anteriori ossis occipitis situs, pag. 146. indicatus, & Nota (58*) uberius pro *ductu mucoso* descriptus.

- b* Eius sub ossis occipitis apophysi versus foramen magnum occipitis extensio, quinque minimum linearum.
- c* *Tuba sinistra Eustachiana*, cum apertura sua longitudinali obliqua, & cartilagineo limbo aper-
turam hanc cingente, quemadmodum si paul-
lo oblique, a regione aliquo modo opposita in-
spicitur, apparet.
- d* *Tuba Eustachiana dextra*, quomodo eodem
spectatoris situ se ostendit: ubi non in orifi-
cium eius inspicere, sed limbi sive oræ faciem
posteriorem & exteriorem tantum videre pos-
sumus.
- e e* Progressus utriusque huius tubæ obliquus ver-
sus aurem.
- f* Hamulus, musculum tubæ incumbentem aliquo
modo ad latus trahens, ut tuba *Eustachii*
huius lateris tanto melius in conspectum pro-
deat.
- g g* Musculi *salpingo-staphilini*, in partem postero-
rem uvulæ inserti, qui eam retrahunt.
- h h* *Pterygostaphilini* musculi, super *corniculum*
sive apophysin styloidem 11. interioris lami-
næ processus pterygodei, quasi per troch-
leam, reflexi, & in anteriorem veli palatini
partem inserti. Hos uvulæ musculos esse ne-
gat *Morgagnius* Adv. II. p. 35. quia (ut ait)
illorum tendines in ipsam extremam osseam palati
oram insigantur. Mihi vero videtur, partem
quidem

fig: 35.




fig: 36.




fig: 34.




fig: 38.



fig: 39.




fig: 37.



quidem huic ossi, partem vero etiam membranae palatinae, ut §. 326, proposui, inseri.

i Apophyses illae tenues in pterygoideis, quas haud incongruo vocabulo cornicula appellat *Santorinus*.

z Vvula ad palatum reflexa, & in eius medio, separata membrana palati glandulosa, *musculus uvulae azygos Morgagni*, sicut hoc in cadavere se ostendebat.

l Musculus uvulae *cerato-staphilinus*, leviter adumbratus, vid. Nota (72*)

m m duae aperturae posteriores narium, quomodo in fauces hiant.

n Septi nasi pars posterior, quam vomer conficit.

o o Duo capitula ossis occipitis, quae supremae vertebrae articulantur, & post haec

p Foramen magnum occipitis.

q q Aures aliquo modo apparentes.

aliquas partes, de quibus hic non agitur, characteris notare supervacuum esse censuimus.

g. 39. Os vomeris sive vomer, quod a *Santorino* non pro peculiari osse, sed pro parte ethmoidis tantum habetur, seorsim hic, ac distinctum, ostenditur, e puero 13. annos nato: in quo distinctissimum erat ab ethmoideo. In adultioribus vero cum ethmoideo in unum con-
crescit.

a a Vomer, ex duobus lamellis sive parietibus osseis distinctis constans.

- b* Cavea, cum oris reclinatis, quæ apophysin ossis sphenoidi per gomphosin recipit, ut alveolus maxillæ dentem; unde hæc duo ossa per gomphosin iungi dicuntur.
- c c* interstitium in tota facie superiori, inter duas lamellas, cui septi nasi pars, quæ ab ethmoideo osse provenit, inferitur.
- d d* Pars inferior, ad similitudinem vomeris, acuta; quæ palati ossibus, ubi inter se coeunt, adnascitur.
- e e* lamella five paries vomeris dexter, cui in altero latere sinister opponitur.

EXPLICATIO TABVLAE NONAE.

Fig. I. Musculos interosseos manus externos, & quidem solum partem eorum externam, quia interna hic videri nequit, exhibet.

A est musculus primus interosseus externus, *a b* eius duo distincta principia externa, ex superficie externa utriusque ossis metacarpi indicis & medii digiti oriunda. *c* Linea ubi eorum fibræ opposito tractu coeunt. *d* tendo, qui interiori lateri digiti medii, hoc est, quod indicem respicit, inferitur.

B est alter interosseus externus, uti se in dorso manus ostendit: *e* est eius tendo, quem in externum medii digiti latus immittit, hinc hi duo muscoli, uni huic digito famulantur; prior

A, ut

A, ut eum ad pollicem adducat ; posterior *B*, ut eum a pollice abducatur.

F tertius est interosseus externus *f g* duplex eius principium, ex duplici osse & oppositis tractibus venientibus fibris : quæ postea in unum musculum coeunt, cuius tendo *h* lateri digiti annularis, quod auricularem respicit, insertus, digitum hunc a medio & pollice abducit.

D est pars adductoris indicis.

E pars abductoris digiti auricularis.

F tendo musculi radialis externi.

G tendo cubitalis s. ulnaris externi.

ura II. ostenditur, quomodo musculi interossei externi fig. I. modo descripti, in vola manus sese habeant, ibidemque & oriantur & inserantur: ac deinde quomodo etiam interossei interni hic sint constituti.

A A a est musculus interosseus externus primus, & speciatim eius pars interior (nam exterior præcedenti figura indicata est.)

B B b interossei externi secundi pars interior.

C c interossei externi tertii pars interior.

D d interosseus internus primus cum tendine.

E e interosseus internus secundus.

F f interosseus internus tertius.

G est hamulus, quo cutis *H* paululum retrahitur, ut interosseus internus tertius melius videri queat.

Ceterum, quod musculorum interosseorum doctrina hucusque valde confusa fuerit apud anatomicos, inde facile cognosci potest, dum interosseorum manus *Spigelius* & *Bucretius* in explicatione tabularum *Casseri* octo numeraverint; *Brounii* octo; *Mangetus* modo octo, modo sex; *Bartholinus* quidem sex, sed eos omnes abductores esse scribit; *Verheyenus* quoque sex, sed omnes internos adductores; externos vero abductores esse vult seque mutuo interfecare in formam crucis putat *Veslingius* eiusque commentator *Blasius* verum numerum horum musculorum ignorasse videntur, quia numerum non indicant.



fig. I.



fig II.



INDEX I.

A V C T O R V M.

A.

hillinus(Alex.)T.II.117.
berti (Salom.) T.II.97.
pinus 2.82.T.II.58.59.

60.

ghisius 98.
neloveen T.II.61.
Andreæ T.II.51.113.
drius 46.53.202.
ellus T.II.84.85.
Aquapendente 2.108.
109.182.T.II.98.105.
antius 135.T.II.75.
istoteles 128.154.T.II.
72.
ellius 2.83.84.

B.

glivus 131.
ierus T.II.69.
rtholinus(Caspar) 2.
rtholinus(Thom.)2.21.
34.86.87.102.145.197.
122.T.II.49.50.59.97.
rtholinus(Caspari ne-
pos) 2.
rtisch T.II.97.
uhinus. 2.27.80.T.II.
66.97.129.

Baylius T.II.84.

Bellingerus 118.T.II.88.

Bellinus 2.91.T.II.13.

Bergerus 105.134.170.
T.II.18.52.123.

Bernouillius 170.

Bianchus 2.142.199.

T.II.37.66-69.71.74.85.

Bidloo 2.132.134.147.

176.197.T.II.10.21.

25.32.63.66.98.

Bilsius T.II.116.

Blasius 1.2.T.II.67.

Blegny 104.T.II.84.97.

Boerhaave 21.94.150.

168.170.177.T.II.16.

37.41.42.44.46.52.

76.77.105.128.

Bohnius 2.89.T.II.67.71.

Bonetus 4.

Borellus 170.172.

Bourdonus 2.54.56.T.II.

97.

Brendelius 105.

Briggs T.II.97.104.

Brunnerus 2.80.T.II.29.

57.139.

Burggrav 168.

Buf-

Index I. Auctorum.

- Buffiere T. II. 85. 89.
C.
Cabrolus T. II. 75.
Calvus T. II. 85.
Camerarius 134. T. II.
85. 120.
Cantius 2. 28. 49. 56. 178.
179. 183. 184. T. II. 23.
64. 93. 94. 123. 124. 125.
Cartesius T. II. 96. 97.
Casseri 2. 172. 176. 182.
188. 204. T. II. 97.
Celsus 8. 107. 120. 124.
144. 148. 155.
Charletonus 86.
Cheselden 2. 54. 76. 77.
83. 90. 93. 94. 96. 112.
161. 179. 187. 189. 196.
199. 202. T. II. 54. 67.
75. 77. 113. 114. 128.
Chirac 71. T. II. 53.
Clericus T. II. 28.
Coiterus 2. 128.
Cole T. II. 71.
Collinus 1. 146. 149.
T. II. 108.
Columbus 2. 27. 31. 123.
176.
Connor 25. 43.
Coschvitz 92. 146. 150.
T. II. 109.
Courtial T. II. 84.
Covvperus 2. 45. 75. 97.
99. 119. 125. 127. 147.
170. 172. 173. 176. 177.
178-185. 191. 194. 196.
199. 202. 204. T. II. 31.
50. 53. 63. 77. 85. 91.
92. 116. 131. 137. 142.
Cyprianus T. II. 85.
D.
Dekherus T. II. 10.
Des Noues 104. 155. T.
II. 118.
Deventer T. II. 79.
Deusingius T. II. 85.
Diemberbroeck 2. T. II. 82.
Dionis 2. T. II. 79. 84.
Dodart 121.
Dortude Mayran T. II. 96.
Douglas 2. 3. 54. 177.
178. 183. 184. 186. 187.
189. 198. 199. 203. T. II.
18. 117. 122. 128. 138.
140. 141.
Drackius 2. 27. 83. 93.
99. 106. 139. 151. 154.
159. 172. 179. 197. 202.
T. II. 50. 64. 83. 122.
124. 125. 127.
Drelincourt 2. T. II. 134.
E.
Elsholzius T. II. 85.
Erasistratus 84. T. II. 72.
Ettmül.

Index I. Auctorum.

müller	104	Harderus	T. II. 31
stachius 2. 83. 85. 92. 124.		Harris	94
154. 155. 160. 162. 172.		Hartſœcker	T. II. 97
175. 179. 188. T. II. 94.		Harveus	2. 14
128. 129. 131		Haverus	2. 14. 17
F.		Heinrici	104
abry	T. II. 97	Helvetius	T. II. 56. 58 59. 60.
Fallopious 2. 25. 63. 106.			91. 106
148. 176. 186. 202. T. II.		Hemſterhuſius	86
50. 56. 61. 127		Henningerus	85. T. II. 64
ntonus 2. 104. T. II. 28		Herophilus	131
lius 21. T. II. 61		Heucherus	T. II. 75
ntenelle	T. II. 144	Highmorus	2. 27. 94. T. II.
acaffatus	150		67. 97
eind	T. II. 81	Hilſcherus	104
G.		Hippocrates	62. 124. T. II. 14.
Tagliardus	2. 14		18. 21. 30. 61. 72
Galenus 2. 15. 25. 62. 84.		de la Hire	T. II. 96. 105
135. 142. 176. 180. T. II.		Hoffmannus (Casp.)	2. T. II. 72
72. 89. 91		Hoffmannus (Frid.)	104. T. II.
rengéot 2. 77. T. II. 145.			88
ſeqq.		Hoffmannus (Maur.)	87
iffonius 2. 86. 88. T. II.		Hoffmannus (Jo. Maur.)	2. 25.
65. 67			78. 87. T. II. 71
elicke 3. 104		Hornius	2. 87. T. II. 49. 82
ovey 123. 203. T. II. 81.		Horſtius	T. II. 97
134		Hovius	2. 143. 144 T. II. 102
raafius 2. 93. 95. 100. 105.		I.	
106. T. II. 75. 79. 82		Ingraffias	2
aſſius T. II. 81		Iolivius	86
evv 81		luſſieu	150
ailleneuve 45		K.	
uintherius Andernacus T. II.		Keilius	2
75		Keplerus	T. II. 97
H.		Kerkringius	2. 14. 80. 112.
Hamberger	126		T. II. 82
du Hamel	T. II. 96	n	L. La.

Index I. Auctorum.

L.

Lamius T. II. 82
 Lancifius 126. 134. 159.
 163. 164. T. II. 91. 122.
 129. 130. 131
 Laurembergius 2
 Laurentius 2
 Lealis 94. 96. T. II. 75. 76
 Lecuvvenhœck 68. 71. 94.
 166. T. II. 18. 83
 Listerus T. II. 72. 89
 Littrius 98. 123. 139. 182. 197.
 T. II. 6. 9. 31. 33. 54. 80. 81.
 84. 85. 142. 145
 Lovverus 2. 85. 125. 126. 133.
 172. T. II. 92. 93
 Lyserus 2. 34

M.

Maierus T. II. 90. 145
 Malpighius 2. 14. 69. 70.
 89. 91. 105. 120. 134.
 150. T. II. 6. 12. 42. 46.
 51. 56. 71. 74. 82
 Mangetus 2. 74. 188. T. II. 59.
 84. 85. 86. 118. 122
 Marchettus 2. T. II. 49
 Mariottus T. II. 96. 98. 105
 Mastichellius 155. T. II. 118.
 119
 Mauriceau T. II. 79
 Mead 170
 Meeckren T. II. 97
 Meibomius 25. 142. T. II. 22
 Merius T. II. 6. 86. 89. 96. 130
 Michelottus T. II. 9. 12. 13.
 16. 38. 41. 42. 91. 122

Mœbius T. II. 127
 Molinettus 2. T. II. 144
 Morandus T. II. 100
 Morgagnus 2. 24. 27. 30. 45.
 56. 74. 80. 81. 88. 92. 96.
 97. 98. 100. 105. 114. 115.
 121. 122. 125. 128. 132. 135.
 138. 139. 142. 144. 147.
 149. 150. 152. 154. 158.
 160. 163. 168. 169. 173.
 175. 179. 181. 184. 188.
 189. 194. 197. 199. 202.
 T. II. 14. 23. 25. 28. 29. 31.
 32. 36. 45. 51. 53. 56. 57.
 61. 63. 65. 67. 69. 74. 75.
 78. 82. 87. 91. 93. 96. 99.
 100. 106. 108. 117. 122.
 130. 133

Mottius T. II. 63. 82
 Munnick T. II. 50. 113
 Muraltus T. II. 90
 Musgravius T. II. 63

N.

Naboth 104
 Needham 2
 Nevvton T. II. 97
 Nicolai T. II. 41. 75. 92. 95.
 124. 127
 Nigrifolius T. II. 82
 Noguez 2. T. II. 38
 Nuckius 2. 76. 115. 119. 146.
 T. II. 62. 65. 103. 106

O.

Oribasius 128
 Ortlobius 2. 131. 138.
 T. II. 71
 P. Pac-

Index I. Auctorum.

P.

Dacchionus 2. 131. T. II. 21
 Paitonus T. II. 82. 83. 85
 Alfyn 2. 19. 27. 151. T. II.
 70. 71
 Anarollus 100
 Aræus 45
 Auli 182
 Avius 2
 Echlinus T. II. 59. 121
 Ecquetus 2 85
 Etitus 46. 202. T. II. 88.
 100. 101
 Eyerus 2. 82. T. II. 8. 29
 Lancus T. II. 67. 68
 Lateralus 100. T. II. 97
 Mazzonus 100
 Minius 68
 Poliniere T. II. 97
 Dupartius 75. T. II. 53
 Pozzus T. II. 68
 Arcellius T. II. 72

R.

Raius T. II. 16. 17
 Rau 94 T. II. 48. 49. 114
 Rauholt 110. T. II. 10 34. 87. 97
 Redius T. II. 28
 Reneaume T. II. 100
 Rodius 100
 Rdeius 2. 131. 133. 137. 138.
 157. 164. T. II. 127. 130. 133
 Rolanus 2. 128. 144. 189.
 197. 198. 199. 202. T. II.
 50. 61. 75. 79. 85
 Rvinus 145. 154. T. II. 56.
 95. 112. 115

Rolfinck 2. T. II. 60
 Rudbeck 2. 86. T. II. 64. 65
 Ruffus 106. 128
 Ruyschius 2. 14. 20. 30. 31.
 44. 46. 54. 55. 64. 68. 69-
 72. 78. 79. 81-84. 86. 89.
 90. 92. 94. 97. 98. 100. 102.
 104. 106. 107. 108. 112.
 117. 119. 120. 124. 128.
 131. 133. 135. 137. 142-
 145. 147. 149. 152. 154.
 158. T. II. 8. 10. 18. 19. 22.
 25. 33. 34. 37. 41. 42. 51. 52.
 57. 58. 60. 71. 74. 80. 95.
 102. 104. 114. 124. 127

S.

Salzmannus 85. T. II. 64. 87.
 91
 Santorinus 2. 24. 28. 29. 32.
 34. 45. 69. 76. 77. 80. 96-
 101. 103. 105. 121. 127.
 132. 133. 138. 151. 152.
 164. 173. 174. 176. 179.
 181. 184. 196. 199. T. II.
 21. 22. 57. 79. 82. 85. 91.
 92. 111. 130. 131. 133.
 Saviard T. II. 84
 Sbaralea T. II. 82
 Scheinerus T. II. 97
 Schelhammerus 2. 41. 50. 51.
 55. 84. 90. 91. 127. 137.
 138. 153. 168. 169. 176.
 196. T. II. 6. 20. 53. 66. 71.
 72. 75. 117. 121. 134
 Schneiderus 2. 19. 152
 Schraderus 72. T. II. 75
 Schulzius T. II. 50. 81. 93
 n 2 Seve-

Index I. Auctorum.

Severinus	1. 2	Vallisnerius	94. 105. T. II. 10.
Simoncellius	155. T. II. 118.		73. 75. 82. 85
	119. 120	Valverda	2. T. II. 97
Slevogt	152	Varolius	2. 132. 137. T. II.
Spigelius	2. 111. T. II. 55		61. 96
Stancarius	T. II. 105	Vaterus	104 146. T. II. 80. 81.
Stenonis	2. 35. 70. 105. 142.		107. 108
	145. 150. 172. 188. T. II.	Vercellonius	2. 127. T. II. 23.
	35. 36. 52. 82. 106		26. 30. 37 52. 94
Stephanus	2. T. II. 97	Verheyen	2. 74 89. 104 115.
Stockhusius	T. II. 141. 150		126. 127. 142. 188. T. II.
Straussius	T. II. 84		22. 23. 25. 27. 35. 49. 70.
Svammerdam	2. T. II. 79		89. 97. 106. 124
Sylvester	T. II. 89	Du Verneus	2. 65. 77. 153.
Sylvius	135. 182		155. 164. 176. 177. T. II. 53.

T.

Taconus	T. II. 68	Du Vernoy	150. T. II. 109
Tauvrius	T. II. 89. 97	Vesalius	2. 25. 27. 36. 39. 54.
Teichmeierus	T. II. 75. 112.		135. 160. 172. 192. 197.
	115. 116. 117		202. T. II. 27. 49. 50. 53.
Terraneus	98. 99. 101. T. II.		61. 79 93. 97. 127. 142
	31. 32	Veslingius	2. T. II. 116.
Thebesius	123. 126	Vestus	T. II. 66
Tillingius	T. II. 85	Vidius	2. T. II. 97
Tournefort	T. II. 16. 53	Vidussius	T. II. 82
Trevv	T. II. 47. 48. 49. 50.	Vieussenius	2. 126. 131. 133
	155		134. 138. 165. 176. 177.
Tulpus	100		T. II. 18. 84. 85
Tyfo	97. T. II. 31	Virgilius	8
		Voglius	T. II. 80. 82. 84

V.

Valentini	I	Wagnerus	T. II. 86. 97
Valsalva	2. 22. 44. 153-	Walæus	88
	155. 176. 177. 183. 184.	Wallisius	169
	T. II. 25. 73. 113. 120		

W.

Wal-

Index I. Auctorum.

Valtherus	157. 158. 173. 176.	143. 171. 175. 185. 187.
	179. 196. 197. T. II. 107.	190. 191. 195. 200. 201.
	115. 157	T. II. 55. 89. 93. 100. 101.
Varthonus	2. 83. 115. 145.	105. 129. 130. 136 - 138.
	T. II. 74	141. 149
Vedelius (Jo. Adolph.)	T. II.	Wirfungus
	64	87
Velfchius	145. 154	Wium
Vidmannus	148	T. II. 64
in der Wiel	45	Wolhusius
Vierus	T. II. 79	T. II. 100
Villifius	2. 133. 136. 137.	
	162. 165. T. II. 56. 59. 127.	
	130. 131. 132	
Vinslous	2. 24. 28. 37 43.	
	56. 112. 116. 119. 125 126.	
		Z.
		Zahn
		T. II. 97
		Zellerus
		93



INDEX II.

RERVM PRAECIPVARVM.

A.

A bdominis partes seu regio-	Adeps in homine non datur
nes externæ	73
-- contenta	77
-- musculi	75
-- tegumenta f. partes con-	Adiposa membrana
tinentes	78. T. II. 56
Adnata tunica	143
Adnata tunica	143
Aethiopum cuticula nigra	68
-- nigritiei causa	69
Ala	8
-- vespertilionum	105
Albuginea tunica	143
Allantoides membrana	107
Alveoli dentium	30
Amphiarthrosis	63
	n 3
	Amyg-

Index II.

Amygdalæ	148	Aponevrosiſ	10. 169
Anatome, quid	I	Apophyſis offis	15
Anatomes ſubiectum, obie-		eius cognomina	ibid.
ctum, media	I	-- ſynonyma	ibid.
-- finis	3	-- uſus	ibid.
-- instrumenta	5. ſeqq.	Apophyſis condyloides	29
-- diviſio	II	-- coronoides	30
-- utilitates multæ	5	-- iugalis	20
Anatomia comparativa	I	-- mammillaris ſ. maſtoi-	
-- forenſis	4	dea	20
-- medica	3	-- naſalis ſuperior & infe-	
-- practica	4	rior	27
-- theologica, philoſophi-		-- palatina	ibid.
ca, phyſica	3. 4	-- petroſa	20
Anatomici ſcriptores optimi	2	-- pterygoidea	23
-- recentiſſimi in præf.		-- Rauiana dicta mallei	21
Anconæus proceſſus	50	-- ſtyloidea	20. 33
Angiologia	67. 156	-- zygomatica	20
Anguli oculi	142	Appendiculæ adiposæ coli	81
Animæ cogitantis ſedes	134	Appendix offis	16
Annulus pro tranſitu proceſſus		-- vermiformis	81
peritonæi	75	Aquæductus Fallopii	22. 34.
Anthelix	153		155
Antitragus	ibid.	-- Nuckii	143
Antrum Highmori	27	-- Sylvii	135
Anus	81	Aqueus humor oculi	144
eius elevatores & ſphincter	ibid.	eius verus ſitus T. II. 96. &c.	
-- muſculi diverſe ab aucto-		Arachnoides tunica cerebri.	
ribus deſcripti	198		132. 137
Anus cerebri	135	-- medullæ ſpinalis	140
Aniſcalptor muſculus	190	-- oculi	144
Aorta	157	Arcus aortæ	157
eius arcus	ibid.	Areola mammæ	114
-- rami aſcendentes	ibid.	Arteria quid	9
Apex cordis	124	eius ſtructura	156
-- linguæ	149	-- figura	ibid.
-- unguis	72	-- muſcularis tunica defen-	
		ſa	T. II. 121
			Arte.

Rerum præcipuarum.

terix adiposæ	158	Arteria iliaca	ibid.
teria aorta	124. 156. 157.	-- intercostales superiores	157
eius divisio	157. T. II. 122.	-- inferiores	158
-- aspera	121. 122	-- intestinorum tenuium	
-- atrabiliarix	158	cum venis communi-	
-- axillaris	157	cant	T. II. 59
-- brachialis	157. T. II. 126	-- lumbaris	158
-- bronchialis	120. 158	-- magna s. aorta	156. T. II.
-- carotis interna & exter-			122
na	137. 157. T. II. 124	-- mammaria	157
-- internarum ingressus	137	-- mediastina	157
-- cum vertebralibus ana-		-- mesenterica superior &	
stomoses	ibid.	inferior	158
-- carotidum divisio	T. II.	-- musculares colli	157
	124	-- œsophageæ	158. T. II.
-- cervicalis	157		127
-- coeliaca	158	-- pancreatica	158
eius rami	ibid.	-- poplitæa	ibid.
-- coronaria cordis	124. 157	-- pudenda	ibid.
-- cruralis externa & inter-		-- pulmonalis	124. 156
na	158	-- cur amplior vena	T. II. 90
-- cubitæa	157	-- radiæa	157
-- cysticæ gemellæ	158	-- renalis	158
-- diaphragmatica superior		-- sacra	158
& inferior	157. 158	-- scapularis externa & in-	
-- duodena	158	terna	157
-- duræ matris	131	-- spermatica	158
-- emulgentes	158	eius exortus	T. II. 75
-- epigastrica	158	-- spinalis	157
-- epiploica dextra & fini-		-- splenica	158
stra	158	-- subclavia	157
-- gastrica dextra & sinistra		-- suralis	158
	158	-- thoracica s. mammaria	
-- gastro-epiploica	158	externa	157
-- hæmorrhoidalis externa		-- tibialis	158
& interna	158	-- trachea	121. 122
-- hepatica	ibid.	-- vertebralis	157. T. II. 125
-- hypogastrica	ibid.		

Index II.

Arteria umbilicalis	158	Axis	39
quousque cava ma-		Azygos musculus uvulae	184
neat	77	-- -- vena	159
Arteriosus canalis	112. 126		
Arthrodia	63	B.	
Arthron	ibid.	Balanus	98
Articulationes foetus	112	Bartholini prostatae	102
Articuli ossium	17. 62	Basilare os	23
Articulus	63	Bicorne os	36. 147
Artus superiores & inferiores	7	Bilis	89
Arytænoides cartilagines	36.	eius itus & reditus per du-	
	121	ctum cysticum defensus T.	
Asellii pancreas	83		Il. 70
Aspera arteria	121. 122	Brachium	8
Astragalus	58	eius os	48
Atlas	39	-- -- arteria	157
eius ligamentum semicircu-		musculi	190
lare	39	Bregma	20
Atrabiliariae capsulae	92	eius ossa	19
	T Il. 29	Brevia vasa	79. 161
in foetu maiores	92	Bronchia	120. 122
Auditorius meatus	20. 34. 153	eorum arteria	120. 158
-- nervus	155	-- -- vena	120. 159. T. II.
ejus canalis	22. 155		91
Auditus organon	153. 155	-- -- glandulae	122
-- -- os orbiculare	21	Brunneri glandulae	80
-- -- ossicula	21. 154. T.	Bucca	8
	Il. 116.	earum glandulae	146. T. II. 22
Avium oviductus	106	Bulbus oculi	143
Aures	153	-- -- pili	71
Auricula	ibid.	-- -- urethrae	98
eius pinna	ibid.		
Auriculae cordis	125	C.	
dextra amplior Sinistra	T. II.	Calamus scriptorius	137
	91	eius crena	ibid.
Auricularis digiti musculi	195	Calcaneum	58
Axilla	8	Calcis os	ibid.
Axillaris vertebra	40	Callo-	

Rerum præcipuarum.

llosum corpus	134	Carunculæ myrtiformes	101
lvaria	18	Cauda musculi	169
mera oculi duplex	143	Caudæ s. coccygis os	42
nalis arteriosus	112. 126	Cavernosa corpora penis	97
-- -- nasalis	35. 142	Cavernosum corpus tubæ Fal-	
-- -- nervi auditorii	22. 155	lopianæ	106
-- -- semicirculares	ibid.	Cavernulæ ossium	17
-- -- venosus	88. 109. 112	-- -- ossis ethmoidei	151
anthi oculi	142	Cavitas tympani	21. 154
apilli	71	Cavitates ossium	17
apsula Glissonii	88	Cerebellum	136
-- -- similis cum pericar-		eius crura	136. 137
dio continua T. II.	91	-- -- pedunculi	ibid.
apsulæ atrabiliaræ	92. T. II.	-- -- processus vermifor-	
	29	mis	136
aput	7. 18. 129	-- -- protuberantiæ orbi-	
eius partes continentes	130	culares	137
-- -- contentæ	ibid. seqq.	Cerebrum	131
aput musculi	169	strictè dictum	134
-- gallinaginis	96	totum glandula magna forte	
ardia	79	non inepte diceretur T. II.	21
aro	10	Cerebri anus	135
-- quadrata	192	-- -- corticalis substantia	
arotides arteriæ	137. 157.	non est glandulosa	
	T. II. 124	T. II. 18	
arpus	8. 51	-- diaphragma	135
eius musculi	192	-- hemisphæria	134
artilago	11. 66	-- membranæ	131-133
-- -- arytxanoides	36. 121	-- nates	135
-- -- cricoides	ibid.	-- neruorum paria	137
-- -- ensiformis	44	-- substantia	134
-- -- thyroides	36. 121	-- testes	135
-- -- xiphoides	44	-- valuula magna	135. 136
artilagines laryngis	121	-- ventriculi	135
aliquando ossescunt	36	-- -- anteriores aliquan-	
-- -- nasi	151	do glacie pleni re-	
aruncula lacrymalis	29. 142	perti	ibid.
		n 5	Cere-

Index II.

Cerebri vulva	135	Colli vertebræ	38
- - usus	138	- - musculi	186
Cervix	8	Colon intestinum	81
Cervicis uteri ostiola & vesi-		eius valvula	80
culæ	104	- - valvulæ conniventes	81
Ceruminosæ glandulæ	153	- - ligamenta tria	ibid.
Cerumen	ibid.	- - appendiculæ	adiposæ
Chorda Achillis	202		ibid.
- - tympani	154. 162	Columella	148
Chordæ Willisii	131	Concha	153
Choroidea tunica	143	Condylodes processus	29
- - visus primum organon		Coniunctiva tunica	143
secundum quosdam		Cor	124
T. II. 96		perpetuum mobile	126
Choroideus plexus	135	quale in foetu	112
Chorion	107	eius arteriæ Coronariæ	124
Chyli cisterna	85		157
- - receptaculum	ibid.	auriculæ	125. T. II. 91
Chylifera vasa	84	columnæ carneæ	125
Chyliferus ductus	85	fibræ rectæ	T. II. 93
Chylopœa viscera	67	lacertuli	125
Cilia	142	motus	126
Ciliare ligamentum	143	septum	125
Ciliares processus	ibid.	tuberculum Loweri negatur	
Circulatio pinguedinis	73		125. T. II. 92
- - sanguinis in foetu	126	valvulæ	125
Circulus arteriosus & venosus		venæ coronariæ	124. 159
in oculo	143	earum orificia	126
Cisterna chyli	85	ventriculi	124. 125
Clavicula	48	horum dexter amplior fini-	
Claustum palati	148	stro	T. II. 91
Clitoris	100	Coracoides processus	47
Coccygis os	41	Cornea tunica	143
- - musculi	199	Coronale os	19
Cochlea	22. 155	Coronoides processus	30. 50
Cœcum intestinum	81	Corporis humani externæ ap-	
Colis	97	pellationes & divisio.	7. 8
Collum	7. 128	- - tegumenta communia	66
		Corpo-	

Rerum præcipuarum.

pora cavernosa penis	97	eius verus situs T. II. 96. sequ.	
- sphaeroidea morboſa non		Cubitus	8. 49
argunt glandulas T. II.		eius muscoli	191
	6. 54	Cuboides os	58
- ſtriata	135	Cuneiforme os	23
pus ca loſum	134	Cuneiformia oſſa tarſi	59
pus cavernoſum orificium		Cutaneæ glandulæ	20
raginæ ambiens	102	- - papillæ	156
- Highmori	94	Cutanei folliculi	70
- luteum ovarii	105	Cutaneum reticulum	69
- - pampiniforme	94	Cuticula	67. 68
- pyramidale	ibid.	Cuticula Æthiopum nigra	68
- reticulare Malpighii	68. 69	Cutis	70
huius color in Æthiope		fulci ſ. lineæ	68
	69	Cyſtica bilis	89
- - Valsalvæ	153	Cyſtica vaſa	ibid.
puscula globosa cervicis		Cyſticus ductus	ibid.
ateri	104	Cyſtis fellea	ibid.
rticalis cerebri ſubſtantia			
non eſt glanduloſa T. II.	18		
ſtae	42. 43		
yle	17		
yledones	108		
onium	18. 130		
eius futuræ	24		
eius muscoli	130		
- - oſſium in foetu conditio			
	24. 112		
emaster musculus	94		
ena calami ſcriptorii	137		
briforme os	23		
coides cartilago	36. 121		
ſta galli	23		
- ulnæ	50		
us	8. 56		
ara cerebelli	137		
- medullæ oblongatæ	ibid.		
yſtallinus humor	144		

Index II.

Digitum pedum	59	Ductus Rivinianus	145
eorum muscoli	203	-- salivalis Coschvzianus	
minimi dig. ped. muscoli	205	est vena	T. II. 109
Digitorum musculi multum		-- Stenonianus	145. T. II. 108
variant	194	-- sub osse occipitis in pharyngis fornice mucosus	146. T. II. 110
Diploë	18	-- thoracicus	84. 85
Diverticula Nuckii	76	eum demonstrandi methodi	84. 85
Divisio sceleti	18	-- finem tegit valvula semilunaris	85
Dorsum	8	cuius usus controversus	T. II. 64
ejus spina	37	-- Warthonianus	145
huius divisio	ibid.	Ductuum lacrymalium orificia	152
-- vertebræ	ibid.	Duodenum intestinum	80
-- musculi	189	Duodena arteria	158
Dorsum manus	8. 52	Dura mater	64. 131. 138
-- pedis	57	eius processus	131
Ductus adiposi	78. T. II. 56	-- arteriæ	ibid.
-- Bartholinianus	145	-- sinus	131. 138. T. II. 95
-- cholidochus communis	88	E.	
-- chyloferus	85	Elevatores ani	81
-- cysticus	88. 89	Embryo	107
-- cyst - hepatici Bianchi.	T. II. 68	Eminentia pyramidales Vieussienii	137
-- Eustachii	21. 33. 154	-- olivares eiusdem	ibid.
-- excretorius quid	11	Enarthrosis	63
-- -- pancreatis	87	Ensiformis Cartilago	44
huius inventor.	ibid.	Epidermis	68
-- excretorii novi Vercellonii	127. T. II. 94	Epididymides	95
-- ex naso ad os, an apertus	152. T. II. 112	-- peculiariter constituti descriptio	T. II. 75
-- hepatico - cysticus	88	Epigastrica regio	8
an in homine detur	T. II. 67	Epi-	
-- hepaticus	88		
-- lactiferi	115		

Rerum Præcipuarum.

glottis	121	Fibræ carneæ ventriculi	T. II. 56
physis ossis	15.16	-- cordis rectæ	T. II. 93
phylum numerus	62	-- musculosæ diversitas	172
- usus in adultis	16	Fibula	56.57
- - - infantibus	17	Fistula spiralis	121
ploon	77	Fluidæ partes	12
- parvum Winsloi	T. II. 56	Fœtus	107
stropheus	39	eius membranæ	ibid.
moides os	23	-- situs in utero	111
eius cavernulæ	151	-- extra uterum reperti	T. II. 83-85
stachii tuba	21. 33. 154	-- articulationes	112
cavationes nasales	27	-- ossa cranii	ibid.
- - palatinæ	ibid.	-- circulatio sanguinis	126
cretorius ductus	11	inter ipsum & matrem	
- - - pancreatis	87	communis	T. II. 85
huius inventor	ibid.	-- cor quale	112
remitates corporis	7.47. 53	-- dentes	ibid.
		-- canalis venosus	88. 109. 112
		-- differentiæ ab adulto.	ibid.
		-- nutritio	110
		-- - - per os	T. II. 87
acies	8. 141	Folliculus in quavis glandula	T. II. 10. seq.
Falciformis processus	131	Folliculi cutanei	70. T. II. 37
llopii aquæductus	22. 34	Fons pulsatilis	20
llopiæ tubæ	106. T. II. 83	Fontanella	20, 112
rciminalis membrana	107	Foramen cœcum linguæ	146.
scia lata	200. 201		149. T. II. 107
llea cystis	89	-- ovale	112. 126
llea vesica	77. 89	eius usus	T. II. 89
lleæ radices	88. 89	Foramina narium	152
mur	8. 53. 54	-- ossium cranii	31. seq.
eius musculi	200	-- - - maxillæ	34. seq.
nestra ovalis	21. 154	Fornix	
- - - rotunda	ibid.		
pra	9		
eius differentiæ	ibid.		

Index II.

Glandulæ

Rerum præcipuarum.

Glandulæ laryngis	T. II. 24	-- placentæ uteri, an den-	
-- lienares	T. II. 29	tur	T. II. 33
-- Littrii	99. T. II. 31	-- pleuræ, an dentur	117
-- linguæ 146. 149.	T. II. 22	-- prostata	T. II. 31
-- lumbares	T. II. 29	-- renales	92. T. II. 29
-- mammarum in areolis		-- sacre	T. II. 29
	T. II. 36	-- salivales	145
-- matri duræ & arachnoi-		-- sebaceæ	70
deæ interpositæ	T. II. 21	-- cutis	T. II. 37. 51. 52.
-- maxillares	145. T. II. 22	-- potius receptacula sunt.	ibid.
-- mesaraicæ	83. T. II. 29	-- Meibomii	142. T. II. 22
-- molares	146. T. II. 109	-- Valsalvæ	153
-- mucilaginosæ	17. T. II.	-- simplices	T. II. 20
	34	-- sinuum duræ matris	T.
-- mucosæ	17. T. II. 22		II. 21
-- -- Cowperi	99	-- solitariae	T. II. 20
-- Nuckiana	146	-- splenicæ	T. II. 29
-- nympharum	T. II. 32	-- subcutaneæ	T. II. 35
-- occipitales	T. II. 24	-- sublinguales	145. T. II.
-- odoriferæ Tyf.	97. T. II.		22
	31	-- -- ductus	T. II. 106
-- œsophagi	T. II. 25	-- thymus	T. II. 25
earum ductus excreto-		de ea controversia inter	
rius Vercellonii	127.	Bidl. & Verh.	ibid.
	T. II. 94	-- -- in fœtu	112
-- omentales	T. II. 30	-- thyroideæ	122. T. II. 22
-- orificii ventric. sinistri		-- -- unica in homine	T. II.
Vercell.	T. II. 30		22. 23
-- ossis frontis fovearum		-- -- isthmus	T. II. 23
	T. II. 21	-- -- an sit nidus ovulorum	
-- Pacchioni	131	verminosorum	ibid.
-- palatinæ	146. T. II. 22	-- -- dubii usus	T. II. 24
-- pancreas	T. II. 29	-- tonsillæ	T. II. 22
-- parotides	145. T. II. 22	-- trachææ	T. II. 25
-- peritonæi, an dentur	76	-- tunicæ pituitariæ	152
-- Peyerii	82	-- Venæ portæ	T. II. 29
-- pinealis	135. T. II. 22	-- ventriculi	T. II. 29. 57
-- pituitaria	139. T. II. 22		Glan.

Index II.

Glandulæ vesicæ	T. II. 30	Hepaticus ductus	ibid.
-- vesiculæ felleæ	89. T. II. 30	Hepatis porta	ibid.
-- vesic. seminalium	T. II. 31	-- tubercula in statu mor- bofo qualia	T. II. 70
-- veteribus Cognitæ, quæ	T. II. 14	Herophili torcular	131
-- ureterum	92. T. II. 30	Highmori antrum	27
-- urethræ muliebr.	T. II. 32	-- corpus	94
-- -- virilis	T. II. 31	Homoplata	47
-- uteri, an dentur	T. II. 33	Humerus	8
-- uvulares	146	eius musculi	190
Glandulosum & vasculosum differunt	T. II. 9. 13	-- os	48
Glans penis	98	Humores oculi	144
Glene	17	Hydatides ovarij muliebriſ	105
Gliffonii capsula	88	Hymen	101
Globus & Glomer idem	T. II. 20	omnino exiſtit in foetu	T. II. 78 112
Glottis	121	Hyoides os	36
Gomphofis	30. 63	eius musculi	147. 181
Gula	127	Hypochondria	8
Gustus	156	Hypogaſtrica regio	ibid.
eius organum	145	I.	
H.		I Ecur	88
H Abitus peculiaris glandulæ		Ieiunum inteſtinum	80
T. II. 17. 37. ſeq.		Ileum inteſtinum	ibid.
Harmonia	26. 63	-- os	44
Helix	153	Iliaca regio	8
Hemiſphæria cerebri	134	Incus	21. 154
Hepar	77. 88	Indicis musculi	195
in foetu magnum	112	Infundibulum	137
non eſt glandula	T. II. 18. 69	ad illud rima	135
Hepar uterinum	108	Inguina	8
Hepatica bilis	89	Innominata oſſa	44. 45
Hepatico-cyſticus ductus	88	eorum differentia in mare & femina	46
		-- ligamenta	45
		Interoſſeum ligamentum	57
		Inteſtina	77. 80
		Inte-	

Rerum Præcipuarum.

testina crassa	81	Labra pudendi	100
-- tenuia	ibid.	Labyrinthus	22. 155
testinorum structura	82	eius vestibulum	ibid.
-- fibræ annulares irregula-		Lacerti cordis	125
res	T. II. 60	Lacrymalis caruncula	29. 142
-- -- longitudinales ubi		-- glandula	ibid.
quærendæ	T. II. 58	-- saccus	ibid.
-- tenuium rugæ	T. II. 59	Lacrymalia puncta	ibid.
-- tunica cellulosa Ruyschii		-- ossa	26
	82	Lacrymalium ductuum orifi-	
-- -- -- Albini	T. II. 58	cia	152
Differt a Ruyschiana		Lactea vasa	11. 84
ibid.		in pennatis desunt	84
testinorum tunica villosa	82.	Lactiferi ductus	115
	T. II. 59	Lacuna	8
-- -- -- est villo - papillo-		Lacunæ Graafii	101
sa	T. II. 60	Lamina spiralis Eustachii	155
testinum cæcum	81	Larynx	121
-- colon	ibid.	eius cartilagines	ibid.
-- duodenum	80	-- musculi	182
-- iejunum	ibid.	-- ossa	36
-- ileum	ibid.	-- sinus	121
-- rectum	81	-- ventriculi	ibid.
volucra ligamentorum	10-	Lens crystallina	144
tundorum	76	Lien	77. 90
is	143	an sit glandula	90. T. II. 18.
chiatica regio	8		71
chium os	44	eius usus	T. II. 71. 72
igulum	8	Ligamentum	10. 65
agalis apophysis	20	-- annulare colli femoris.	
agalia ossa	27		54
unctura ossium	62	Ligamentum annulare manus	
			192
		-- ciliare	143
L.		-- interosseum	49. 57
abra	147	-- linguæ membranac.	149
horum superioris frenu-		-- Poupartii	75. T. II. 53
lum	ibid.		Liga-

Index II.

Ligamentum semicirculare At-		Malleoli	8. 56. 57
lantis	39	Malleus	21. 154
- - suspensorium	88	eius apophyses	21
- - teres, an teres	46. 53	- - musculi	154
Ligamenta duo ossium innomi-		Malpighii rete vasculosum	120
natorum	45	Mammæ	113
coli tria	81	harum corpora globosa Nu-	
- - uteri, latum & rotun-		ckii	115
dum	103	- - glandulæ areolarum T. II.	36
- - rotundorum involucrum	76	Mammillaris apophysis	20
Linea alba	75	Manus extrema	51
Lingua	145. 149	Manus dorsum	8. 52
eius foramen coecum	146	Manus vola	ibid.
149. T. II.	107	- - musculi	192
- - frenulum	149	Mastoidea apophysis	20
- - ligamentum membrana-		Mater dura	64. 131
ceum	ibid.	- - pia	133
- - linea mediana	ibid.	Matrix	103
- - musculi	150. 181	Maxilla	26
- - nervi	150	inferior	29
- - papillæ nerveæ	156	Maxillaria ossa	27
Liquor pericardii	123	Maxillares sinus	151
- - cui foetus innatat	107	Meatus auditorius	20. 34. 153
Lumbi	8	- - - - foetus	112
eorum musculi	189	Meconium	110
- - nervi	165	Mediastinum	116
- - vertebræ	40	eius interstitium cellulosum	116. T. II. 89
Lunula	72	Meditullium	18
Lutea corpora glandiformia		Medulla	11. 65
T. II.	82	- - oblongata	137
Lympha	86	eius crura	ibid.
Lymphatica vasa	11. 86	- - spinalis	140
ea demonstrandi modus ibi.		eius tunica ligamentosa	
inventores illorum	ibid.	& cellulosa	ibid.
M.		Membrana, quid	10
MAla	8	- - adiposa	67. 73
eius ossa	27	Membra-	

Rerum præcipuarum.

membrana allantoides f. farci-		Musculi simplices	172
minalis	107	-- compositi	ibid.
-- musculorum communis		-- abdominis	75
	74	-- abductor auric.	dig.
-- mucosarium	152		195
-- oculi semilunaris	142	-- -- annularis dig.	ibid.
-- papillaris Helvetii T. II.		-- -- indicis	ibid.
	60	-- -- medi digiti	ibid.
-- pituitaria Schneideri	152	-- -- pollicis	194
-- subpituitaria	ibid.	-- -- -- pedis	204
-- tympani	154	-- -- -- proprius digiti	
eius foramen ibid. T. I.		minimi pedis	205
	112	-- acceleratores	196
membranæ foetus	107	-- -- urinæ	197
membranula meatum audito-		-- adductor auric. dig.	195
rium in foetu claudens	112	-- -- femoris triceps	200
menstruorum fontes 104. T. II.		-- -- annularis	195
	81	-- -- medi dig. man.	ibid.
mentula	97	-- -- pollicis man.	194
-- muliebris	100	-- -- -- ped. transversalis	
mesaræum	83		204
mesenterium	77. 83	-- anconæus	191
mesocolum	83	-- ani	198
metacarpus	8. 51	-- aniscliptor	190
metatarsus	8. 59	-- annuens Cowperi	185
mons veneris	100	-- ary arytænoides	182
motus animalis, involuntarius,		-- ary epiglottæ	ibid.
mixtus, naturalis, voluntari-		-- antithenar poll. man.	194
us	172	-- -- -- ped.	204
motus tonicus	171	-- auris	153
musculus	10	-- -- externæ	176
-- quid	169	de iis variæ sententiæ	
-- eius partes	ibid.		ibid.
musculi antagonistæ	171	-- auricularis digiti	195
-- focii	ibid.	-- azygos Morgagni	184
-- actio	169	-- basioglossus	181
-- -- diversæ sententiæ	170	-- bibitorius	175

Index II.

Musc. biceps	191	Musc. dentatus maior anticus	187
-- -- tibiæ	201	-- dentatus minor	187
-- bicornis 192. vel tricornis pollicis	194	-- depressor palpebr. inf.	172
-- biventer	180	-- detrusor urinæ	199
-- brachii	190	-- digastricus	180
-- brachialis internus	191	eius trochlea	ibid.
-- externus	ibid.	-- digitorum manus	193
-- brevis cubiti	191	multum variant	194
-- -- radii	ibid.	-- digiti medii manus	195
-- buccinator	178	-- -- annularis	ibid.
-- caninus	ibid.	-- -- auricularis	ibid.
-- capitis	185	-- digitorum pedis	203
-- carpi	192	-- digiti primi ped.	205
-- ceratoglossi	181	-- -- medii	ibid.
-- cerato-staphylini T. II.	133. 134	-- -- tertii	ibid.
-- cephalopharyngæi	183	-- -- minimi	ibid.
-- coccygæus	199	-- dilat. nasi	179
-- colli	186	-- -- posticus urethræ	197
-- complexus	185	-- dorfi	189
-- constrictor labror.	178	-- -- latissimus	190
-- -- orbicular. nasi	179	-- -- longissimus	189
-- coracobrachialis	190	-- elevator scapulæ	187
-- coracohyoides	181	-- -- labri infer.	178
-- cranii	130. 173	-- -- palpebr. super.	174
-- cremaster	94. 196	-- -- urethræ Santor.	197
-- crico-arytænoides lateralis	182	-- epiglottidis attollentes & deprimentes	182
-- -- posticus	ibid.	-- erectores penis	196
-- crico-pharyngæus	183	-- extensor auric. dig.	198
-- crico-thyroidæus	182	-- extensor communis	193
-- crotaphites	180	-- -- lumborum, dorfi & colli	188
-- cruralis	201	-- -- dig. ped. longus	203
-- cubiti	191	-- -- -- brevis	ibid.
-- cucullaris	187		Musc.
-- deltoides	190		

Rerum præcipuarum.

Musc. indicis	195	Musc. non nisi unicus secundum quosdam T. II.	134. 135
- - - extensor lumborum & dorsi communis	188	- - interossei man. 193. T. II.	136. seq.
- - - pollicis ped. longus	204	- - - digit. ped. 203. 205	
- - - - brevis	ibid.	- - interspinales colli	186
- - fascia lata	200. 201	- - intertransversales	ibid.
- - femoris	200	- - - lumborum	189
- - flexor poll. ped. longus	204	- - intervertebrales	186
- - - - brevis	ibid.	- - intracostales	Verhey.
- - frontales	173		188
- - gastrocnemius	202	- - labrorum	178
- - gemini duo	200	- - laryngis	182
- - genioglossi	181	- - levatores ani	198
- - genio hygoïdes	ibid.	- - - - minores	Riolani
- - glutæi	200	& Dougl.	199
- - glosso-pharyngæi	183	- - levatores castarum	188
- - glosso staphylini	184	- - linguæ	150. 181
- - gracilis	201	- - lividus	200
- - helices	177	- - longus & brevis s. bi-	
- - humeri	190	cornis	192
- - humilis	175	- - longus colli	186
- - hyo - epiglottæi	182	- - - cubiti	191
- - hyo - thyroïdes	182	- - - radii	ibid.
- - hyoidis ossis	147. 181	- - lumborum	189
- - hyo pharyngæus	183	- - lumbricales 193. T. II.	
- - hypothenar	194		135. 136
- - iliacus	200	- - - digit. ped.	203
- - incisivus superior & inferior	178	- - mallei	154. 177
- - indicator	195	- - manus	192
- - indicis digiti	ibid.	- - masseter	180
- - indignatorius	175	- - mastoideus	185
- - infraclapularis	190	- - maxillæ inferioris	180
- - infraspinatus	ibid.	- - membranofus 200. 201	
- - intercostales	116. 188		Musc.

Index II.

Musculus myloglossus	181	Musculus plantaris	202
-- mylo-hyoides	ibid.	-- platysma myodes	176.
-- mylo-pharyngæus	183		180
-- myrtiformis nasi	179	-- pollicis extensor	194
-- nasi	ibid.	-- -- flexor	ibid.
-- obliqui oculi	175	-- -- multum variant	ibid.
-- obliquus maior cap.	185	-- poplitæus	201
-- -- minor	ibid.	-- profundus	193
-- obturatores interni &		-- projector urethræ	197
externi	200	-- prostaticæ Sanctor.	ibid.
-- occipitales	173	-- psoas magnus	200
-- oculi	142. 175	-- -- parvus	189
-- -- septimus brutorum		-- pterygoides externus	180
	175	-- -- internus	ibid.
-- œsophagæus	183	-- pterygo-pharyng.	183
-- orbicularis labror.	178	-- pterygo-staphylinus	184
-- -- palpebrar.	174	-- pyramidalis nasi	179
-- ossis coccygis	199	-- pyriformis	200
-- -- hyoidis	181	-- quadratus	178
-- palato-staphylinus	184	-- -- femoris	200
-- palmæ	192	-- -- lumborum	189
-- palmaris	ibid.	-- -- radii	191
-- patientiæ	187	-- radialis externus	192
-- pectinæus	200	-- -- internus	ibid.
-- pectoralis maior	116.	-- radii	191
	190	-- recti oculi	175
-- -- minor	187	-- rectus lateralis cap.	185
-- pedis extremi	202	-- -- maior anticus	ibid.
-- penis	196	-- -- -- posticus	ibid.
-- perforans	193	-- rectus minor anticus &	
-- -- digit. ped.	203	posticus	185
-- perforatus	193	-- rectus tibiæ	201
-- -- digit. ped.	203	-- respirationis	188
-- peronæus anticus	202	-- rhomboides	187
-- -- posticus	ibid.	-- rotatores externi & in-	
-- pharyngis	183	terni	200
-- pharyngo-staphylinus.		-- rotundus maior & minor	
	184		190
			Musc.

Musc. rotundus radii	191	Musc. thenar	194
-- sacrolumbaris	189	-- -- pollicis ped.	204
-- salpingo-pharyng.	183	-- thyro-arytænoid.	182
-- salpingo-staphylinus	184	-- thyro-pharyng.	183
-- sartorius	201	-- thyro-staphylinus	184
-- scalenus	186. 188	-- tibiæ	201
-- scapulæ	187	-- tibialis anticus	202
-- semimembranosus	201	-- -- posticus	ibid.
-- seminervosus	ibid.	-- tragi & antitrangi	177
-- semispinosus	189	-- transversales & spinales	
-- serratus maior anticus		colli	186
	187. 188	-- transversæ urethræ	197
-- -- minor antic.	187	-- trapezius	187
-- -- posticus inf.	188	-- triangularis labr.	178
-- -- -- super.	ibid.	-- -- sterni	188
-- solaris	202	-- -- urethræ	197
-- spheno-staphylinus	184	-- triceps brachialis	191
-- sphincter ani	198	-- trochlearis	175
-- vaginæ uteri	199	-- tubæ novus Vals.	184
-- vesicæ	ibid.	-- vaginalis gulæ	183
-- splenius	185	-- vastus internus & exter-	
-- stapedis	154. 177	nus	201
-- sterno-hyoides	181	-- ulnaris externus & inter-	
-- sterno-thyroides	182	nus	192
-- stylo-glossus	ibid.	-- urethræ virilis	197
-- stylo-hyoides	ibid.	-- uteri novus orbicularis	
-- stylo-pharyng.	183	Ruysschii 108. T. II. 80	
-- subclavius	188	-- uvulæ	184
-- sublimis	193	-- zygomatikus	178
-- superbus	175	Musculor. denominatio	172
-- superciliorum corruga-		Musculor. numerus	ibid.
tor	174	-- membrana communis.	
-- supercostales breves &			74
longi Verheyeni	188	Musculosæ fibræ diversitas	
-- supraspinatus	190		172
-- tarfi	202	Myologia	67. 169
-- temporalis	180	eius ordo	172
-- teres mai. & min.	190	Myrtiformes carunculæ	101

N.

Nasus Nares	151
eius ossa	ibid.
-- septum	27. 28. 151
-- sinus	151
-- cartilaginee	ibid.
Nasales excauationes	27
-- apophyses inferior & superior.	ibid.
Nasalis canalis	35
Narium foramina	152
-- tunica mucosa	ibid.
-- sinus	151
-- an ductu quodam cum ore communicent	152
Nates cerebri	135
Naviculare os	58
Nervus	10. 162
Nervi quotuplices sint	162
eorum ortus incertus	T. II. 130
vera sunt vascula	166
-- cerebri paria IX.	137. 162
-- cervicis	164
-- dorsi	ibid.
-- lumborum	165
-- ossis sacri	ibid.
-- spinales	140. 164
Nervorum ganglia	163
-- plexus	ibid.
-- usus	168
Nervus abducens	163
Nervus accessorius Willis.	164
-- auditorius	155. 163
-- eius canalis	22. 155

Nervus portio dura & mollis	163
-- -- distributio T. II.	118
Nervi brachiales	164
Nervus cerebri X. Willis.	163. T. II. 132
-- cruralis	165
-- diaphragmaticus	164
-- gustatorius	162
eius rami insigniores	ibid.
-- intercostalis	162. 163
eius origo inconstans	T. II. 131
-- ischiaticus	165
-- lingualis	163
-- oculorum motorius	162
eius divisio	ibid.
-- olfactorius	152. 162
-- opticus	162
eius insertio T. II.	104. 105
-- thalami	135
-- patheticus	162
-- recurrens	163
-- spinalis accessorius	137. 163. 164
-- vagus s. par vagum	163
Nevrologia	67
Nuckii diverticula	76
Nymphæ	101

O.

Occiput	8
eius muscoli	173
Oculus	141
eius anguli s. canthi	142
-- bulbus	143
Oculus	

Rerum precipuarum.

Oculus camera duplex	ibid.	Os linguale	36. 147
-- humores	144	-- multiforme	23
-- orbita	29	-- occipitis	22
-- tunicæ	143	-- orbiculare auditus	21
-- muscoli	142. 175	-- pectinis	44
-- membrana semilunaris	142	-- pubis	ibid.
-- circulus arteriosus & venosus	143	-- sacrum	40. 41
-- nervi	144	-- scaphoides	58
Odoratus organon	151. 152	-- sphenoides	23
Odoriferæ glandulæ Tyf.	97	-- vomer	28
Oesophagus	127	-- ypsiloides	36
eius verus situs	T. II. 93	Ossa bregmatis	19
Olecranus processus	50	-- cranii in infantibus recens natis qualia	24
Omentum	77. 78	-- cuneiformia	59
eius apertura naturalis Winsloii	78. T. II. 55	-- foetus	112
Orbita oculi	29	-- innominata	44. 45
Orificium vaginæ uteri	101	eorum ligamenta	45
-- uteri internum	103	-- differentia in mare & femina	46
Os	11	-- iugalia	27
-- basilare	23	-- lacrymalia	26
-- bicornæ	36. 147	-- laryngis	36
-- brachii	48	-- malæ	27
-- calcis	58	-- maxillaria	ibid.
-- caudæ s. coccygi	41. 42	-- nasi	27. 151
-- coronale	19	-- palati	28
-- cribriforme	23	-- palatina antica male sic describuntur	27
-- cribrosum	ibid.	-- parietalia	19
-- cuboides	58	-- pectoris	42
-- cuneiforme	23	-- petrosa	20
-- ethmoides	ibid.	-- sacrum & ilium an in partu disiungantur	45
eius cavernulæ	151	-- sesamoidea	59. 60
-- frontis	19	ad ea pertinentia varia historica T. II.	47-50
-- humeri	48	ubi inveniantur	195. 202
-- hyoides	36. 147		
-- ileum	44		
-- ischium	44		

Index II.

Offa fincipitis	19	Ovula mulierum	105. T. II. 81. 82
-- spongiosa infer.	28	-- verminosa	Vercellonii
-- -- super.	24		T. II. 24
-- squamosa	20		P.
-- temporum	ibid.	Palatum	148
-- thoracis	42	eius claustrum f. velum	ibid.
-- trunci	37	-- ossa	28
-- turbinata f. spongiosa	24.	-- antica male sic describun-	
	28	tur	27
-- eorum inæqualitates	151	Palpebræ	142
-- verticis	19	earum tarfi	ibid.
-- unguis	26	Pampiniforme corpus	94
-- zygomatica	27	Pancreas	87. T. II. 29
Offium cavernulæ & cavitates		eius ductus excretorius	87
	17	inventor eiusdem	ibid.
-- consideratio anatomica		Pancreas Afellii	83
& chemica	13. 14	Panniculus carnosus	74
-- differentiæ	14	Papilla	114
-- iunctura	62	Papillæ cutaneæ	156
-- numerus	60. 61	-- pyramidales	70
Os uteri externum	101	-- ventriculi	T. II. 57
-- -- internum	103	Parastatae	95
Officula auditus	20. 154. T. II.	Parotides	145
	116	Partes compositæ, contentæ,	
-- Wormiana	25	continentes, dissimilares, or-	
Osteologia	12	ganicæ, similes, simplices	
Ostiola cervicis uteri	104	ad sensum	9
Ovarium	105	-- fluidæ	9. 12
Ovarium novum quorundam		-- solidæ	9
	104	Partus, eius tempus & modus	
Ovarii corpora lutea	105	naturalis	111
-- vesiculæ an vera ova		Patella	55
	T. II. 81. 82	cui inhæreat	201
-- hydatides	105	Pedes hippocampi	135
-- novi Nabothiani vesiculæ		Pedunculi cerebelli	136
an glandulæ	T. II. 33	Pelvis	45. 77
Oviductus avium	106	Pelvis	

Rerum præcipuarum.

Pelvis renum	91	Plexus non habet glandulas	
Penis	97		T. II. 22
-- ligamenta lateralia	T. II. 77	Plexus nervorum	163
Pericardium	123	Pollex	52. 53
eius liquor	ibid	eius muscoli	194. 204
-- concretio cum corde		Pomum Adami	8. 121
morboſa	ibid.	Pons Varolii	136. 137
-- an glandulas habeat	123	Pori	68
	T. II. 19. 54	horum valvulæ	ibid.
Perichondrium	66	Porta hepatis	88
Pericranium	64. 130	Præcordia	8
Perinæum	8. 100	Præputium	97
Periosteum	64	eius frenulum	ibid.
Peritonæum	76	Priapus	97
an glandulas habeat	ibid. &	Processus offis	15
	T. II. 19. 54	eius ſynonyma & uſus	ibid.
Perone	57	Processus anconæus	50
Pes	8. 53	-- ciliares	143
-- extremus	57	-- condyloides & coronoi-	
eius digiti	59	des maxillæ infer.	29. 30
-- dorſum	57	-- coracoides	47
-- planta	ibid.	-- coronoides ulnæ	50
Phalanga	52	-- duræ matris	131
Pharynx	127	-- falciformis	ibid.
Philtrum	8	-- mammillaris	20
Pia mater	133. 140	-- olecranus	50
Pilus	11. 71. 130	-- peritonæi	76
eius bulbus	71	annulus pro tranſitu	
Pinguedo	10. 67. 73	eius	75
eius circulatio	73	-- vermiformis cerebelli	136
Pinna auriculæ	153	-- -- -- intellini cœci in foetu	
Placenta	108		112
Planta pedis	8	Proceſſuum pterygoideorum	
Platysma myodes	176. 180	apophyſis, corniculum dicta	
Pleura	116. 117		T. II. 133
an glandulas habeat	117	Prolabia	147
	T. II. 19. 54	Prominentia annularis Willifii	
Plexus choroideus	135		136
		Pro-	

Index II.

Prosector	1	Renes, an sint glandulosi T. II. 9.	
Prostata	96		19. 73
Prostatae muliebres Bartholini		-- vesiculosi Littrii exami-	
	102	nantur	T. II. 142
Protuberantia annularis Willi-		-- in foetu quales	112
fii	137	-- succenturiati	92
Protuberantiae orbiculares ce-		-- -- quales in foetu	92. 112
rebelli	137	-- -- usus dubius	T. II. 73
Pterygoides apophysis	23	Rete	78
Pubes	8	-- mirabile	138
Pudendum muliebre	100	-- -- homini vindicatur	
Pulmo	120		T. II. 95
in foetu qualis	112	-- vasculosum pulmonum	
Pulsatilis fons	20		120
Puncta lacrymalia	142	Reticulum cutaneum	69
Pupilla	143	Rhachis	37
eius sphincter	ibid.	Rima ad infundibulum	135
Pylorus	79	Rotula	55
Pyramidale corpus	94	Rugae intestinorum tenuium	
Pyramidales papillae	70		T. II. 59
		-- vaginae	102
R.		S.	
Radices felleae	88. 89	Saccus ingularis	159
Radius	49. 50	-- lacrymalis	29. 142
Radix unguis	72	Salivae quantitas	T. II. 105
Rauiana apophysis	21	Salivales glandulae	145
Receptacula cutanea	70	earum ductus	ibid.
Receptaculum chyli	85	-- ductus Coschwizianus	
in homine an detur	T. II 63	est vena	T. II. 109
Rectum intestinum	81	Sanguinis circulatio in foetu	
Regio epigastrica	8		126
-- hypogastrica	ibid.	-- inter foetum & matrem	
Regio iliaca	ibid.	communicatio	T. II. 85
-- ischiatica	ibid.	Sarcologia	12. 66
-- umbilicalis	ibid.	Scala tympani, vestibuli	22. 155
Renales glandulae	92	Scapha	153
Renes	77. 91		Scapu-
eorum pelvis	91		

Rerum præcipuarum.

Scapula	47	Sphincter vaginæ	102. 199
Skeleton	13. 18	- - vesicæ	93
eius divisio	18	Spigellii lobulus	88
Sclerotica tunica	143	Spina dorsi	37
Scrobiculus cordis	8	eius divisio	ibid.
Scrotum	94	Spirituum viæ sunt nervi	166.
eius futura & septum	ibid.		167
Secretiones non supponunt		eos negantes refelluntur	ibid.
glandulas	T. II. 5	Splanchnologia	67
nec folliculos	T. II. 12	- - Garengéoti monita circa	
- - fiunt ex lateralibus cana-		illam	T. II. 145-158
liculis arteriarum	T. II.	Splen	90
	12	Spondyli	37
- - - non ex venis nisi ve-		Spongiosa ossa inferiora	28
na portæ	ibid.	- - - superiora	24
Secundinæ	107	Squamosa ossa	20
Sella equina s. turcica	23	Stapes	21. 154
Septum cordis	125	Stenonianus ductus	145
- - lucidum	135	Sternum	43
- - narium	28. 151	Stomachus	79. 127
- - transversum s. diaphrag-		Structura intestinorum	82
ma	119	- - nervorum	166
- - scroti	94	Styloidea apophysis	20. 23
Sesamoidea ossa	59. 60	Sulci cuticulæ & cutis	68
Sigmoideæ fossæ	20	Supercilia	141.
Sinciput	8	Suram qui musculi faciant	202
eius ossa	19	Sutura	63
Sinus ossium capitis, frontales,		- - scroti	94
maxillares, sphenoides, eth-		Suturæ cranii	24
moides	151	harum usus	25
- - duræ matris	131. 138.	Symphysis	63
	T. II. 95	Synarthrosis	ibid.
- - laryngis	121	Synchondrosis	ibid.
- - venæ portæ	88. 161	Synnevrosis	63
Sphincter ani	81	Syntaxis ossium	62
- - gulæ	183	Synthesis - -	ibid.
- - pupillæ	143	Syssarcosis	63
			T. Tactus

Index II.

<i>T.</i>			
T actus organon	70. 156	Tonillæ	148
Talus	58	Torcular Herophili	131
Tarsus	8. 58	Trachea	121. 122
-- palpebræ	142	Tragus	153
Tegumenta abdominis	74	Transitus e naribus ad pala-	
-- communia corporis hu-		tum Stenonianus	35
mani	67	Triquetra ossicula	25
Tempora	8	Trochanter	54
horum ossa	20	Trochlearis musc. oculi	175
Tendo	10	Trochoides	63
-- Achillis	58	Truncus	7
Testes	94	Tuba Eustachii	21. 154
-- non sunt glandulæ T. II.		-- Fallopiana 106. T. II. 83	
	18	eius corpus caverno-	
-- muliebres	105	sum	106
-- cerebri	135	Tuberculum Lovveri	125
Testiculi elevator	94	negatur	125. T. II. 92
Testium substantia qualis T.		Tubercula morbosa hepatis	
	II. 75		T. II. 70
-- tunica albuginea divisi-		Tubuli lactiferi	115
bilis	ibid.	-- urinarii Bellini	91
Testis peculiariter constitui		Tumores cystici non in cute,	
descriptio	T. II. 75. 76	sed sub cute	T. II. 46
Thalami nervorum opticorum		Tunica	10
	135	-- adnata s. albuginea	143
Thoracicus ductus	84. 85	-- arachnoides	132. 137
eum demonstrandi metho-		-- -- oculi	144
dus	84	-- arteriarum	T. II. 120
eius valvulæ	85	-- cellulosa ventriculi T. II.	
Thorax	7. 113		56
eius vertebræ	39	-- choroidea	143
-- partes	113	-- -- an visus primarium	
Thymus	118	organon	T. II. 96
qualis in foetu	112	-- conjunctiva	143
Thyroides cartilago	36. 121	-- cornea	ibid.
Tibia	8. 56	-- intestinorum	cellulosa
		Ruysehii	82
			Tunica

Rerum præcipuarum.

Tunica intestinorum cellulosa	Valvula cerebri magna	135.
Albini T. II. 58		136
quomodo differat a Ruy-	-- coli	80
schiana ibid.	-- pylori	79
-- -- villosa 82	-- semilunaris ductus tho-	
-- -- -- est villo-papillosa	racici finem tegens	85
secundum Ruyschium	-- -- controversi usus T.	
T. II. 59. 60		II. 64
-- ligamentosa & cellulosa	-- trunci venæ cavæ infe-	
medullæ spinalis 140	rioris	160
-- retina 143	-- -- putatur valvula reti-	
-- -- visus organum pri-	culata Eustachii T. II.	
marium T. II. 96	128. 129. 130	
-- reticularis Malpighii lin-	-- -- insignis est in foetu	
guæ 150		112
-- papillaris nervosa linguæ	Valvulæ conniventes coli	81
ibid.	-- -- ieiuni	80
-- sclerotica 143	-- cordis mitrales, tricuspi-	
-- vaginalis 94	dales & semilunares	125
-- villosa ventriculi, an de-	-- ductus cystici, quales,	
tur T. II. 57	& a quibus admittæ	
quomodo sit in conspe-	T. II. 65. 66	
ctum danda ibid.	-- semilunares aortæ	157
-- uvea 143	-- vasorum lacteorum &	
Turbinata ossa 24	ductus thoracici	84. 85
Tympanum 154	-- lymphaticorum	86
eius cavitas 21. 154	-- venarum semilunares	
-- chorda ibid.		161
-- membrana ibid.	-- -- defunt in vena por-	
foramen huius dubiæ est	tæ & pulmonali	ibid.
existentiæ 154. T. II.	Vas deferens s. eiaculatorium	
112. seq.		95
-- scala 22. 155	-- -- mulierum	105
Tysonis glandulæ odoriferæ 97	-- lacteum	11
V.	-- lymphaticum	ibid.
Vagina uteri 102	Vasa adiposa	73
eius orificium 101	-- biliaria	88
-- sphincter 199	-- brevia	79. 161
	Vasa	

Index II.

Vasa chyliifera	84	Vena epiploica	161
-- cystica	89	-- gastrica	ibid.
-- gastrica	79	-- gastro-epiploica	ibid.
-- lactea	84	-- hæmorrhoidalis externa	
-- -- in pennatis defunt ib.			160
-- -- in homine visa T. II. 61		-- -- interna	161
ex duodeno prode-		-- hepatica	159
untia T. II. 62. 63		-- hypogastrica	160
eorum inventores T. II. 60		-- iugularis externa & in-	
-- lymphatica	86	terna	159
eorum inventores ibid.		-- -- internæ faccus f. di-	
-- -- a Nuckio ex brutis vel		verticulum	ibid.
ingenio homini appi-		-- mammaria	ibid.
cta T. II. 65		-- mediana	ibid.
-- nevo - lymphatica Ho-		-- mediastina	ibid.
vii T. II. 102		-- muscularis	160
-- phrenica	119	-- pancreatica	161
-- umbilicalia	77. 109	-- poplitæa	160
Vasculosum & glandulosum an		-- portæ	161
differant T. II. 9. 13		eius ramus dexter & sinist. ib.	
Vasculosæ partes facile tran-		-- sinus	88. 161
seunt in vesiculas T. II. 10. 11		-- -- valvulis caret	161
Velum palati	148	-- pudenda	160
Vena	10. 159	-- pulmonalis	124. 159
-- primariæ tres	159	-- -- valvulis destituitur	161
-- earum structura	161	-- sacra	160
-- axillaris	159	-- salvatella	159
-- azygos	ibid.	-- saphæna	160
-- basilica	ibid.	-- spermatica dextra & fini-	
-- bronchialis 120. 159. T II. 91		stra	160
-- cava	124. 159	-- splenica	159. 161
-- cephalica	159. 160	-- subclavia	159
-- coronaria cordis 124. 159		-- furialis	160
-- -- ventriculi	161	-- vertebralis	159
-- cruralis	160	Venæ adiposæ	160
-- diaphragmatica sup.	159	-- atrabiliaræ	ibid.
-- duodena	161	-- cerebri	138
-- epigastrica	160	-- coronariæ cordis	124
		Venæ	

Rerum præcipuarum.

Venæ cysticæ	161	Vertex	8
-- diaphragmaticæ inf.	160	eius ossa	19
-- hæmorrhoidales exter-		Vesica	93
næ	160	eius muscoli	199
-- hepaticæ	ibid.	-- tunica cellulosa & mu-	
-- iliacæ	ibid.	sculosa	T. II. 74
-- intercostales	159	-- qualis in foetu	112
-- lumbares	160	Vesicula an pars necessaria	
-- mesaraicæ	161	glandulæ	T. II. 10
-- musculares	159	-- fellea	89
-- œsophagæ	ibid.	Vesiculæ cervicis uteri	104
-- pancreaticæ	161	-- morbosæ non arguunt	
-- phrenicæ infer.	160	glandulas in statu sano	
-- raninæ	159		T. II. 9
-- renales	160	Vesiculæ seminales	96
-- scapulares	159	harum ductus in urethram	
-- triangulares s. sinus	131	quot	ibid. T. II. 76
-- vertebralis ingressus in		-- sem. mulierum	104
cranium	T. II. 127	Vespertilionum alæ	105
Venarum cordis orificia	126	Vestibulum labyrinthi	22. 155
Ventriculi cerebri	135	Vestibuli Scala	22
-- -- anteriores glacie ple-		Vibrissa	151
ni reperti	ibid.	Visus primarium organum	T.
Ventriculi cordis	124		II. 96.
dexter amplior sinistro		Vitreus humor oculi	144
	T. II. 91	Vlna	49
-- laryngis	121	eius crista	50
Ventriculus	77. 79	Vmbilicus	75
eius fibræ carneæ	T. II. 56	eius vasa	77. 109
-- an habeat tunicam villo-		-- arteriæ quousque cavæ	
sam	T. II. 57	maneant	77
quomodo reddatur conspi-		Vmbilicalis funiculus	110
cua	ibid.	-- regio	8
Vermiformis appendix	81	Vnguis	11. 72
Vertebræ	37	eius apex	ibid.
-- colli	38	Vnguis ossa	26
-- dorsi s. thoracis	39	Vnio	63
-- lumborum	40	Vola manus	8. 52
			Vomer

Index II. Rerum præcipuarum.

Vomer	28	Vvea tunica	143
Vomitus , a quibus musculis		Vulva cerebri	135
	T. II 53		
Vrachus	77. 109	X.	
Vreteres	91. 92	Xiphoides cartilago	44
horum glandulæ	92	Y.	
Vrethra	93. 98	Ypsiloides os	36. 147
-- virilis bulbus	98	Z.	
-- -- finis	ibid.	Zonæ sonoræ Valsalvæ	155
-- muliebris	101	Zootomia	I
Vrinarü tubuli Bellini	91	Zygomatica ossa	27
Vropœa viscera	67	Zygomaticus processus	20
Vterinum hepar	108		
Vterus	103		
eius cervicis corpuscula glo-			
bosa	104		
-- crassities in gravidis T. II.			
	79		
-- ligamenta	103		
-- musculus orbicularis no-			
vus Ruyschii 108. T. II.			
	80		
-- os externum	101		
-- -- internum	103		
-- vagina	102		
Vva f. uvula	148		

Ad Bibliopegum.

Tab. I. ad pag. 162. est collo-	
canda.	
Tab. II. ad pag. 164.	
Tab. III. ad pag. 169.	
Tab. IV. ad pag. 173.	
Tab. V. ad pag. 175.	
Tab. VI. ad pag. 179.	
Tab. VII. ad pag. 181.	
Tab. VIII. ad pag. 187.	
Tab. IX. ad pag. 190.	



—: M:—

Emendanda Tom. I.

- pag. 2. lin. 6. pro *antiquiorius*, leg. *antiquioribus*.
 id. §. 7. recentissimis anatomicis, addatur *Lancisus & Waltherus*,
 pag. 5. lin. antepenultima, leg. *calumniari*.
 11. §. 31. leg. *defendendis*que pro *defendentis*.
 31. in notis, pro *oseum* l. *osseum*.
 62. §. 183. lin. 4. pro *cogintis*, l. *cognitis*.
 70. lin. ultima, semel pro b) ponendum c)
 71. lin. 20. pro *senlibus* leg. *senibus*.
 78. lin. 20. pro *cœlica*, leg. *cœliaca*.
 83. lin. antepenult. in notis post pag. 76. addatur lit. b)
 89. lin. 15. post *cellulosa*, adde *Morgagni*.
 118. lin. 16. pro *a ductum*, leg. *ad ductum*.
 137. lin. 2. pro *cuadam*, leg. *caudam*.
 138. ad finem descriptionis *Retis mirabilis* add. (49 *)
 - - lin. penult. leg. *inferiorem falcis sinum*.
 157. lin. 17. pro (96 *) leg. (66 *)
 160. lin. 5. pro *neglectus*, l. *neglectas*.
 - - lin. 7. pro *delineatus* l. *delineatas*.
 164. lin. 24. pro b) ponatur c)
 - - lin. 27. pro *pleur*, *amusculis*, leg. *pleuræ musculis*.
 173. lin. 27. pro *duo* l. *duos*, & quia in notis ibidem bis positum est
 pag. 8 & 9, deleatur prius.
 178. lin. 14. delenda verba, *buccinatores juvat*.
 190. lin. ultima leg. qui inferitur parti posteriori colli humeri.
 193. lin. 20. deleantur verba, & *transverso*.
 194. lin. 22. pro *Abductor*, l. *Adductor*.
 200. lin. 12. pro *sed maximi*, l. *sed finis maximi*.
 203. lin. ultima, pro §. 54. leg. 354.

Tom. II.

- Pag. 7. lin. 7. pro 356. leg. 366.
 10. lin. 11. pro *glandulas* leg. *glandulis*.
 14. lin. 6. pro *alique* l. *aliique*.
 18. lin. 15. post *constare*, loco commatis, ponatur punctum.
 101. lin. antepenult. post verbum *quoque*, adde *quæ*.
 In nota (21 *) in versiculo, *splen ridere facit Ec.* pro *hepar*, metri
 causa leg. *jecur*.

